

Утвержден
приказом и.о. председателя
Комитета государственной инспекции
в агропромышленном комплексе
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
от 13 августа 2026 года № 98-н

ПЕСТИЦИДЫ

**СПИСОК ПЕСТИЦИДОВ, РАЗРЕШЕННЫХ К ПРОИЗВОДСТВУ
(ФОРМУЛЯЦИИ), ВВОЗУ, ХРАНЕНИЮ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ, РЕАЛИЗАЦИИ И
ПРИМЕНЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

Список пестицидов, разрешенных к производству (формуляции), ввозу, хранению, транспортировке, реализации и применению на территории Республики Казахстан

Все пестициды, указанные в настоящем Списке, имеют государственную регистрацию в соответствии с Законом Республики Казахстан «О защите растений» по согласованию с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды и государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Пестициды, не внесенные в Список запрещены к ввозу, реализации, производству, применению и рекламированию на территории Республики Казахстан.

Пестициды в Списке расположены по группам согласно их назначению (инсектициды и акарициды, фунгициды, препараты для предпосевной обработки семян, гербициды, биопрепараты, дефолианты и десиканты, регуляторы роста растений и др.). В пределах каждой группы пестициды расположены по концентрации действующих веществ (с допуском разницы не более $\pm 5\%$), а затем в алфавитном порядке по торговым названиям.

Обозначения (П-1) ... (П-4) в первой графе после названия регистранта означает класс опасности препарата для пчел в полевых условиях.

Расшифровка классов опасности и условия применения препаратов:

П-1 — высокоопасные для пчел. Необходимо соблюдать указанные экологические регламенты:

- обработку растений проводить ранним утром или поздним вечером;
- скорость ветра до 1-2 м/с;
- погранично-защитная зона для пчел не менее 4-5 км;
- ограничение лета пчел – 96-120 часов.

П-2 — среднеопасные для пчел. Необходимо соблюдать указанные экологические регламенты:

- обработку растений проводить ранним утром или поздним вечером;
- скорость ветра до 2-3 м/с;
- погранично-защитная зона для пчел не менее 3-4 км;
- ограничение лета пчел – 48-72 часа.

П-3 — малоопасные для пчел пестициды. Необходимо соблюдать указанные экологические регламенты:

- обработку растений проводить ранним утром или поздним вечером;
- скорость ветра до 4-5 м/с;
- погранично-защитная зона для пчел не менее 3-4 км;
- ограничение лета пчел – 24-48 часов.

П-4 — практически неопасные для пчел пестициды. Необходимо соблюдать указанные экологические регламенты:

- обработку растений проводить при скорости ветра до 5-6 м/с;
- погранично-защитная зона для пчел не менее 1-2 км;
- ограничение лета пчел – 6-12 часов.

СОКРАЩЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

в.г., в.р.г.	водорастворимые гранулы
в.г.р.	водно-гликолевый раствор
в.д.г.	водно-диспергируемые гранулы
в.к.	водный концентрат
в.р.	водный раствор
в.р.к.	водорастворимый концентрат
в.р.п.	водорастворимый порошок
в.р.с	водорастворимая суспензия
в.с.	водная суспензия
в.с.к.	водно-суспензионный концентрат
в.с.р.	водно-спиртовый раствор
в.э.	водная эмульсия
д.в.	действующее вещество
д.к.	дисперсионный концентрат
ж.	жидкий
з.б.у.	заводская бинарная упаковка
к.с.	концентрат суспензии
к.к.р.	концентрат коллоидного раствора
к.н.э.	концентрат наноэмульсии
к.м.э.	концентрат микроэмульсии
к.э.	концентрат эмульсии или эмульгируемый концентрат
м.д.	масляная дисперсия
МДУ	максимально допустимый уровень
м.к.	масляный концентрат
м.к.с.	микрокапсулированная суспензия
м.к.э.	микрокапсулированная эмульсия
м.с.	масляная суспензия
м.в.с.к.	масляно-водный суспензионный концентрат
м.э.	микроэмульсия
мас.к.э.	масляный концентрат эмульсии
мас.э.	масляная эмульсия
мас.экстр.	масляный экстракт
ПДК	предельно-допустимая концентрация
р.к.	растворимый концентрат
р.п.	растворимый порошок
с.к.	суспензионный концентрат
с.п.	смачивающийся порошок
с.т.с.	сухая текучая суспензия
сух.п.	сухой порошок
с.э.	суспензионная эмульсия
таб.	таблетка
т.к.с.	текучий концентрат суспензии
т.пс.	текучая паста
УМО	ультрамалообъемное опрыскивание
э.м.в.	эмульсия масляно-водная
э.к.	эмульгируемый концентрат

ИНСЕКТИЦИДЫ И АКАРИЦИДЫ

Торговое название, препаративная форма, фирма-регистраント. Дата окончания срока регистрации (число, месяц, год)	Норма расхода препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т)	Культура, обрабатываемый объект	Вредный объект	Способ, время обработки, ограничения	Срок последней обработки, в днях до сбора урожая, в () максимальная кратность обработок
---	--	---------------------------------	----------------	--------------------------------------	--

Абамектин

Концентрация д.в. (+/- 5%) ~ 18 г/л							
АБАЛОН, 1,8% к.э. (18 г/л) Arysta LifeScience Benelux Sprl П-1 05.03.2031 г.	0,3	Хлопчатник	Паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации	30 (1)		
	0,4		Тли, трипсы				
	0,4-0,5		Хлопковая совка				
	0,2	Томаты защищенного грунта	Минирующие мухи		3 (1)		
			Ржавчинный клещ		20 (1)		
Агамагган, к.э. (18 г/л) ТОО «Астана-Нан» П-1 02.06.2035 г.	0,3-0,5	Соя	Обыкновенный паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации	30 (1)		
	0,3	Хлопчатник	Клещи				
ВЕРТИМЕК 018, к.э. (18 г/л) Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария П-1 01.02.2029 г. 29.11.2032 г.	0,3-0,5	Соя	Обыкновенный паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)		
	0,3	Хлопчатник	Клещи		30 (1)		
КРАФТ, к.э. (18 г/л) Кеминова А/С, Дания П-1 24.02.2027 г.	0,3	Хлопчатник	Клещи	Опрыскивание в период вегетации	30 (1)		
	0,75-1,0 0,75 0,3 0,3-0,5 0,4-0,6	Яблоня Хлопчатник Соя Пшеница яровая, пшеница озимая	Растительнаяядные клещи Яблонная медяница Паутинный клещ Обыкновенный паутинный клещ Пшеничный цветочный клещ, пшеничный четырехногий клещ	Опрыскивание в период вегетации	28(3)		
МЕКАР м.э. (18 г/л) АО «Щелково Агрохим» 14.04.2031 г.	0,3-0,5	Соя	Обыкновенный паутинный клещ		28 (2)		
	0,4-0,6	Пшеница яровая, пшеница озимая	Пшеничный цветочный клещ, пшеничный четырехногий клещ		30(2)		
	0,3-0,5	Соя	Обыкновенный паутинный клещ		Опрыскивание в период вегетации	30 (1)	
	0,3	Хлопчатник	Паутинный клещ				
ШАНСИТЕК, к.э. (18 г/л) ООО «Шанс» П-1 23.06.2031 г.	0,3 0,4 0,4-0,5 0,5-0,8 0,3-0,5 0,75-0,1 0,75 0,75-0,1 0,2	Хлопчатник Хлопчатник Хлопчатник Пшеница яровая и озимая Соя Яблоня Яблоня Виноград Перцы, баклажаны, томаты защищенного грунта	Паутинный клещ Тли, трипсы Хлопковая совка Пшеничный и цветочный клещ, пшенично- паутинный клещ Обыкновенный паутинный клещ Клещи Яблонная медяница Паутинный клещ Паутинный клещ, табачный трипс	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 600-1200 л/га Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 600- 800 л/га Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 500-1000 л/га Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 1000- 2000 л/га	30 (1) 30 (2) 28 (2) 30 (2) 30 (1) 40 (2) 30 (1)		
	Концентрация д.в. (+/- 5%) ~ 36 г/л						
	АКАРИН, 3,6% к.э. (36 г/л) ТОО «Агрохимия» П-1 21.02.2027 г.	0,15	Хлопчатник	Паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)	
	БАРИН, к.э. (36 г/л) ТОО «Агро-Хим-Лидер» П-1 06.02.2029 г.	0,15 0,4 0,4-0,5 0,15-0,25 0,4-0,6 0,4-0,6 0,5-0,6	Хлопчатник Хлопчатник Соя Яблоня Виноград Перцы, баклажаны, томаты защищенного грунта	Паутинный клещ Тли, трипсы Хлопковая совка, карадрина Паутинный клещ Клещи Клещи Паутинный клещ, табачный трипс	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га Опрыскивание в период вегетации.Расход рабочей жидкости 1000- 1500 л/га Опрыскивание в период вегетации.Расход рабочей жидкости 600-1000 л/га Опрыскивание в период вегетации.Расход рабочей жидкости 1000-2000 л/га	30 (1) 30 (2) 30 (2) 30 (1)	
		ТИМАМЕКТИН, 3,6% к.э. (36 г/л) Наньцзин Эссенс Файн- Кемикал Со., Лтд, Китай П-1 02.02.2034 г.	0,15 0,4 0,4-0,5 0,15	Хлопчатник Хлопчатник Соя	Паутинный клещ Тли, трипсы Хлопковая совка, карадрина Паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)

Абамектин + ацетамиприд

ВЕРТИМОС ИКС к.э. (20 г/л + 40 г/л) ТОО «GOOD JOB INDUSTRY KAZAKHSTAN» («ГУД ДЖОБ ИНДАСТРИ КАЗАХСТАН») П-3 08.11.2033 г.	0,2-0,4	Яблоня	Тля, трипсы, клещи, моли, мухи, плодожорки	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 800-1200 л/га	20 (2)
		Картофель	Колорадский жук, майский жук, моль	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 300 - 400 л/га	
		Лук	Луковая муха, табачный трипс, тля, трипсы		

Абамектин + спиротетрамат

АБАМАТ к.с. (40 г/л+ 240 г/л) ШАНДОНГ ВЕЙФАНГ РЕЙНБОУ КЕМИКАЛ КО., ЛТД П-1 05.03.2034 г.	0,3-0,4	Яблоня	Тли, щитовки, ложнощитовки, яблонный цветоед, яблонная моль	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 500-1500 л/га	20(2)
	0,3-0,4	Груша	Грушевая медяница, тли, ложнощитовка		

Абамектин + тиаметоксам

ЭВЕЛИН к.с. (90 г/л+ 270 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-1 17.01.2035 г.	0,1 -0,12	Пшеница яровая	Пшеничный клещ, пшеничный трипс, хлебные блошки, клоп вредная черепашка, гессенская муха, серая зерновая совка	Опрыскивание в период вегетации	30(1)
	0,1 – 0,12	Ячмень яровой	Пшеничный клещ, трипсы, блошки, шведская муха, пьявица		
	0,1 – 0,12	Хлопчатник, соя	Паутинный клещ, тли		

Альфа-циперметрин

Концентрация д.в. (+/- 5%) ~ 100 г/л					
АГРОЦИП, 10% к.э. (100 г/л) ТОО «Агрохимия» П-2 17.02.2030 г.	0,2	Пшеница яровая	Хлебные жуки	Опрыскивание в период вегетации.	15(2)
Альфашанс, к.э. (100 г/л) ТОО «ФМРус» П-1 03.02.2035 г.	0,1-0,2	Горох	Гороховая зерновка, гороховая плодожорка, гороховая тля	Опрыскивание в период вегетации	20(1)
	0,1-0,2	Рапс	Рапсовый цветоед, крестоцветные блошки		20(2)
	0,1-0,2	Ячмень	Пьявица		
	0,1-0,2	Пшеница	Клоп вредная черепашка, блошки, трипсы, цикадки, пьявица		
Аккорд, к.э. (100 г/л) ООО «Интер Групп», П-1 05.01.2035 г.	0,1-0,15	Пшеница яровая	Клоп вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га.	20 (2)
	0,1	Пшеница яровая	Блошки, тли, цикадки, трипсы, пьявица		
	0,1	Ячмень яровой	Пьявица		
	0,1-0,15	Рапс яровой,горчица	Рапсовой цветоед, крестоцветные блошки		
	0,07-0,1	Картофель	Колорадский жук		
	0,15-0,2	Люцерна (семенные посевы)	Долгоносики, клопы, тли	Опрыскивание в фазе бутонизации. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га.	- (1)
	0,1-0,15	Лен	Блошки	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га.	20 (2)
	0,1	Свекла сахарная	Свекловичная листовая тля, свекловичная минирующая муха		45 (2)
		Свекла кормовая			20 (1)
	0,3	Хлопчатник	Хлопковая совка, тли, трипсы		20 (2)
	0,1-0,15	Подсолнечник	Луговой мотылек, тли		
	БЕСТСЕЛЛЕР, 10% к.э. (100 г/л) Arysta LifeScience Benelux Sprl П-1 05.03.2031 г.	0,1-0,15	Пшеница яровая	Вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации
0,1		Блошки, тли, цикадки, трипсы			
0,2-0,3		Серая зерновая совка			
0,12		Гессенская и шведская муха			
0,1-0,15		Рапс	Рапсовый цветоед, крестоцветные блошки	20 (2)	
0,24-0,36		Виноград	Гроздевая листовертка	30 (2)	
0,15		Участки заселенные саранчовыми	Итальянский прус, мароккская саранча	Опрыскивание в период массового отрождения личинок	20 (1)
ПИКЕТ, к.э. (100 г/л) ООО «Резерв», Россия П-1 11.07.2027 г.	0,2-0,3	Пшеница яровая	Серая зерновая совка (гусеницы младших возрастов)	Опрыскивание в период вегетации	15 (1)
	0,1-0,15		Вредная черепашка, стеблевые блошки, злаковые тли, цикадки, пшеничный трипс, хлебная пьявица		15 (2)
	0,1	Картофель	Колорадский жук		20 (2)
	0,2-0,3	Яблоня	Яблонная плодожорка, листовертки		30 (2)
	0,24-0,36	Виноградная лоза	Гроздевая листовертка		20 (2)
	0,3	Хлопчатник	Хлопковая совка (гусеницы младших возрастов), трипсы		
	0,15	Участки заселенные саранчовыми	Итальянский прус, азиатская саранча, мароккская саранча	Опрыскивание в период массового отрождения личинок	20 (1)
ФАСКОРД, к.э. (100 г/л) АО «Щелково Агрохим» П-2	0,1-0,15	Рапс	Крестоцветные блошки, рапсовый цветоед	Опрыскивание в период вегетации	20 (2)
	0,1-0,15	Свекла сахарная	Свекловичные блошки, долгоносики, совки озимая и клеверная		

05.04.2032 г.	0,07-0,1	Картофель	Колорадский жук		
	0,15	Участки, заселенные саранчовыми	Итальянский прус, мароккская и азиатская саранча, нестадные саранчовые	Опрыскивание в период массового отрождения личинок	20 (2)
	0,2-0,3	Пшеница яровая	Серая зерновая совка	Опрыскивание в период вегетации	15 (2)
	0,1-0,15		Вредная черепашка		15 (1)
	0,15		Хлебные жуки		20 (2)
	0,1		Стеблевые блошки, злаковые тли, цикадки, пшеничный трипс, хлебная пьявица		
	0,12		Гессенская и шведская мухи		
	0,1	Ячмень	Блошки, злаковые тли, цикадки,пшеничный трипс, пьявица		
ФАСТАК, 10% к.э. (100 г/л) БАСФ Агро Б.В., Швейцария П-2 18.02.2031 г.	0,15	Пшеница яровая	Хлебные жуки	Опрыскивание в период вегетации	15 (2)
	0,12	Пшеница яровая	Гессенская муха		
25.12.2033 г.	0,1-0,15	Лен	Блошки		20 (2)
	0,1-0,15	Подсолнечник	Луговой мотылек, тли		
ФАСШАНС, к.э. (100 г/л) ООО «Шанс» П-1 12.03.2029 г.	0,1-0,15	Пшеница яровая	Вредная черепашка, блошки, злаковые тли, цикадки, пшеничный трипс, пьявица	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	20 (2)
	0,1-0,15	Ячмень яровой	Блошки, злаковые тли, цикадки, пшеничный трипс,пьявица		
	0,1-0,15	Рапс	Рапсовый цветоед, крестоцветные блошки		
	0,07-0,1	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 300-400 л/га	20 (2)
	0,1	Горох	Гороховая зерновка, гороховая плодоярка, гороховая тля	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	20 (1)
	0,15-0,2	Люцерна (семенные посевы)	Долгоносики, клопы, тли		-(1)
	0,25-0,3	Хлопчатник	Хлопковая совка, тли, трипсы, клопы	Опрыскивание в период развития личинок. Расход рабочей жидкости 200 - 400 л/га.	30(2)
	0,3	Пастбища, дикая растительность	Итальянский прус, азиатская и мароккская саранча, нестадные саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях – не ранее 3-х дней после обработки. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	-(1)
ЦЕПЕЛЛИН, к.э. (100 г/л) Представительство ООО «Агро Эксперт Груп» в РК П-2 31.01.2035 г.	0,1-0,15	Пшеница яровая	Клоп вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	15 (2)
	0,1		Блошки, тли, цикадки, трипсы, пьявицы		15 (3)
	0,2-0,3		Серая зерновая совка		20 (2)
	0,07-0,1	Картофель	Колорадский жук		
	0,1-0,15	Рапс	Рапсовый цветоед,крестоцветные блошки		
	0,3	Хлопчатник	Хлопковая совка, тли, трипсы		
	0,15	Участки заселенные саранчовыми	Итальянский прус, азиатская и мароккская саранча, нестадные саранчовые	Опрыскивание в период массового отрождения личинок. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	20 (1)
	0,2-0,3	Кукуруза	Кукурузный стеблевой мотылек, луговой мотылек,хлопковая совка,озимая совка, тли	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 100-300 л/га	20 (2)
	0,1-0,15	Подсолнечник	Тли, клопы, долгоносики		
	0,1-0,15	Лен	Луговой мотылек, трипсы, блошки, плодоярки,совки		
ЦУНАМИ, к.э. (100 г/л) Форвард П-2 16.01.2028 г.	0,15	Участки, заселенные саранчовыми	Итальянский прус, мароккская и азиатская саранча	Опрыскивание в период массового отрождения личинок	20 (1)
	0,3	Хлопчатник	Хлопковая совка, трипсы, тли	Опрыскивание в период вегетации	20 (2)
	0,1	Свекла сахарная	Свекловичные блошки, долгоносики	Опрыскивание в период вегетации	45 (2)
	0,15	Свекла сахарная	Озимая совка, клеверная совка	Опрыскивание в период вегетации	20 (2)
	0,07-0,1	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации	20 (2)
Концентрация д.в. (+/- 5%) ~ 150 г/л					
МАМБА, к.э. (150 г/л) АО Фирма «Август» П-2 12.07.2033 г.	0,07-0,1	Подсолнечник	Луговой мотылек, тли	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	20 (1)
	0,07-0,1	Лен масличный	Блошки	Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости 100-200 л/га	
	0,2	Хлопчатник	Хлопковая совка	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	
	0,07-0,1	Пшеница яровая	Клоп вредная черепашка, тли, трипсы		
			Блошки	Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости 100-200 л/га	
	0,07-0,1	Ячмень яровой	Пьявицы, тли	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	
	0,07-0,1	Ячмень яровой	Блошки		20 (1)

	0,07-0,15	Свекла сахарная	Свекловичные блошки, долгоносики	Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости 100-200 л/га	14 (1)
	0,07	Горох	Гороховая плодоярка, гороховая зерновка гороховая тля	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	14 (1)
	0,05-0,07	Картофель	Колорадский жук		
	0,15-0,2	Яблоня	Яблонная плодоярка, листовертки	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 600-1200 л/га	21 (1)
	0,07-0,1	Рапс	Крестоцветные блошки	Опрыскивание всходов.Расход рабочей жидкости 100-200 л/га	28 (1)
			Рапсовый цветоед	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	
0,15-0,2	Люцерна	Долгоносики, тли , клопы	Опрыскивание в фазе бутонизации. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	21 (1)	
Фаст Брейк, к.э. (150 г/л) ТОО «EcoSave» П-2 12.03.2036 г.	0,1	Пшеница яровая	Блошки, тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации	15 (2)
Концентрация д.в. (+/- 5%) ~ 200 г/л					
Альфаплан, к.с. (200 г/л) Arysta LifeScience Benelux Sprl П-1 08.11.2034 г.	0,075	Участки заселенные саранчовыми	Итальянский прус, мароккская и азиатская саранча	Опрыскивание в период развития личинок. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га.	-(1)
	0,05	Яровая пшеница	Блошки, тли, цикадки, трипсы, пьявица	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200- 400 л/га.	30(2)
	0,05-0,075	Яровая пшеница	Клоп вредная черепашка		
	0,05-0,075	Рапс	Рапсовый цветоед, крестоцветные блошки		
ФОБОС, м.в.с.к. (200 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-2 02.08.2031 г.	0,05-0,075	Пшеница яровая	Вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации	15 (2)
	0,05		Тли, цикадки, трипсы,пьявица		
	0,1-0,15		Серая зерновая совка		
	0,05-0,075	Рапс	Рапсовый цветоед, крестоцветные блошки тли, капустная белянка, скрытнохоботник		20 (2)
	0,075	Участки, заселенные саранчовыми	Итальянский прус, мароккская и азиатская саранча, нестакные саранчовые	Опрыскивание в период массового отрождения личинок	20 (1)
	0,15	Хлопчатник	Хлопковая совка	Опрыскивание в период вегетации	20 (2)
	0,05	Картофель	Колорадский жук		
Концентрация д.в. (+/- 5%) ~ 300 г/л					
КОРВУС, к.э. (300 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-1 19.04.2032 г.	0,04-0,05	Пшеница яровая	Клоп вредная черепашка, тли, злаковые мухи,пшеничный трипс, хлебные блошки, пьявицы	Опрыскивание в период вегетации	20(2)
	0,04-0,05	Ячмень яровой	Блошки, пьявицы, тли		
	0,04-0,05	Рапс	Крестоцветные блошки, рапсовый пилильщик, листоед, рапсовый цветоед, рапсовый семенной скрытнохоботник, тли		
	0,04-0,05	Горчица	Крестоцветные блошки, рапсовый цветоед, рапсовый листоед, тли		
	0,04-0,05	Картофель	Колорадский жук		
Альфа-циперметрин + дифлубензурон					
Концентрация д.в. (+/- 5%) ~ 80 г/л + 96 г/л					
Альфамиллин, 17,6%, с.к. (80 г/л + 96 г/л) Arysta LifeScience Benelux Sprl П-1 10.08.2036 г.	0,1–0,12	Участки, заселенные саранчовыми	Итальянский прус, азиатская саранча, нестакные	Обрабатывать в период массового отрождения личинок	28(2)
	0,1–0,15	Пшеница	Блошки, трипсы, тли, цикадки	Опрыскивание в период вегетации	28(2)
	0,2 - 0,4	Хлопчатник	Хлопковая совка, карадрина	Опрыскивание в период массовой яйцекладки – начала отрождения личинок	20 (2)
Концентрация д.в. (+/- 5%) ~ 100 г/л +120 г/л					
РЕЙВ, к.с. (100 г/л + 120 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-1 04.05.2031 г.	0,08-0,12	Пшеница яровая	Блошки, трипсы, тли, клопы	Опрыскивание в период вегетации	20(2)
	0,06-0,08		Серая зерновая совка		20(1)
	0,08-0,12	Ячмень яровой	Блошки, трипсы, тли, клопы		
	0,2-0,3	Рапс яровой	Капустная моль, белянки		
Альфа-циперметрин + имидаклоприд + клотианидин					
Концентрация д.в. (+/- 5%) ~ 125 г/л + 100 г/л + 50 г/л					
БОРЕЙ НЕО, с.к. (125 г/л + 100 г/л + 50 г/л) АО Фирма «Август» П-1 19.01.2027 г.	0,1-0,2	Пшеница яровая	Серая зерновая совка	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200–300 л/га	28 (2)
	0,1	Рапс	Крестоцветные блошки	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	20 (2)
	0,15-0,2		Рапсовый цветоед		
	0,1-0,15	Пшеница яровая	Вредная черепашка, трипсы, тли		
	0,4-0,6	Яблоня	Яблонная плодоярка,листовертки	Опрыскивание до и после цветения. Расход рабочей жидкости 600-1200 л/га	20 (2)
	0,1-0,2	Свекла сахарная	Свекловичные блошки, долгоносики, тли, луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	20 (2)
	0,15-0,2	Рапс	Капустная моль		
	0,1-0,15	Картофель	Колорадский жук		
	0,1-0,2	Горох	Клубеньковые долгоносики, гороховая зерновка, гороховая тля		
	0,1	Лен масличный	Трипсы		
	0,1-0,2	Подсолнечник	Луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	20 (1)
					21 (1)

ТРИОМАКС НЕО, с.к. (125 г/л + 100 г/л + 50 г/л) ТОО «Достык-Агро 2012» П-1 04.05.2034 г.	0,1-0,2	Пшеница яровая	Серая зерновая совка	Опрыскивание в период вегетации	20(1)
	0,1-0,15	Пшеница и ячмень яровые	Трипсы		
	0,1	Рапс	Крестоцветные блошки		
	0,2-0,3	Подсолнечник	Луговой мотылек		
Морфей, с.к. (125 г/л + 100 г/л + 50 г/л) ТОО «Агро-Глобал» П-1 31.12.2035 г.	0,1-0,2	Пшеница яровая	Серая зерновая совка	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	28 (2)
	0,1-0,15	Пшеница яровая	Вредная черепашка, трипсы, тли	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га	20 (2)
	0,1	Рапс	Крестоцветные блошки		
	0,15-0,2	Рапс	Рапсовый цветоед		
Концентрация д.в. (+/- 5%) – 130 г/л + 100 г/л + 70 г/л					
Либоро, с.к. (130 г/л + 100 г/л + 70 г/л) ТОО «EcoSave» П-1 20.03.2036 г.	0,1-0,2	Пшеница яровая	Вредная черепашка, трипсы, тли	Опрыскивание в период вегетации	20 (2)
	0,1-0,2	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации	20 (2)
ТИАМЕТ НЕО, с.к. (130 г/л + 100 г/л + 70 г/л) SHANDONG BINNONG TECHNOLOGY CO., LTD. П-1 16.01.2036 г.	0,3-0,5	Яблоня	Яблонная плодожорка, листовертки	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 600 -1200 л/га	20 (2)
	0,1-0,15	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200 -400 л/га	20 (2)
	0,15-0,2	Рапс	Капустная моль, рапсовый цветоед, крестоцветные блошки	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200 -400 л/га	20 (2)
	0,1-0,15	Пшеница яровая	Тли, трипсы, клоп вредная черепашка, серая зерновая совка	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200 -400 л/га	20 (2)

Альфа-циперметрин + тиаметоксам

ФЛЕЙМ, к.с. (117 г/л + 147 г/л) Синтезия Кемп ГмбХ, Германия П-2 31.03.2032 г.	0,1-0,15	Пшеница яровая	Клоп вредная черепашка, тли, злаковые мухи, пшеничный трипс, хлебные блошки, пьявицы	Опрыскивание в период вегетации	20(2)
	0,1-0,15	Ячмень яровой	Блошки, пьявицы, тли		
	0,15	Картофель	Колорадский жук		
	0,1-0,25	Горчица	Крестоцветные блошки, рапсовый цветоед, рапсовый листоед, тли	Опрыскивание в период вегетации	30(2)
	0,1-0,25	Рапс	Крестоцветные блошки, рапсовый пилильщик, листоед, рапсовый цветоед, рапсовый семенной скрытнохоботник, тли		

Ацетамиприд

Концентрация д.в. (+/- 5%) ~ 200 г/кг					
АЦЕТ 200, р.п. (200 г/кг) ТОО «Агро-Хим-Лидер» П-3 28.03.2028 г.	0,08-0,1	Пшеница яровая	Серая зерновая совка	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	20 (1)
	0,06	Пшеница яровая	Клоп вредная черепашка		
	0,035	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 250- 300 л/га	30 (1)
	0,25-0,35	Хлопчатник	Хлопковая совка	Опрыскивание против гусениц младших возрастов. Расход рабочей жидкости 200–250 л/га	30 (1)
	0,1		Тли	Опрыскивание против личинок младших возрастов. Расход рабочей жидкости 200-250 л/га	30 (1)
	0,2		Трипсы, белокрылка		
	0,2	Лук	Луковая муха, трипсы	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 250-300 л/га	30 (1)
	0,045	Участки заселенные саранчовыми	Итальянский прус, мароккская и азиатская саранча, нестадные саранчовые	Опрыскивание против личинок младших возрастов. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	30 (1)
ГОЛДПЛАН 20% в.р.п. (200 г/кг) AGROBEST GRUP, Турция П-3 20.06.2032 г.	0,1-0,2	Яровая пшеница	Трипс, внутрстеблевые вредители	Опрыскивание в период вегетации	28 (1)
	0,15 -0,2	Огурец и томат защищенного грунта	Тепличная белокрылка, тли		3(1)
ГРИНДА, р.п. (200 г/кг) ООО «Агро Эксперт Груп, Россия» П-3 09.02.2028 г.	0,08-0,1	Пшеница яровая	Серая зерновая совка	Опрыскивание в период вегетации	20 (1)
	0,06		Клоп вредная черепашка		
	0,035	Картофель	Колорадский жук		30 (1)
	0,25-0,35	Хлопчатник	Хлопковая совка		
	0,1		Тли	Опрыскивание в период развития личинок	30 (2)
	0,2		Трипсы, белокрылка		
	0,045	Участки заселенные саранчовыми	Итальянский прус, мароккская и азиатская саранча, нестадные саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок	30 (1)
ДОСТЫК, в.д.г. (200 г/кг) ТОО «Астана-Нан» П-3 11.10.2029 г.	0,06-0,1	Пшеница яровая	Клоп вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации против имаго и личинок. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	20(1)
	0,25-0,35	Хлопчатник	Хлопковая совка	Опрыскивание в фазе плодообразования против гусениц младших возрастов. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га.	30(1)
	0,1	Хлопчатник	Тли	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200 л/га	30(1)

	0,2	Хлопчатник	Табачный трипс, хлопковая белокрылка	Опрыскивание против личинок младших возрастов. Расход рабочей жидкости 200 л/га	30(1)
	0,035	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации против жуков и личинок. Расход рабочей жидкости 250-300 л/га	30(1)
	0,225	Лук	Луковая муха, табачный трипс	Опрыскивание в период массового отраждения личинок. Расход рабочей жидкости 250-300 л/га	30(1)
	0,045	Участки заселенные саранчовыми	Итальянский прус, мароккская и азиатская саранча	Опрыскивание против личинок младших возрастов. Расход рабочей жидкости 200- 300 л/га	30(1)
МОСПИЛАН 20%, р.п. (200 г/кг) Филиал АО "Сумитомо Корпорэйшн" в Алматы П-3 25.09.2035 г.	0,2	Хлопчатник	Трипсы, белокрылки	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)
	0,1	Хлопчатник	Тли		
	0,25 - 0,35	Хлопчатник	Хлопковая совка		30 (1)
	0,035	Картофель	Колорадский жук		
	0,06	Пшеница яровая	Вредная черепашка		20 (1)
	0,08 - 0,1	Пшеница яровая	Серая зерновая совка		
Концентрация д.в. (+/- 5%) – 400 г/кг					
ЯКУДЗА, в.д.г. (400 г/кг) Жеджанг Жонгшан Кемикал Груп Сток Ко., Лтд, Китай П-3 08.10.2028 г.	0,05-0,09	Пшеница яровая	Вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации	20 (1)
	0,1-0,15	Томаты и огурцы защищенного грунта	Тепличная белокрылка		1-3 (1)
	0,02-0,04	Картофель	Колорадский жук		30 (1)
	0,06-0,08	Пастбища, участки заселенные саранчовыми, дикая растительность	Азиатская саранча, мароккская саранча, итальянский прус,	Опрыскивание в период развития личинок	30 (1)

Ацетамиприд + бифентрин

Джеронимо, в.д.г. (250 г/кг + 250 г/кг) Arysta LifeScience S.A.S П-3 27.01.2035 г.	0,06-0,12	Рапс	Крестоцветная блошка, рапсовый цветоед	Опрыскивание в период вегетации	30(1)
	0,03-0,06	Пшеница яровая	Пшеничный трипс, тли, блошки		

Ацетамиприд + лямбда-цигалотрин

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 100 г/л + 100 г/л					
ОРГАНЗА, к.с. (100 г/л + 100 г/л) Представительство ООО "ЗЕМЛЯКОФКРОП ПРОТЕКШЕН" в РК П-1 27.09.2032 г.	0,15-0,2	Пшеница озимая и яровая, ячмень яровой.	Клоп черепашка, внутристблевые двукрылые и злаковые тли, пшеничные трипсы, хлебные блошки, пьявица	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	20(1)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 115 г/л + 106 г/л					
ДЕКСТЕР, к.с. (115 г/л + 106 г/л) Представительство ООО «Агро Эксперт Груп» в РК П-1 24.01.2027 г.	0,1-0,2	Пшеница яровая	Клоп вредная черепашка, пьявица, тли, трипсы, хлебные блошки, цикадки, внутристблевые мухи (гессенская, шведская)	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	30 (1)
	0,1-0,2	Пшеница озимая	Клоп вредная черепашка, пьявица, тли, трипсы, хлебные блошки, цикадки		30 (1)
	0,1-0,15	Рапс	Рапсовый цветоед, крестоцветные блошки		20 (1)
	0,1-0,15	Картофель	Колорадский жук		
	0,2-0,25	Участки заселенные саранчовыми	Итальяский прус, азиатская и мароккская саранча, нестадные саранчовые	Опрыскивание в период массового отрождения личинок. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	
02.03.2028 г.	0,1-0,15	Рапс	Капустная белянка, клопы,тли	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	20 (1)
14.03.2032 г.	0,1-0,2	Пшеница яровая	Серая зерновая совка		30(1)
КУПОЛ ЭКСТРА, к.э. (115 г/л +106 г/л) ТОО «Agro Mark Kaz» П-1 21.04.2030 г.	0,1-0,2	Пшеница яровая	Зерновая совка	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200- 300 л/га	20 (2)
	0,1-0,2		Тли, трипсы, клоп вредная черепашка, блошки, злаковые мухи		20 (2)
	0,1-0,15	Горчица, рапс	Рапсовый цветоед, крестоцветные блошки, луговой мотылек		20 (2)
	0,3	Хлопчатник	Хлопковая совка, карадрина, тли, паутинный клещ		20 (2)
	0,3	Бахчевые	Дынная муха		20 (2)
	0,2-0,4	Яблоня	Яблонная плодожорка, зеленая яблонная тля, листовертки, клещи	Опрыскивание в период вегетации, расход рабочей жидкости 1200-1300 л/га	20 (2)
	0,2-0,25	Участки заселенные саранчовыми	Итальянский прус, мароккская и азиатская саранча, нестадная саранча	Опрыскивание в период вегетации, расход рабочей жидкости 200- 300 л/га	
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 200 г/л + 150 г/л					
ЭСПАДА 350, с.к. (200 г/л + 150 г/л) DVA Agro GmbH, Германия П-1 25.01.2027 г.	0,15-0,20	Хлопчатник	Хлопковая совка, карадрина, тли, трипсы,белокрылка, паутинный клещ	Опрыскивание в период появления вредителей	30 (2)
	0,05-0,075	Капуста	Крестоцветные блошки, белянки, капустная моль, капустная совка,тля		30 (1)
	0,05	Рапс	Рапсовый цветоед, рапсовый пилильщик, тли, белянки		20 (2)
07.10.2030 г.	0,075-0,1	Лен	Луговой мотылек, блошки	Опрыскивание в период вегетации	20 (2)
	0,03-0,05	Картофель	Колорадский жук		
	0,075-0,1	Ячмень яровой	Блошки, злаковые мухи		

	0,075-0,1	Яровая пшеница	Трипсы, тли, блошки, злаковые мухи, серая зерновая совка	Опрыскивание в начале отрождения гусениц. Последующие обработки с интервалом 10-15 дней. Расход рабочей жидкости 300-1000 л/га	28 (2)
	0,2-0,25	Яблоня	Яблонная плодоярка, листовёртки		

Бета-циперметрин

ОНИКС, 10% в.с. (100 г/л) Лейтон Агрио Европа Кфт., Венгрия П-1 24.02.2036 г.	0,15	Пшеница яровая	Серая зерновая совка	Опрыскивание в период вегетации	15 (1)
	0,15	Пшеница яровая	Вредная черепашка		15 (2)
	0,15-0,2	Пшеница яровая	Гессенская и шведская муха, пшеничный трипс, стеблевая блошка		20 (2)
	0,15	Участки заселенные саранчовыми	Итальянский прус, мароккская и азиатская саранча	Опрыскивание в период массового отрождения личинок	20 (1)

Бета-цифлутрин

БИНГО, к.с. (125 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-1 09.02.2034 г.	0,04-0,06	Подсолнечник	Луговой мотылек, тли	Опрыскивание в период вегетации	20(1)
	0,06-0,08	Горчица	Крестоцветные блошки,капустная моль, белянки, рапсовый цветоед		20(2)
	0,06-0,08	Рапс			
	0,04-0,06	Лён	Луговой мотылек, трипсы, блошки, плодоярки,совки		
	0,04-0,06	Пшеница яровая	Злаковые (гессенская, шведская) мухи,пшеничный трипс, злаковая тля, хлебные блошки, клоп вредная черепашка, серая зерновая совка		
	0,04-0,06	Ячмень яровой	Хлебная пьявица, злаковые (шведская, гессенская) мухи, хлебные блошки		

Бета-цифлутрин + тиаметоксам

АРНИ, к.с. (60 г/л + 180 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-1 09.02.2034 г.	0,09-0,11	Пшеница яровая	Злаковые (гессенская, шведская) мухи, пшеничный трипс, злаковая тля, хлебные блошки, клоп вредная черепашка, серая зерновая совка	Опрыскивание в период вегетации	20(2)
	0,09-0,11	Ячмень яровой	Хлебная пьявица, злаковые (шведская, гессенская) мухи, хлебные блошки		
	0,11-0,14	Рапс	Крестоцветные блошки, капустная моль, белянки, рапсовыйцветоед		
	0,09-0,11	Подсолнечник	Луговой мотылек, тли		
	0,11-0,14	Горчица	Крестоцветные блошки,капустная моль, белянки, рапсовый цветоед		

Бифеназат

АКРАМАЙТ, 48 %, с.к. (480 г/л) Arysta LifeScience Great Britain Ltd П-2 01.08.2032 г.	0,2-0,25	Хлопчатник	Клещи	Опрыскивание в период вегетации	45(1)
	0,5-0,7	Виноград			14(1)
	0,75-1,0	Яблоня			30(1)
	0,2-0,25	Соя			

Бифентрин

Киллиан Про, к.э. (200 г/л) ФОРВАРД П-1 13.02.2036 г.	0,1-0,15	Рапс яровой и озимый	Капустная моль, крестоцветные блошки, рапсовый пилильщик, рапсовый цветоед, рапсовый семенной скрытнохоботник	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)
	0,1-0,15	Горох, чечевица	Подгрызающая совка, бобовая огневка, луговой мотылек		
	0,1-0,15	Соя, нут	Паутинный клещ, хлопковая совка, подгрызающая совка, бобовая огневка, луговой мотылек		
	0,1-0,15	Хлопчатник	Хлопковая совка, тли, трипсы, паутинный клещ		
	0,05-0,1	Пшеница яровая и озимая	Клоп вредная черепашка, хлебные блошки, хлебные жуки, тли, трипсы, клещи		
	0,05-0,1,	Ячмень яровой и озимый	Клоп вредная черепашка, хлебные блошки, хлебные жуки, тли, трипсы		
	0,05-0,15	Подсолнечник	Подгрызающая совка, луговой мотылек, хлопковая совка, долгоносик		
	0,05-0,15	Кукуруза	Кукурузный мотылек, подгрызающие совки, хлопковая совка		
	0,05-0,15	Лен долгунец и масличный	Блошки, луговой мотылек, трипсы, плодоярки, совки, клопы, долгоносики		

Бифентрин+ тиаметоксам + альфа-циперметрин

БЕРЕТТА МАС.Д. (60 г/л+ 40 г/л + 30 г/л) АО «Щелково Агрохим» П-1 17.03.2033 г.	0,2-0,3	Рапс яровой и озимый	Крестоцветные блошки	Опрыскивание всходов	28(1-2)
	0,2-0,3	Пшеница озимая	Хлебная жужелица		
	0,2-0,3	Картофель	Колорадский жук		30(1-2)
	0,2-0,3	Ячмень яровой и озимый	Пьявицы, злаковыемухи, тли, трипсы.	Опрыскивание в период вегетации	28(1-2)
	0,2-0,3	Пшеница яровая и озимая	Клоп вредная черепашка, хлебные блошки, хлебные жуки, злаковые мухи, тли, трипсы, пьявицы.		
	0,2-0,3	Рапс яровой и озимый	Рапсовый пилильщик, рапсовый цветоед, капустная моль, рапсовый семенной скрытнохоботник		
	0,1-0,3	Горох, чечевица	Тли, гороховая плодоярка, гороховая зерновка		
	0,1-0,3	Соя	Соевая плодоярка, луговой мотылёк.		28(2)
	0,1-0,3	Подсолнечник	Луговой мотылёк , долгоносики, песчаный медляк		
	0,1-0,3	Лен	Луговой мотылёк , льняной трипс		

Бифентрин + хлорантрилипрол

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 159 г/л +106 г/л					
ДЖАЛЕНТРА к.с. (159 г/л +106 г/л) ТОО "ЭфЭмСи Агро Казахстан" П-1 28.09.2033 г.	0,3-0,4	Хлопчатник	Хлопковая совка, тли	Наземное опрыскивание, норма расхода рабочей жидкости 200-400 л/га	20 (1-2)
	0,3-0,4	Подсолнечник, соя	Хлопковая совка, тли	Наземное опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 300-400 л/га.	20(2)
	0,2-0,3	Кукуруза	Луговой мотылек, кукурузные мотыльки, хлопковая совка	Наземное опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га.	7(2)
Киллиан Супер к.с. (159 г/л +106 г/л) ФОРВАРД П-1 16.02.2036 г.	0,3-0,4	Хлопчатник	Хлопковая совка, тли	Опрыскивание в период вегетации	20 (2)
	0,1-0,15	Пшеница яровая и озимая	Клоп вредная черепашка, тли, пшеничный трипс, хлебные блошки		
	0,15-0,25	Пшеница озимая	Хлебная жужелица		
	0,1-0,15	Ячмень яровой и озимый)	Пьявицы, пшеничный трипс, тли		
	0,1-0,15	Овес	Злаковые мухи, пьявицы, цикадки		
	0,1-0,15	Рапс яровой и озимый	Крестоцветные блошки		
	0,1-0,15	Рапс яровой и озимый	Рапсовый пилильщик, рапсовый цветоед, рапсовый семенной скрытнохоботник, капустная моль		
	0,15-0,25	Соя	Многоядные совки, бобовая огневка, соевая плодоярка, клубеньковый долгоносик		
	0,15-0,2	Горох, горох овощной	Гороховая зерновка, гороховая плодоярка, гороховая тля		
	0,15-0,25	Нут	Хлопковая совка, бобовая огневка, луговой мотылек, нутровая минирующая муха		
	0,15-0,25	Подсолнечник	Луговой мотылек, долгоносики, тли		
	0,1-0,2	Свекла сахарная	Свекловичные долгоносики, свекловичные блошки, свекловичные тли, луговой мотылек		
	0,15-0,25	Кукуруза	Луговой мотылек, хлопковая совка, кукурузный стеблевой мотылек		

Гамма-цигалотрин

ВАНТЕКС, м.к.с. (60 г/л) Кеминова А/С, Дания П-1 14.12.2032 г.	0,062	Пшеница яровая	Вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации	15 (1)
	0,041-0,062	Участки заселенные саранчовыми	Итальянский прус, мароккская и азиатская саранча	Опрыскивание в период массового отрождения саранчовых	30 (1)
	0,062-0,083	Рапс	Крестоцветные блошки, капустная моль, луговой мотылек, рапсовый пилильщик, рапсовый цветоед, репная и капустная белянка, тли	Опрыскивание в период вегетации	20 (2)
	0,062- 0,083	Лен масличный	Трипсы, листовые блошки, луговой мотылек		
	0,062- 0,083	Подсолнечник	Луговой мотылек, клопы		
23.10.2034 г.	0,062-0,083	Пшеница яровая	Гессенская и шведская мухи, стеблевые блошки,пшеничный трипс,		20(1)
	0,062-0,083	Пшеница яровая	Серая зерновая совка, хлебные жуки		

Гекситиазокс

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 100 г/л, г/кг					
ИОКСОРРУМ, к.э. (100 г/л) AGROBEST GRUP, Турция П-3 17.02.2030 г.	0,1	Хлопчатник	Клещи	Опрыскивание в период вегетации	20 (2)
ТЕТРАСАН, с.п. (100 г/кг) Моер Кемсайенс Ко, Китай П-4 26.11.2030 г.	0,1	Хлопчатник	Паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации	20 (2)
ТИАЗОКСИС, 10% с.п. (100 г/кг) Наньцзин Эссенс Файн- Кемикал Со., Лтд, Китай П-4 08.01.2034 г.	0,1	Хлопчатник	Паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации	20 (2)
НИССОРАН 10% с.п. (100 г/кг) Филиал АО " Сумитомо Корпорэйшн" в Алматы П-4 17.09.2035 г.	0,3 – 0,6	Яблоня	Клещи	Опрыскивание в период вегетации	30 (1)
	0,24 – 0,36	Виноградная лоза	Клещи		
	0,1	Хлопчатник	Клещи		20 (2)
	0,18 – 0,36	Смородина черная (маточники)	Клещи		- (1)

Дельтаметрин

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 25 г/л					
ДЕЗИМИН 2.5, к.э. (25 г/л) Представительство Компании "DVA Agro GmbH" в городе Петропавловск,Республика Казахстан П-1 18.04.2032 г.	0,3-0,4	Пастбища, участки заселенные саранчовыми, дикая растительность	Нестадные саранчовые, марокканская саранча, итальянский прус, азиатская саранча	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	20 (1)
	0,3	Рапс	Рапсовый цветоед, белянки, блошки		20 (2)
16.03.2032 г.	0,2-0,25	Ячмень	Пьявица, хлебные блошки, злаковые мухи	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200 -400 л/га	20 (1)
	0,3	Пшеница яровая	Зерновая совка		20 (2)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 100 г/л					

ДЕЦИС ЭКСПЕРТ, к.э. (100 г/л) ТОО «Байер Каз» П-2 15.04.2031 г.	0,175	Хлопчатник	Хлопковая совка, белокрылка, подгрызающие совки	Опрыскивание в период вегетации	20 (2)
	0,125	Хлопчатник	Клопы		
	0,1-0,125	Хлопчатник	Тли		
	0,075-0,125	Пшеница	Клоп вредная черепашка, пьявица, тли, трипсы, хлебные жуки		20 (1)
	0,075	Пшеница	Злаковые мухи		
	0,075	Пшеница	Зерновая совка		
	0,125-0,175	Кукуруза	Хлопковая совка		20 (2)
	0,1-0,2	Кукуруза	Кукурузный мотылек		
	0,075-0,125	Рапс	Клопы, белянки, блошки, тли		
	0,1-0,125	Свекла сахарная, подсолнечник	Луговой мотылек		20 (1)
	0,05-0,075	Картофель	Колорадский жук		
	0,075	Ячмень	Пьявица, хлебные блошки, злаковые мухи		
	0,075	Морковь	Морковная муха, листоблошка	30 (2)	30 (1)
	0,1-0,125	Горох	Гороховая тля		
	0,125-0,175	Арбуз, дыня	Подгрызающие совки		
	0,125-0,175	Томат открытого грунта	Подгрызающие совки	15 (1)	20 (2)
	0,05-0,075	Томат открытого грунта	Колорадский жук		
	0,1-0,125	Табак	Тли		
	0,05-0,075	Капуста	Капустная и репная белянки, капустная совка, блошки	-1	30 (2)
	0,125	Капуста	Тли, капустная моль		
	0,05-0,075	Лен	Блошки		
	0,05-0,075	Крестоцветные культуры	Блошки	-	20 (1)
	0,025-0,05	Лиственные и хвойные	Непарный шелкопряд, пяденицы, звездчатый пилильщик – ткач, боярышниковая листовертка, осиновая хохлатка и др., хвое- и листогрызущие вредители		
	0,1-0,175	Пастбища, Участки заселенные саранчовыми, дикая растительность	Нестадные саранчовые, итальянский прус, мароккская и азиатская саранча		
	0,05-0,075	Яблоня	Плодожорки, листовертки	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)
	0,075	Яблоня	Зеленая яблонная тля		
	0,125	Груша	Грушевая тля		
	0,075	Груша	Грушевая медяница		
	0,075	Виноград	Листовертки 1-е поколение		
	0,175	Виноград	Листовертки 2-е и 3-е поколение		
ФЛЭКС ЭКСПЕРТ, к.э. (100 г/л) ТОО «Астана-Нан» П-2 12.01.2032 г.	0,175	Виноград	Листовертки 2-е и 3-е поколение	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)
	0,075	Виноград	Листовертки 1-е поколение	Опрыскивание в период массового отрождения личинок	20 (1)
	0,1-0,175	Пастбища, участки заселенные саранчовыми, дикая растительность	Нестадные саранчовые, итальянский прус, мароккская и азиатская саранча		
	0,025-0,05	Лиственные и хвойные	Непарный шелкопряд, пяденицы, звездчатый пилильщик ткач, боярышниковая листовертка, осиновая хохлатка и др., хвое- и листогрызущие вредители	Опрыскивание в период вегетации	-
	0,05-0,075	Лен	Блошки		-1
	0,125	Капуста	Тли, капустная моль		20 (2)
	0,05-0,075	Капуста	Капустная и репная белянки, капустная совка, блошки		20 (2)
	0,05-0,075	Томат открытого грунта	Колорадский жук		30 (1)
	0,125-0,175	Томат открытого грунта	Подгрызающие совки		20 (2)
	0,075-0,125	Рапс	Клопы, белянки, блошки, тли		30 (1)
	0,125-0,175	Арбуз, дыня	Подгрызающие совки		30 (2)
	0,1-0,125	Горох	Гороховая тля		20 (2)
	0,075	Морковь	Морковная муха, листоблошка		
	0,1-0,125	Подсолнечник, свекла сахарная	Луговой мотылек		
	0,05-0,075	Картофель	Колорадский жук		
	0,1-0,2	Кукуруза	Хлопковая совка, кукурузный мотылек		
	0,075-0,125	Пшеница	Клоп вредная черепашка, пьявица, тли, трипсы, хлебные жуки, злаковые мухи, зерновая совка	Опрыскивание в период вегетации	20 (2)
	0,1-0,175	Хлопчатник	Хлопковая совка, белокрылка, подгрызающие совки, клопы, тли		

Диметоат					
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 400 г/л					
БИ-58 ТОП, к.э. (400 г/л) Кеминова А/С, Дания П-1 19.02.2028 г.	0,8-1,2	Пшеница яровая	Вредная черепашка, гессенская и шведская мухи. Злаковые тли, пшеничный трипс, стеблевые блошки	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)
	1,0-1,2	Пшеница яровая	Серая зерновая совка		20 (1)
	0,8-2,0	Яблоня	Калифорнийская щитовка, яблонная плодожорка, зеленая яблоневая тля, листовертки, яблоневая моль	Опрыскивание до и после цветения	40 (2)
	0,9-1,0	Люцерна (семенные посевы)	Люцерновый клоп, фитономус, люцерновая толстоножка	Опрыскивание в период вегетации	-2
	2,5	Хлопчатник	Тли, паутинный клещ		20 (2)
	0,5-1,0	Рапс	Крестоцветные блошки, капустная моль, луговой мотылек, рапсовый пилильщик, рапсовый цветоед, репная и капустная белянка, тли		30 (2)
	0,5-1,0	Лен масличный	Трипсы, листовые блошки, луговой мотылек		
	0,6-1,2	Подсолнечник	Луговой мотылек, клопы		
БИММЕР, к.э. (400 г/л) Лейтон Агрио Европа Кфт., Венгрия П-1	0,8-1,2	Пшеница яровая	Вредная черепашка, шведская и гессенская муха, злаковые тли, пшеничный трипс, стеблевые блошки	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)
	1,0-1,2	Пшеница яровая	Серая зерновая совка		20 (1)

14.03.2027 г.					
ДАНАДИМ ЭКСПЕРТ, к.э. (400 г/л) Кеминова А/С, Дания П-1 17.01.2033 г.	0,5-1,0	Рапс	Крестоцветные блошки, капустная моль, луговой мотылек, рапсовый пилильщик, рапсовый цветоед, репная и капустная белянка, тли	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)
	0,5-1,0	Лен масличный	Трипсы, листовые блошки, луговой мотылек		
	0,6-1,2	Подсолнечник	Луговой мотылек, клопы		
ДИШАНС, к.э. (400 г/л) ООО «Шанс» П-1 12.03.2029 г.	1,0-1,5	Пшеница яровая	Вредная черепашка, гессенская и шведская муха, злаковые тли, пшеничный трипс	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	30 (2)
	1,0-1,2	Ячмень яровой	Шведская и гессенская муха, злаковые тли, пшеничный трипс		
	0,5-1,0	Горох	Гороховая плодоярка, тли		
	1,5-2,5	Хлопчатник	Клещи, тли, трипсы, белокрылка	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200–300 л/га	20(2)
Дитокс, к.э. (400 г/л) ООО «Интер Групп» П-1 14.11.2034 г.	1,0-1,5	Пшеница	Вредная черепашка, пьявица, мухи злаковые	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	30(2)
	1,0-1,2	Ячмень	Пьявица, внутристеблевые мухи, тли		30(2)
	0,5-0,9	Свекла сахарная	Клопы, листовая тля, минирующие мухи и моль, клещи, цикадки, мертвоеды, блошки	Опрыскивание в фазе вегетации. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	30(2)
	0,8-1,0	Рапс	Рапсовый цветоед, капустная моль, белянки		30(2)
	0,5-1,0	Лен	Трипсы, луговой мотылек, блошки, плодоярки, совки		30(2)
ДИМЕТРОН, к.э. (410 г/л) ARCUS INVEST HOLDING B.V. П-1 12.03.2035 г.	0,5-1,0	Горох	Тли	Опрыскивание в период вегетации	30(2)
	0,6-1,2	Подсолнечник	Луговой мотылек, клопы		
	0,5-1,0	Лен	Трипсы		
	0,8-1,2	Пшеница яровая, ячмень яровой	Злаковые мухи, тли, трипсы		
	1,0-1,2	Пшеница яровая	Серая зерновая совка		30(1)
РОГОР-С, к.э. (400 г/л) Представительство ООО «Агро Эксперт Груп» в РК П-1 31.01.2035 г.	1,0-1,5	Пшеница яровая и озимая	Клоп вредная черепашка, пьявица, злаковые мухи, тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	30 (2)
	1,0-1,2	Ячмень яровой	Пьявица, злаковые мухи, тли, трипсы		20 (2)
	1,5-2,5	Хлопчатник	Клещи, тли		40 (2)
	0,8-2,0	Яблоня, груша	Щитовки, ложнощитовки, клещи, листовёртки, тли, медяница, моли, плодоярки, листогрызущие гусеницы, жуки	Опрыскивание до и после цветения. Расход рабочей жидкости 1000-1500 л/га	40 (2)
	1,5	Яблоня	Яблоневого цветоеда	Опрыскивание до цветения. Расход рабочей жидкости – 800-1000 л/га	40 (1)
	1,0-1,5	Участки заселенные саранчовыми	Итальянский прус, азиатская и марокканская саранча, нестадные саранчовые	Опрыскивание в период массового отрождения личинок. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га	20 (1)
	0,5-1,0	Лен	Трипсы, луговой мотылек, блошки, плодоярки, совки		30 (2)
	1,0-1,5	Пшеница яровая	Серая зерновая совка, гессенская муха, шведская муха	Опрыскивание посевов в период вегетации культуры. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га.	30(2)
СИРОККО, к.э. (400 г/л) АО Фирма «Август» П-1 29.01.2028 г.	1,0-1,5	Пшеница яровая	Злаковые мухи, блошки, трипсы	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200- 400 л/га	30 (2)
	0,8-1,0	Рапс	Рапсовый цветоед		30 (2)
	1,4	Яблоня	Яблонная плодоярка, тли	Опрыскивание до и после цветения. Расход рабочей жидкости 800 - 1200 л/га	40 (2)
31.01.2029 г.	0,5-0,9	Свекла сахарная	Долгоносики, тли	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	30 (2)
	0,8-1,0	Рапс	Капустная моль, белянки		- (2)
	2,0	Картофель	Тли – переносчики вирусных заболеваний		- (2)
	1-1,5	Лук (на семена)	Луковая муха		- (2)
	0,5-1,0	Лук (на семена)	Трипсы		30 (2)
04.07.2032 г.	0,5-1,0	Горох	Гороховая плодоярка, тли		
СТАБИЛИТИ, к.э. (400 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-1 30.07.2031 г.	0,8-1,2	Пшеница яровая	Вредная черепашка, шведская и гессенская мухи, злаковые тли, пшеничный трипс, стеблевые блошки	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)
	0,8-1,2	Рапс	Рапсовый цветоед, клопы, белянки, блошки, тли, капустная белянка, моль, рапсовый пилильщик		

Диметоат + бета-циперметрин

КИНФОС, к.э. (300 г/л + 40 г/л) АО «Щелково Агрохим» П-1 03.05.2032 г.	0,5	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Опрыскивание в период вегетации	30 (1)
	0,15-0,25	Пшеница яровая	Клоп вредная черепашка		
	0,15-0,2	Пшеница яровая	Пьявица		
	0,15-0,25	Свекла сахарная	Свекловичные блошки, долгоносики, тли, подгрызающие совки	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)
	0,15-0,25	Рапс	Крестоцветные блошки, рапсовый цветоед		-1
	0,3-0,5	Соя	Обыкновенный паутинный клещ		30 (1-2)
	0,3	Соя	Соевая плодоярка, луговой мотылек		

Диметоат + гамма-цигалотрин

ДАНАДИМ ПАУЕР, к.э. (400 г/л + 6,4 г/л) Кеминова А/С, Дания П-1 20.03.2034 г.	0,3-0,6	Пшеница яровая	Тли, цикадки, трипсы, гессенская и шведская мухи, клоп вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации	20 (2)
	0,3-0,6	Пшеница яровая	Серая зерновая совка		20 (1)
	0,3-0,6	Пшеница яровая	Хлебные жуки		30 (1)
	0,3-0,6	Ячмень яровой	Цикадки, трипсы, тли		20 (2)
	0,15-0,3	Рапс яровой	Тли, белянки, крестоцветные клопы, луговой мотылек, крестоцветные блошки		20(2)
	0,15-0,3	Лен масличный	Трипсы, луговой мотылек, льняные блошки, совки		30(1)

Дифлубензурон

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 240 г/л					
ГЕРОЛЬД, в.с.к. (240 г/л) АО Фирма «Август»	0,04	Пшеница яровая	Серая зерновая совка	Опрыскивание в период начала отрождения гусениц. Расход рабочей жидкости 50-300 л/га (в зависимости от типа опрыскивателя)	7 (1)

П-3 31.07.2035 г.	0,2	Яблоня	Яблонная плодожорка, листовертки	Опрыскивание в период массовой яйцекладки – начала отрождения гусениц. Расход рабочей жидкости 600-1200 л/га.	15(2)
	0,1	Древесные насаждения	Американская белая бабочка	Опрыскивание в период массовой яйцекладки – начала отрождения гусениц. Расход рабочей жидкости 200-1200 л/га (в зависимости от типа и размера кроны).	-2
	0,2	Хлопчатник	Хлопковая совка, карадрина	Опрыскивание в период массовой яйцекладки – начала отрождения гусениц. Расход рабочей жидкости 50-300 л/га (в зависимости от типа опрыскивателя)	15 (2)
	0,04	Участки заселенные саранчовыми	Итальянский прус, мароккская и азиатская саранча	Опрыскивание в период массового отрождения личинок. Расход рабочей жидкости – 50-300 л/га (в зависимости от типа опрыскивателя)	-1
26.07.2032 г.	0,5-1,0	Рапс, горчица	Капустная моль	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200- 400 л/га	20 (1)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 480 г/л					
Арудиф с.к. (480 г/л) Представительство Nanjing Rinchen International Trading Co., Ltd., в РК П-3 02.11.2033 г.	0,02	Участки заселенные саранчовыми.	Марокская саранча, итальянский прус, азиатская саранча, нестадные саранчовые.	Опрыскивание в период личиночной фазы развития вредителей сплошным методом	-1
	0,04	Древесные насаждения	Американская белая бабочка.	Опрыскивание в период вегетации.	
	0,09-0,12		Горностаевые моли, пяденицы		
	0,12	Лиственные леса, хвойные леса	Сосновая пяденица, сосновая совка		
ГАРПУН, к.с. (480 г/л) Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд, Китай П-3 13.06.2028 г.	0,015-0,02	Пшеница яровая	Серая зерновая совка	Опрыскивание в период вегетации	7 (1)
	0,09-0,12	Хлопчатник	Хлопковая совка, карадрина	Опрыскивание в период массовой яйцекладки – начала отрождения гусениц	15 (3)
	0,02	Участки заселенные саранчовыми	Итальянский прус, мароккская и азиатская саранча	Опрыскивание в период личиночной фазы развития вредителей сплошным методом	- (1)
ГЕРКУЛЕС, 48% с.к. (480 г/л) ТОО «Агрохимия» П-3 21.02.2027 г.	0,015-0,02	Пшеница яровая	Серая зерновая совка	Опрыскивание в период вегетации против гусениц младших возрастов	7 (1)
	0,09-0,12	Лиственные леса	Горностаевые моли, пяденицы, непарный шелкопряд	Опрыскивание в период массовой яйцекладки- начала отрождения гусениц	-1
	0,12	Хвойные леса	Сосновая совка, сосновая пяденица		-1
	0,02	Участки заселенные саранчовыми	Итальянский прус, мароккская и азиатская саранча	Опрыскивание в период личиночной фазы развития вредителей сплошным методом	-1
30.03.2027 г.	0,1	Хлопчатник	Хлопковая совка	Опрыскивание в период массовой яйцекладки- начала отрождения гусениц	15 (2)
ДЕССЕНЛИН, 48% с.к. (480 г/л) Наньцзин Эссенс Файн-Кемикал Со., Лтд, Китай П-3 02.02.2034	0,02	Участки заселенные саранчовыми	Итальянский прус, марокская саранча, нестадные саранчовые	Опрыскивание в период личиночной фазы развития вредителей сплошным методом	-1
	0,015-0,02	Участки заселенные саранчовыми	Азиатская саранча		
	0,1	Хлопчатник	Хлопковая совка	Опрыскивание в период массовой яйцекладки – начала отрождения гусениц	15 (2)
	0,04	Древесные насаждения	Американская белая бабочка	Опрыскивание в период вегетации	-1
	0,09-0,12	Лиственные леса	Горностаевые моли, пяденицы,	Опрыскивание в период вегетации. Запрещается сбор грибов, ягод, лекарственных растений в течение 4-х дней. Выход на работу через 1 день, выпас скота и сенокосение без ограничения	-1
	0,12	Хвойные леса	Сосновая пяденица, сосновая совка	Опрыскивание в период вегетации. Запрещается сбор грибов, ягод, лекарственных растений в течение 4-х дней. Выход на работу через 1 день, выпас скота и сенокосение без ограничения	-1
	0,095	Лиственные и хвойные леса	Непарный шелкопряд	Опрыскивание в период массовой яйцекладки – начала отрождения гусениц	-1
ДИМИРОН, 48% с.к. (480 г/л) Вилловод Лтд., Германия П-3 16.03.2028 г.	0,02	Участки заселенные саранчовыми	Нестадные саранчовые	Опрыскивание в период личиночной фазы развития вредителя	- (1)
ДИНАМИТ, 48% с.к. (480 г/л) ТОО «Бартонс Кемикал ГмбХ» П-3 16.03.2031 г.	0,015-0,02	Пшеница яровая	Серая зерновая совка	Опрыскивание в период вегетации	7 (1)
	0,06-0,1	Капуста	Капустная совка, капустная белянка, капустная моль		15 (2)
	0,09-0,12	Лиственные леса	Горностаевые моли, пяденицы, шелкопряды	Опрыскивание в период вегетации. Запрещается сбор грибов, ягод, лекарственных растений в течение 4-х дней. Выход на работу через 1 день, выпас скота и сенокосение без ограничений	-1
	0,04	Древесные насаждения	Американская белая бабочка	Опрыскивание в период вегетации	-1
	0,095	Лиственные и хвойные леса	Непарный шелкопряд	Опрыскивание в период массовой яйцекладки- начала отрождения гусениц	30 (1)
ДИУРОН, с.к. (480 г/л) ТОО «Астана-Нан» П-3 02.10.2030 г.	0,015-0,02	Пшеница яровая	Серая зерновая совка	Опрыскивание в период вегетации	7 (1)
	0,1	Хлопчатник	Хлопковая совка		15 (2)
	0,02	Участки заселенные саранчовыми	Итальянский прус, марокканская саранча и нестадные саранчовые	Опрыскивание в период личиночной фазы развития вредителей сплошным методом	-1
	0,04-0,06	Участки заселенные саранчовыми	Итальянский прус, марокканская саранча и нестадные саранчовые	Опрыскивание в период личиночной фазы развития вредителей при ширине барьера 80-120 метров и межбарьерного пространства 100-200 метров	-1
	0,015-0,02	Участки заселенные саранчовыми	Азиатская саранча	Опрыскивание в период личиночной фазы развития вредителей сплошным методом	-1
	0,03	Участки заселенные саранчовыми	Азиатская саранча	Опрыскивание в период личиночной фазы развития вредителей барьерным методом, соотношение барьеров и межбарьерного пространства 1:1	-1
	0,09-0,12	Лиственные леса	Горностаевые моли, пяденицы, шелкопряды	Запрещается сбор грибов, ягод, лекарственных растений в течении 4-х дней. Выход на работу через 1 день, выпас скота и сенокосение без ограничений	-1
	0,12	Хвойные леса	Сосновая пяденица	Опрыскивание в период вегетации	-1
	0,095	Лиственные и хвойные леса	Непарный шелкопряд		-1
	0,04	Рапс	Рапсовый цветоед (личинки), капустная белянка		7(2)
	0,05-0,06	Рапс	Рапсовый пилильщик		7(2)
	0,1	Капуста	Капустная совка, капустная белянка	Опрыскивание в период яйцекладки	15 (2)

	0,1	Яблоня	Яблонная плодожорка	Опрыскивание в период яйцекладки	15 (2)
ДИФЛУР, 48% с.к. (480 г/л) ТОО «Агро Глобал» П-3 20.08.2029 г.	0,015-0,02	Пшеница яровая	Серая зерновая совка	Опрыскивание в период вегетации	20 (1)
	0,1	Хлопчатник	Хлопковая совка, карадрина		
	0,02	Участки заселенные саранчовыми	Мароккская саранча, итальянский прус, нестадные саранчовые	Опрыскивание в период личиночной фазы развития вредителей	-1 -1
	0,015- 0,02	Участки заселенные саранчовыми	Азиатская саранча		
ДИФУЗ, 48% с.к. (480 г/л) Arysta LifeScience Benelux Sprl П-3 5.03.2031 г.	0,015- 0,02	Пшеница яровая	Серая зерновая совка	Опрыскивание в период вегетации	7 (1)
	0,1	Яблоня	Яблонная плодожорка	Опрыскивание в период яйцекладки	15 (2)
	0,1	Капуста	Капустная совка, капустная белянка, капустная моль		
	0,09-0,12	Лиственные леса	Горностаевые моли, пяденицы, шелкопряды	Опрыскивание в период вегетации. Запрещается сбор грибов, ягод, лекарственных растений в течение 4-х дней. Выход на работу через 1 день, выпас скота и сенокосение без ограничений	-1
	0,04	Древесные насаждения	Американская белая бабочка	Опрыскивание в период вегетации	-1
	0,095	Лиственные и хвойные леса	Непарный шелкопряд	Опрыскивание в период массовой яйцекладки-начала отрождения гусениц	30 (1)
	0,02	Участки заселенные саранчовыми	Итальянский прус	Опрыскивание в период личиночной фазы развития вредителей сплошным методом	-1
	0,015-0,02		Азиатская саранча		-1
	0,03	Участки заселенные саранчовыми	Азиатская саранча	Опрыскивание в период личиночной фазы развития вредителей барьерным методом, соотношение барьеров и межбарьерного пространства 1:1	-1
ЭЛИОН, с.к. (480 г/л) Синтезия Кеми ГмБХ, Германия П-3 20.04.2028 г.	0,02	Участки заселенные саранчовыми	Итальянский прус, мароккская саранча, нестадные виды саранчовых	Опрыскивание в период личиночной фазы развития вредителя	-1
	0,04-0,1	Рапс	Капустная белянка, капустная моль, рапсовый цветоед (личинки)	Опрыскивание в период вегетации	7(2)
	0,1	Хлопчатник	Хлопковая совка	Опрыскивание в период массовой яйцекладки – начало отрождения гусениц	15(2)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 800 г/кг					
Шансилин, в.д.г. (800 г/кг) ООО "Шанс" П-2 09.02.2034 г.	0,3-0,6	Яблоня	Яблонная плодожорка, листовертки	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 800-1500 л/га	60(2)
	0,0156	Пастбища, участки заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок. Расход рабочей жидкости – 25-50 л/га. Срок безопасного выхода людей для сбора дикорастущих грибов и ягод – 30 дней. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях – не ранее 7 дней	-(1)
	0,05	Хлопчатник	Хлопковая совка, карадрина	Опрыскивание в период массовой откладки – начала отрождения гусениц. Расход рабочей жидкости 200- 400 л/га	15 (2)

Дифлубензурон + ацетамиприд

ТВИНГО ЕВРО, м. д., (180 г/л+ 45 г/л) АО «Щелково Агрохим» П-3 30.01.2033 г.	0,75-1,0	Яблоня	Яблонная плодожорка, листовертка, яблонный цветоед	Опрыскивание в период вегетации.	20 (2)
---	----------	--------	--	----------------------------------	--------

Дифлубензурон + имидаклоприд

ЛОКУСТИН, к.с. (125 г/л + 110 г/л) АО «Щелково Агрохим» П-1 22.04.2029 г.	0,08-0,12	Пастбища, участки заселенные саранчовыми	Итальянский прус, азиатская саранча, мароккская саранча, нестадные саранчовые	Опрыскивание в период массового отрождения личинок. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	-1
	0,1-0,2	Рапс	Рапсовый цветоед, капустная белянка	Опрыскивание в период вегетации	30(1-2)
	0,1-0,3	Рапс	Капустная белянка, капустная моль		

Дифлубензурон + эсфенвалерат

СКАРАБЕИ, с.э. (300 г/л + 88 г/л) АО Фирма «Август» П-1 13.03.2035 г.	0,2-0,4	Рапс	Рапсовый цветоед	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200- 400 л/га	21 (1)
	0,4	Рапс	Капустная моль		

Диафентиурон

Диферон, с.к. (500 г/л) Представительство Nanjing Rinchen International Trading Co., Ltd., в РК П-2 27.09.2034 г.	0,8	Хлопчатник	Клещи, трипсы, тли	Опрыскивание в период вегетации.	30 (2)
--	-----	------------	--------------------	----------------------------------	--------

Зета-циперметрин

ТАРЗАН, в.э. (100 г/л) АО «Щелково Агрохим» П-1 31.10.2035 г.	0,1	Участки, заселенные саранчовыми	Итальянский прус, мароккская и азиатская саранча	Опрыскивание в период массового отрождения личинок	30(1)
--	-----	---------------------------------	--	--	-------

Метомил + бифентрин

Метомакс, к.с. (250 г/л + 25 г/л) ТОО «ФМРус» П-1 25.12.2035 г.	1-1,2	Пшеница яровая, ячмень яровой	Тли, трипсы, клоп вредная черепашка, серая зерновая совка	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200 -300 л/га	15(1)
	1-1,2	Подсолнечник, хлопчатник	Хлопковая совка		
	1-1,2	Лен	Трипсы, блошки		
	1-1,2	Соя, горох,нут	Бобовая огневка, гороховая плодожорка, гороховая зерновка, тли		
	1-1,2	Яблоня	Яблонная плодожорка, тли, клещи	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 600 -800 л/га	15(2)

Индоксакарб

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 150 г/л					
--	--	--	--	--	--

АВАНТ, к.э. (150 г/л) ТОО «ЭфЭмСи Агро Казахстан» П-1 07.11.2034 г.	0,35-0,40	Яблоня	Яблонная плодояорка, листовёртки	Опрыскивание в начале отрождения гусениц. Последующие обработки с интервалом 10-15 дней. Расход рабочей жидкости 300-1000 л/га	10 (2)
04.04.2034 г.	0,2-0,3	Виноград	Гроздевая листовёртка	Опрыскивание в начале отрождения гусениц	10 (2)
25.02.2029 г.	0,14-0,2	Рапс	Капустная моль	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	28 (2)
13.01.2031 г.	0,4	Хлопчатник	Хлопковая совка, карадрина (гусеницы младших возрастов)	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200- 400 л/га	14 (2)
24.03.2027 г.	0,14-0,2	Рапс	Крестоцветные блошки	Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	28 (2)
	0,14-0,2	Рапс	Рапсовый цветоед	Опрыскивание в период бутонизации. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	
АСКУМ, к.э. (150 г/л) ТОО «A.S.K. Technik» (А.С.К.Техник) П-1 25.02.2029 г.	0,4	Хлопчатник	Хлопковая совка, карадрина (гусеницы младших возрастов)	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	14 (1)
	0,35-0,4	Яблоня	Яблонная плодояорка, листовертки	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 1000 л/га	10 (2)
	0,15-0,2	Рапс	Крестоцветные блошки, рапсовый цветоед	Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости 100-200 л/га	30 (2)
	0,2-0,3	Виноград	Гроздевая листовертка	Опрыскивание в начале отрождения гусениц	10 (2)
ЭЛИСТЕР, к.с. (150 г/л) Синтезия Кеми ГмБХ, Германия П-1 26.03.2029 г.	0,2-0,3	Чечевица	Луговой мотылек, гороховая плодояорка, совка- гамма	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	20 (1)
	0,2-0,3	Лен масличный	Луговой мотылек, льняная плодояорка, совка- гамма		20 (1)
	0,17-0,25	Кукуруза	Хлопковая совка		10(2)
	0,2-0,4	Хлопчатник	Хлопковая совка (гусеницы младших возрастов)		14(1)
	0,2-0,3	Горчица	Капустная моль, капустная белянка, рапсовый цветоед		30(2)
	0,2-0,3	Рапс	Капустная моль, капустная белянка, рапсовый цветоед		30(1)
ГЕЛИФАС, к.э. (150 г/л) ООО «Шанс» П-1 26.07.2032 г.	0,35-0,4	Яблоня	Яблонная плодояорка, листовертки	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 1000-1500 л/га	10(2)
	0,25-0,3	Виноград	Листовертки	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 800-1200 л/га	10(2)
	0,14-0,2	Рапс	Крестоцветные блошки, рапсовый цветоед, капустная моль	Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости 100-200 л/га	28(2)
	0,4	Хлопчатник	Хлопковая совка, карадрина (гусеницы младших возрастов)	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200- 400л/га	14 (1)
	0,2-0,3	Чечевица	Луговой мотылек , гороховая плодояорка, совка- гамма		20 (1)
	0,2-0,3	Лен масличный	Луговой мотылек , льняная плодояорка, совка-гамма		20 (1)
	0,2-0,25	Капуста белокочанная	Капустная моль, капустная совка, белянка		15(2)
ХОПРОЛ, к.с. (150 г/л) ШАНДОНГ ВЕЙФАНГ РЕЙНБОУ КЕМИКАЛ КО., ЛТД П-2 23.07.2035 г.	0,35- 0,4	Яблоня	Яблонная плодояорка, листовертки	Опрыскивание в период вегетации	10 (2)
	0,25- 0,3	Виноград	Листовертки		
	0,2-0,3	Лен	Луговой мотылек , льняная плодояорка, совка-гамма	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200- 400 л/га	20 (1)
	0,4	Хлопчатник	Хлопковая совка, карадрина (гусеницы младших возрастов)	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200- 400 л/га	14 (2)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 300 г/л					
ИНДОКС 30, в.д.г. (300 г/кг) Представительство Компании «DVA Agro GmbH» в городе Петропавловск, РК П-1 14.03.2032 г.	0,075-0,1	Рапс	Крестоцветные блошки, рапсовый цветоед, капустная моль	Опрыскивание в период вегетации	28 (2)

Индоксакарб+абамектин

СТИЛЕТ, м.д. (100 г/л + 40 г/л) АО Фирма «Август» П-1 12.07.2033 г.	0,2-0,3	Хлопчатник	Хлопковая совка, паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200- 400 л/га	28 (1)
	0,2-0,3	Рапс	Рапсовый цветоед, крестоцветные блошки, капустная моль		
	0,3-0,4	Лук	Трипсы		
	0,2-0,3	Кукуруза	Кукурузный мотылек, хлопковая совка, луговой мотылек		
	0,2-0,3	Соя	Хлопковая совка, луговой мотылек, паутинный клещ, соевая плодояорка	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 600- 1200 л/га	25 (1)
	0,45-0,55	Яблоня	Яблонная плодояорка, листовертки, клещи	Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости 100-200 л/га	
	0,3-0,4	Лук	Подгрызающие совки	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости- 200- 400 л/га	
	0,2-0,3	Подсолнечник	Подгрызающие совки, луговой мотылек		

Изоциклосерам

Виртэнтó 400 , с.к. (400 г/л) SYNGENTA CROP PROTECTION AG П-3 07.03.2035 г.	0,075 –0,1	Яблоня	Клещи	Опрыскивание в период вегетации. Добавление прилипателя Адигор 0,2 %.	10 (2)
	0,1 – 0,15	Яблоня	Клещи	Опрыскивание в период вегетации.	
	0,15 – 0,225	Яблоня	Плодожорки		
	0,0125-0,025	Картофель	Колорадский жук		
	0,075 –0,1	Томаты открытого грунта	Томатная минирующая моль	10 (1)	
	0,15-0,185	Хлопчатник	Хлопковая совка		

Имидаклоприд

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 200 г/л					
ВАРРАНТ, в.к. (200 г/л)	0,05-0,07	Пшеница яровая	Серая зерновая совка (гусеницы младших возрастов)	Опрыскивание в период вегетации	20 (1)

Кеминова А/С, Дания П-1 24.02.2027 г.	0,07	Пшеница яровая	Вредная черепашка	Опрыскивание в период массового отрождения личинок	30 (2)
	0,06	Пшеница яровая	Злаковые мухи, блошки, трипсы		20 (2)
	0,05-0,07	Участки заселенные саранчовыми	Итальянский прус, азиатская саранча, мароккская саранча		30 (1)
ВИНКА ИМИДАКЛОПРИД 200 В.Р. (200 г/л) ЧЖЭЦЗЯН СИНЬАНЬХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ГРУППА П-1 10.11.2033 г.	0,15-0,225	Хлопчатник	Хлопковая тля	Опрыскивание. Метод: внекорневое опрыскивание. Время обработки:применять при первом появлении насекомых на посевах и повторить через 7 дней для успешной борьбы. Ограничения: Не распыляйте в ветреные дни или в течение 1 часа ожидается дождь. Этот продукт токсичен для пчел и шелкопряда. Не применяйте около цветущих растений, домов шелкопряда и тутовых садов.	30(2)
ДАКЛОПРИД, 20% в.к. (200 г/л) Моер Кемсайенс Ко. Лтд., Китай П-1 10.12.2028 г.	0,07	Пшеница яровая	Вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)
	0,06	Пшеница яровая	Гессенская и шведская мухи, пшеничный трипс		30 (1)
	0,07	Пшеница яровая	Серая зерновая совка		20 (1)
	0,05-0,07	Участки заселенные саранчовыми	Итальянский прус, азиатская и мароккская саранча	Опрыскивание в период массового отрождения личинок	30 (1)
ИМПЕРАТОР 20 % в.к. (200 г/л) ТОО «Agro Mark Kaz» П-2 08.06.2033 г.	0,25-0,55	Яблоня	Яблонная плодожорка, зеленая яблонная тля	Опрыскивание в период вегетации	30 (1)
	2,0	Томаты, огурцы, перцы защищенного грунта	Тли, трипсы, белокрылки		
	0,1-0,2	Табак	Тли, трипсы		
	0,1-0,2	Картофель (семенные посевы)	Тли-переносчики вирусных заболеваний		
	0,05-0,07	Картофель	Колорадский жук		
	0,05-0,07	Пшеница яровая	Серая зерновая совка (гусеницы младших возрастов)		
	0,07	Пшеница яровая	Вредная черепашка		30 (2)
	0,06	Пшеница яровая	Гессенская, шведская муха, блошки, трипсы	30 (1)	
ИМИДАШАНС, в.р.к. (200 г/л) ООО «Шанс» П-1 07.03.2029 г.	0,2-0,25	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Обработка всходов. Расход рабочей жидкости 100-200 л/га	60 (1)
	0,1-0,15	Пшеница яровая и озимая	Вредная черепашка	Опрыскивание посевов в период вегетации.Расход д рабочей жидкости – 200-400 л/га	20 (1)
	0,1	Картофель	Колорадский жук		
	0,05-0,075	Пастбища, Участки заселенные саранчовыми, дикая растительность	Итальянский прус, азиатская саранча, мароккская саранча, нестадные саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных препаратом площадях – не ранее 14 дней, сбор грибов и ягод в сезон обработки не разрешается. Расход рабочей жидкости: наземное опрыскивание – 200-400 л/га	-1
ИМИДОК, в.р.к. (200 г/л) ООО «Форвард», Россия П-1 28.01.2029 г.	0,07	Пшеница яровая	Вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)
	0,05-0,07	Пшеница яровая	Серая зерновая совка		20 (1)
	0,06	Пшеница яровая	Злаковые мухи, блошки, трипсы		30 (1)
	0,05-0,07	Картофель	Колорадский жук		
	0,05-0,07	Участки заселенные саранчовыми	Итальянский прус, азиатская и мароккская саранча	Опрыскивание в период массового отрождения личинок	
ИМИДОР, 20% в.к. (200 г/л) ТОО «Дегеш Агро ЛТД» П-1 17.02.2030 г.	0,05-0,07	Пшеница яровая	Серая зерновая совка	Опрыскивание в период вегетации против гусениц младших возрастов	20 (1)
21.02.2027 г.	0,07	Пшеница яровая	Вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)
	0,07	Рапс	Рапсовый цветоед, пилильщик, крестоцветные блошки		
	0,06	Пшеница яровая	Злаковые мухи (в т.ч. гессенская и шведская муха),блошки, трипсы	Опрыскивание в период вегетации	30 (1)
	0,05-0,07	Участки заселенные саранчовыми	Итальянский прус, азиатская и мароккская саранча	Опрыскивание в период массового отрождения личинок	30 (1)
ТОО «Агрохимия» 06.12.2028 г.	0,3-0,5	Лиственные и хвойные леса	Березовый минирующий пилильщик, северный березовый пилильщик, звездчатый пилильщик – ткач, боярышница, жимолостный пилильщик, пяденица– шелкопряд, бурополосой и др пилильщики, срытно-живущие вредители	Сплошное опрыскивание в период вегетации.	20 (1)
КИНОКС, в.к. (200 г/л) ТОО «Бартонс Кемикал ГмбХ» П-1 17.02.2030 г.	0,06	Пшеница яровая	Злаковые мухи, блошки, трипсы	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)
	0,07	Пшеница яровая	Вредная черепашка		30 (1)
	0,05-0,07	Пшеница яровая	Серая зерновая совка	Опрыскивание в период массовогоотрождения личинок	
	0,05-0,07	Участки заселенные саранчовыми	Итальянский прус, азиатская и мароккская саранча		
КЛОРИД, в.к. (200 г/л) ТОО «Астана-Нан» П-1 02.10.2030 г.	0,06	Пшеница яровая	Злаковые мухи, блошки, трипсы	Опрыскивание в период вегетации	20 (2)
	0,07	Пшеница яровая	Вредная черепашка		30 (2)
	0,05-0,07	Пшеница яровая	Серая зерновая совка (гусеницы младших возрастов)		20 (1)
	0,05-0,07	Картофель	Колорадский жук		30 (1)
	0,1-0,2	Картофель (семенные посевы)	Тли переносчики вирусных заболеваний		30 (1)
	2	Томаты, огурцы, перцы защитного грунта	Тли, трипсы, белокрылки		30 (1)
	0,05-0,07	Участки заселенные саранчовыми	Итальянский прус, азиатская саранча, мароккская саранча		30 (1)
КОНФИДОР. 20% в.р.к.	0,06	Пшеница яровая	Злаковые мухи. блошки. трипсы	Опрыскивание в период	30 (1)

(200 г/л) Байер КрокСайенс АГ П-1 15.04.2031 г.	0,06	Пшеница яровая	Вредная черепашка	вегетации	30 (2)
	0,05-0,07	Пшеница яровая	Серая зерновая совка (гусеницы младших возрастов)		20 (1)
	0,05-0,07	Картофель	Колорадский жук	30 (1)	
	0,1-0,2	Картофель (семенные посевы)	Тли-переносчики вирусных заболеваний		
	0,1-0,2	Табак	Тли, трипсы		
	2,0	Томаты, огурцы, перцы защищенного грунта	Тли, трипсы, белокрылки		
	0,05-0,07	Участки заселенные саранчовыми	Итальянский прус, мароккская и азиатская саранча	Опрыскивание в период массового отрождения личинок	30 (1)
КРЕЙСЕР, 20% в.к. (200 г/л) ТОО «QADAM Group» (Кадам Групп) П-1 20.03.2028 г.	0,05-0,07	Участки заселенные саранчовыми	Итальянский прус, азиатская и мароккская саранча нестадные, саранчовые	Опрыскивание в период массового отрождения личинок	30 (1)
	0,06	Пшеница яровая	Вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)
	0,06		Злаковые мухи, блошки, трипсы		30 (1)
	0,05-0,07		Серая зерновая совка		20 (1)
ЛУИДОР, в.р.к. (200 г/л) АО «Щелково Агрохим» П-1 12.02.2031 г.	0,06	Пшеница яровая	Злаковые мухи в т.ч. шведская и гессенская муха	Опрыскивание в период вегетации	30 (1)
	0,05-0,07	Пшеница яровая	Серая зерновая совка	Опрыскивание в период вегетации против гусениц младших возрастов	20 (1)
	0,05-0,07	Участки заселенные саранчовыми	Итальянский прус, азиатская и мароккская саранча	Опрыскивание в период массового отрождения личинок	30 (1)
	0,05-0,07	Картофель	Колорадский жук		
	2,0	Огурцы, томаты защищенного грунта	Белокрылки, тли, трипсы		
НУПРИД 200, к.с. (200 г/л) Нуфарм, Австрия П-1 21.02.2030 г.	0,06	Пшеница яровая	Ячменная шведская муха, стеблевые блошки, пшеничный трипс	Опрыскивание в период вегетации	30 (1)
	0,05-0,07	Картофель	Колорадский жук		
	0,1-0,2	Картофель (семенные посевы)	Тли – переносчики вирусных заболеваний		
	2,0	Томаты, огурцы, защищенного грунта	Тли, табачный трипс, тепличная белокрылка		3 (2)
	0,25-0,55	Яблоня	Яблонная плодожорка, зеленая яблонная тля	30 (1)	
	0,05-0,07	Участки заселенные саранчовыми	Итальянский прус, азиатская и мароккская саранча	Опрыскивание в период массового отрождения личинок	30 (1)
ПИЛАРКИНГ, 20% в.к. (200 г/л) Пиларквим (Шанхай) Ко. Лтд. Китай П-1 24.02.2027 г.	0,06	Пшеница яровая	Злаковые мухи, блошки, трипсы	Опрыскивание в период вегетации	20 (2)
	0,05-0,07	Пшеница яровая	Серая зерновая совка (гусеницы младших возрастов)		20(1)
	0,07	Пшеница яровая	Вредная черепашка		30 (2)
	0,05-0,07	Участки заселенные саранчовыми	Итальянский прус, азиатская саранча, мароккская саранча	Опрыскивание в период массового отрождения личинок	30 (1)
СТРАГЛ, в.к. (200 г/л) ТОО «Агро Глобал» П-1 24.10.2026 г.	0,05-0,07	Пшеница яровая	Серая зерновая совка (гусеницы младших возрастов)	Опрыскивание в период вегетации	20 (1)
	0,05-0,07	Участки заселенные саранчовыми	Итальянский прус, азиатская саранча, мароккская саранча	Опрыскивание в период массового отрождения личинок	30 (1)
	0,07	Пшеница яровая	Вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)
	0,05-0,07	Картофель	Колорадский жук		20 (1)
ТАНРЕК, в.р.к. (200 г/л) АО Фирма «Август» П-1 14.07.2035 г.	0,05-0,07	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га.	20 (1)
	0,06	Пшеница яровая	Гессенская и шведская мухи, блошки, пшеничный трипс	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 25-300 л/га.	20 (2)
	0,07	Пшеница яровая	Серая зерновая совка		20(1)
	0,05-0,07	Участки заселенные саранчовыми	Итальянский прус, мароккская саранча	Опрыскивание в период массового отрождения личинок. Расход рабочей жидкости – 25-300 л/га.	30 (1)
	0,07	Участки заселенные саранчовыми	Азиатская саранча	Опрыскивание в период массового отрождения личинок. Расход рабочей жидкости – 25-300 л/га	30 (1)
ЦЕЗАРЬ, в.к. (200 г/л) ТОО «Агро-Хим-Лидер» П-1 14.03.2028 г.	0,06	Пшеница яровая	Гессенская, шведская мухи, блошки, трипсы	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	30 (1)
	0,07	Пшеница яровая	Вредная черепашка		
	0,05-0,07	Пшеница яровая	Серая зерновая совка (гусеницы младших возрастов)	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 250-300 л/га	
	0,05-0,07	Картофель	Колорадский жук		
	0,1-0,2	Картофель (семенные посевы)	Тли –переносчики вирусных заболеваний		
	2,0	Томаты, огурцы защищенного грунта	Тли, трипсы, белокрылки		30 (1)
	0,25-0,55	Яблоня	Яблонная плодожорка, зеленая яблонная тля	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 500 л/га	30 (1)
	0,05-0,07	Участки заселенные саранчовыми	Итальянский прус, мароккская и азиатская саранча, нестадные саранчовые	Опрыскивание в период массового отрождения личинок. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	30 (1)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 700 г/кг					
ГАМБЕЙ, в.д.г. (700 г/кг) Шандонг Биннонг Технолоджи Ко. Лтд, Китай П-1 18.01.2028 г.	0,05	Пшеница озимая	Вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации	30 (1)
	0,03	Пшеница яровая и озимая	Пшеничный трипс		
	0,03-0,05	Картофель	Колорадский жук		

ДРАЙВЕР, в.д.г. (700 г/кг) ARCUS INVEST HOLDING B.V П-1 26.12.2032 г.	0,02-0,03	Рапс	Крестоцветные блошки	Опрыскивание в период вегетации	30 (1)
	0,03	Ячмень яровой	Гессенская и шведская мухи, стеблевые блошки, серая зерновая совка		
	0,02-0,03	Пшеница яровая			
ДИМИПРИД, 70% в.д.г. (700 г/кг) ДВА Агро ГМБХ, Германия П-1 13.01.2031 г.	0,02-0,03	Пшеница яровая	Злаковые мухи, в т.ч. гессенская муха, блошки, трипсы	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)
	0,02-0,03	Пшеница яровая	Серая зерновая совка	Опрыскивание в период массового появления гусениц младших возрастов	20 (1)
	0,02-0,03	Рапс	Крестоцветные блошки	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)
	0,02-0,03	Рапс	Рапсовый цветоед, пилильщики, гусеницы чешуекрылых		20 (2)
	0,02-0,03	Участки заселенные саранчовыми	Итальянский прус, азиатская саранча, мароккская саранча, нестадные саранчовые	Опрыскивание в период массового появления личинок младших возрастов	30 (1)
КОМАНДОР 70 % в.д.г. (700 г/кг) ТОО «HARVEST Ltd (Харвест Ltd)» П-1 20.03.2034 г.	0,02-0,03	Яровая пшеница	Гессенская и шведская мухи, стеблевые блошки, клоп вредная черепашка, трипс, серая зерновая совка, клопы.	Опрыскивание в период вегетации	20 (1)
МАРЛЕНОПРИДА, 70% в.д.г. (700 г/кг) Наньцзин Эссенс Файн- Кемикал Со., Лтд, Китай П-1 30.01.2034	0,02-0,03	Пшеница яровая	Гессенская и шведская мухи, стеблевые блошки	Опрыскивание в период вегетации	30 (1)
	0,02-0,03	Пшеница яровая	Клоп вредная черепашка, серая зерновая совка		20 (1)
	0,25	Хлопчатник	Хлопковая совка, карадрина		30 (2)
	0,03	Участки заселенные саранчовыми	Итальянский прус, мароккская саранча, азиатская саранча, нестадные саранчовые	Опрыскивание в период массового отрождения личинок	30 (1)
РЕЗЮМЕ, в.д.г. (700 г/кг) AGROBEST GRUP, Турция П-1 17.02.2030 г.	0,02-0,03	Пшеница яровая	Вредная черепашка, серая зерновая совка	Опрыскивание в период вегетации	20 (1)
	0,02-0,03	Пшеница яровая	Гессенская и шведская муха, стеблевые блошки		20 (1)
	0,25	Хлопчатник	Хлопковая совка, карадрина		30 (2)
	0,03	Участки заселенные саранчовыми	Итальянский прус, азиатская и мароккская саранча	Опрыскивание в период массового отрождения личинок	30 (1)
	0,07	Участки заселенные саранчовыми	Азиатская саранча		
ТОРЕАДОР ЭКСТРА, в.д.г. (700 г/кг) ТОО «Айбад-2015» П-2 16.06.2031 г.	0,03	Пшеница яровая, ячмень яровой	Трипсы	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200- 400 л/га.	20 (1)
	0,05	Пшеница яровая	Вредная черепашка, хлебные жуки		
	0,03-0,07	Рапс	Крестоцветная блошка, долгоносик, капустная белянка, луговой мотылек		
ХИМСТАР, в.д.г. (700 г/кг) Лейтон Агрио Европа Кфт., Венгрия П-1 14.03.2027 г.	0,03	Пшеница яровая	Серая зерновая совка (гусеницы младших возрастов)	Опрыскивание в период вегетации	20 (1)
	0,03	Пшеница яровая	Вредная черепашка		30 (2)
	0,03	Пшеница и ячмень яровые	Гессенская и шведские мухи, стеблевые блошки, пшеничный трипс		20 (2)
	0,03	Участки заселенные саранчовыми	Итальянский прус, азиатская саранча, мароккская саранча	Опрыскивание в период массового отрождения личинок	30 (1)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 750 г/кг					
ПУНТО ЭКСТРА, в.д.г. (750 г/кг) Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд, Китай П-1 18.09.2027 г.	0,018- 0,028	Пшеница яровая	Шведская муха, стеблевые блошки	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)
	0,018- 0,028	Пшеница яровая	Вредная черепашка, серая зерновая совка	Опрыскивание в период вегетации	20 (1)

Имидаклоприд + альфа-циперметрин

ЭСПЕРО, к.с. (200 г/л + 120 г/л) АО «Щелково Агрохим», П-1 29.04.2029 г.	0,08-0,1	Пшеница яровая	Вредная черепашка, злаковые тли, пшеничный трипс, хлебные блошки	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	20 (1-2)
	0,08-0,1	Ячмень яровой	Злаковые тли, трипсы, хлебные блошки		20 (1-2)
	0,1-0,2	Рапс	Рапсовый цветоед, крестоцветные блошки		34 (2)
	0,1-0,2	Капуста	Крестоцветные блошки, репная белянка, капустная совка	Опрыскивание в период массового отрождения личинок	30 (2)
	0,06 – 0,1	Участки заселенные саранчовыми	Азиатская саранча, мароккская саранча, нестальные саранчовые		-(1-2)
	0,06-0,1	Участки заселенные саранчовыми	Итальянский прус		-1
	0,15	Лён	Трипсы, блошки, луговой мотылёк, совки	Опрыскивание в период вегетации	30(1-2)
	0,1-0,2	Подсолнечник	Луговой мотылёк, долгоносики, тли		
	0,1-0,2	Сафлор	Шалфейная совка, тли, огнёвки, трипсы, луговой мотылёк, сафлорная муха		
	0,1-0,2	Горох, нут	Гороховая зерновка, тли, гороховая плодоярка, хлопковая совка, нуттовый минёр, луговой мотылёк.		14(2)
	0,1-0,2	Чечевица	Тли		20 (1-2)
	0,1-0,2	Горчица	Крестоцветные блошки, рапсовый цветоед		
	0,1-0,2	Кукуруза	Хлопковая совка, луговой мотылек, кукурузный стеблевой мотылек		

Имидаклоприд + бета-цифлутрин

ТЕРРАНО, к.с. (210 г/л + 90 г/л) Синтезия Кеми ГМБХ, Германия П-2 20.04.2028 г.	0,05-0,06	Пшеница яровая	Блошки, трипсы	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)
	0,05-0,06	Картофель	Колорадский жук		

Имидаклоприд + лямбда-цигалотрин

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 150 г/л+50 г/л					
АМАДЕУС, к.э. (150 г/л + 50 г/л) «Жеджанг Жонгшан Кемикал ГрупСток Ко. Лтд.», Китай П-1 21.05.2028 г.	0,08-0,1	Пшеница яровая	Клоп вредная черепашка, тил, пшеничный трипс, хлебные блошки.	Опрыскивание в период вегетации	28(2)
БОРЕЙ, с.к. (150 г/л + 50 г/л) АО Фирма «Август» П-1 29.01.2029 г.	0,1-0,12	Пшеница яровая	Серая зерновая совка (гусеницы младших возрастов)	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	28 (2)
	0,1-0,2	Морковь	Морковная муха		30 (1)
	0,1-0,2	Лук	Луковая муха		30 (1)
	0,1-0,2	Капуста	Крестоцветные блошки, репная белянка, капустная совка		30 (1)
	0,08-0,1	Пшеница озимая	Злаковые мухи		28 (2)
	0,06-0,1	Рапс	Рапсовый цветоед, крестоцветные блошки		20 (2)
	0,3	Яблоня	Яблонная плодoжорка, листовертки	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 800-1500 л/га	30 (1)
	0,12-0,15	Горох	Гороховая зерновка, тли	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200- 300 л/га	30 (2)
	0,3	Виноградная лоза	Листовертки	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 800- 1200 л/га	30 (1)
	0,08-0,12	Пшеница яровая	Хлебная блошка, злаковые мухи, вредная черепашка, пшеничный трипс, злаковые тли	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	28 (2)
	0,08-0,12	Ячмень яровой	Злаковые мухи, злаковые тли		28 (2)
	0,08-0,1	Лен масличный	Трипсы		20 (1)
	0,08-0,1	Картофель	Колорадский жук		20 (2)
	0,1-0,2	Томаты	Колорадский жук, белокрылка		30 (1)
	0,1-0,12	Свекла сахарная	Свекловичная листовая тля, луговой мотылек		20 (2)
	0,08-0,12	Пшеница озимая	Вредная черепашка	28 (2)	
	0,1-0,12	Свекла сахарная	Свекловичные блошки, долгоносики	Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости 100-200 л/га	20 (2)
	0,1-0,2	Участки заселенные саранчовыми	Нестадные саранчовые, итальянский прус, азиатская и мароккская саранча	Опрыскивание в период массового отрождения личинок. Расход рабочей жидкости 200 - 400 л/га	30 (1)
	0,1-0,2	Подсолнечник	Луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 100- 300 л/га	21 (1)
0,15-0,25	Соя	Паутинный клещ, луговой мотылек, соевая плодожорка	48 (2)		
ЗАРЯ, с.к. (150 г/л + 50 г/л) ТОО «Астана-Нан» П-2 15.02.2032 г.	0,1-0,2	Участки заселенные саранчовыми	Итальянский прусс, мароккская и азиатская саранча, нестадные саранчовые	Опрыскивание в период массового отрождения личинок	30 (1)
	0,3	Виноградная лоза	Листовертки	Опрыскивание в период вегетации	30 (1)
	0,3	Яблоня	Яблонная плодoжорка, листовертки		28 (2)
	0,08-0,12	Пшеница яровая	Серая зерновая совка, хлебные блошки, злаковые мухи, вредная черепашка		20 (2)
	0,06-0,1	Рапс	Рапсовый цветоед		30 (1)
	0,08-0,1	Картофель	Колорадский жук		
	0,1-0,2	Томаты	Колорадский жук, белокрылка		
	0,1-0,2	Лук	Луковая муха		
	0,1-0,2	Морковь	Морковная муха		
	0,1-0,2	Капуста	Крестоцветные блошки, репная белянка, капустная совка		
ИМИДАШАНС ПЛЮС, с.к. (150 г/л + 50 г/л) ООО «Шанс» П-1 14.07.2031 г.	0,08-0,1	Пшеница яровая и озимая	Клоп вредная черепашка, тли, хлебные жуки, пшеничный трипс, хлебные блошки	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200- 400 л/га	28(2)
			Хлебные блошки	Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости 100-200 л/га	
	0,08-0,1	Ячмень яровой	Пьявицы, шведские мухи, пшеничный трипс, стеблевые пилильщики, тли	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	38(2)
	0,08-0,1	Рапс	Крестоцветные блошки	Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га	
Рапсовый пилильщик, рапсовый цветоед рапсовый семенной скрытнохоботник			Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га		
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 200 г/л+100 г/л					
Альдебор, к.с. (200 г/л + 100 г/л) ТОО «Достық Агрохимия» П-1 27.04.2036 г.	0,1-0,2	Участки, заселенные саранчовыми	Итальянский прусс, мароккская и азиатская саранча, нестадные саранчовые	Опрыскивание в период массового отрождения личинок	30 (1)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 300 г/л+100 г/л					
ОПЕРКОТ АКРО, к.с. (300 г/л + 100 г/л) ООО«ХИМАГРОМАРКЕТИНГ. РУ»,Россия П-1 18.08.2027 г.	0,05-0,15	Пшеница яровая	Клоп вредная черепашка, гессенская муха, блошки	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)
EVA PLUS, к.с. (300 г/л+ 100 г/ л) ТОО «Farm Agrochemical Products» П-1 11.06.2034 г.	0,04-0,06	пшеница яровая, ячмень яровой	Хлебные блошки, злаковые мухи, клоп вредная черепашка, тли, пшеничный трипс	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)

Имидаклоприд + бифентрин

Галил к.э. (250 г/л + 50 г/л) ООО «АДАМА РУС», Россия П-1 07.04.2033 г.	0,15-0,2	Рапс яровой	Рапсовый цветоед, крестоцветные блошки, клопы, тли	Опрыскивание в период вегетации	30(1)
---	----------	-------------	---	---------------------------------	-------

Клотианидин + бифентрин

КЛОБИ ПЛЮС, к.с. (100 г/л + 100 г/л)	0,75	Хлопчатник	Трипсы, тля, хлопковая совка, паутинный клещ	Опрыскивание в период	20 (2)
---	------	------------	---	-----------------------	--------

ШАНДОНГ ВЕЙФАНГ РЕЙНБОУ КЕМИКАЛ КО., ЛТД, П-3 27.03.2035 г.	0,15-0,20	Картофель	Колорадский жук	вегетации. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	20 (2)
	0,15-0,20	Рапс яровой, рапс озимый	Рапсовый пилильщик, рапсовый цветоед, рапсовый семенной скрытнохоботник		38 (2)
	0,15-0,20	Рапс яровой, рапс озимый	Крестоцветные блошки	Опрыскивание всходов в период вегетации. Расход рабочей жидкости 100- 200 л/га	38 (2)

Клотианидин + лямбда- цигалотрин

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 140 г/л+100 г/л					
Восторг, к.с. (140 г/л + 100 г/л) ООО «Интер Групп» П-1 23.10.2034 г.	0,1-0,15	Пшеница яровая	Клоп вредная черепашка, тли, хлебные жуки, пшеничный трипс, хлебные блошки	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	40 (1)
	0,1-0,15	Ячмень яровой	Пьявицы, пшеничный трипс, тли		40 (1)
	0,1-0,15	Рапс яровой	Рапсовый пилильщик, рапсовый цветоед, рапсовый семенной скрытнохоботник		38 (2)
	0,15-0,25	Соя	Многоядные совки, бобовая огневка, соевая плодoжорка		20 (2)
	0,1-0,15	Рапс яровой	Крестоцветные блошки	Опрыскивание всходов.Расход рабочей жидкости 100-200 л/га	38 (2)
	0,15-0,25	Соя	Клубеньковый долгоносик	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 100-200 л/га	20 (2)
ФЭНСДИ, к.с. (140 г/л + 100 г/л) ФОРВАРД П-1 13.01.2036 г.	0,15-0,25	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Опрыскивание в период вегетации	28 (2)
	0,1-0,15	Ячмень яровой и озимый	Пьявицы, пшеничный трипс, тли		
	0,1-0,15	Овес	Злаковые мухи, пьявицы, цикадки		
	0,1-0,15	Рапс яровой и озимый	Крестоцветные блошки		
	0,1-0,15	Рапс яровой и озимый	Рапсовый пилильщик, рапсовый цветоед, рапсовый семенной скрытнохоботник, капустная моль		
	0,15-0,25	Соя	Многоядные совки, бобовая огневка, соевая плодoжорка, клубеньковый долгоносик		
	0,15-0,2	Горох, горох овощной	Гороховая зерновка, гороховая плодoжорка, гороховая тля		
	0,15-0,25	Нут	Хлопковая совка, бобовая огневка, луговой мотылек, нутовая минирующая муха		
	0,15-0,25	Подсолнечник	Луговой мотылек, долгоносики, тли		
	0,1-0,2	Свекла сахарная	Свекловичные долгоносики, свекловичные блошки, свекловичные тли, луговой мотылек		
	0,15-0,25	Кукуруза	Луговой мотылек, хлопковая совка, кукурузный стеблевой мотылек		
	0,1-0,15	Пшеница яровая и озимая	Клоп вредная черепашка, тли, пшеничный трипс, хлебные блошки		
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 145 г/л+135 г/л					
ПИЛАРКЛОТРИН ЗС, с.к. (145 г/л + 135 г/л) Пиларквим (Шанхай) Ко. Лтд., Китай П-1 21.02.2030 г.	0,1-0,15	Яровая пшеница	Тли, трипсы, вредная черепашка, хлебные жуки, гессенская муха, блошки, серая зерновая совка	Опрыскивание в период вегетации	7(2)
	0,1-0,2	Участки заселенные саранчовыми	Итальянский прус, мароккская саранча	Опрыскивание в период массового отраждения личинок	
	0,1-0,15	Картофель	Колорадский жу́к, тли	Распыление в период вегетации	

Клотианидин + имидаклоприд + лямбда-цигалотрин

ПАРАДЕУС, с.к. (90 г/л + 210 г/л + 105 г/л) Филиал "Hangzhou Ruijiang Crop Science Co .,Ltd., Казахстан" "Hangzhou Ruijiang Crop Science Co., Ltd.,Китай" в городе Алматы П-3 17.02.2035 г.	0,05-0,06	Пшеница яровая	Тли, трипсы, вредная черепашка, хлебные жуки, гессенская муха, блошки, серая зерновая совка, луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации	30(2)
	0,05-0,06	Лен масличный	Льняной трипс, луговой мотылек, блошки, листовертка, совка		-(2)
	0,05-0,06	Подсолнечник	Луговой мотылек, долгоносики, тли, клопы		30(1)
	0,25-0,35	Яблоня	Яблонный цветоед, моль, плодожорка, листовертка, тля		30(2)
	0,06-0,1	Рапс	Капустная моль, белянки, рапсовый цветоед, пилильщик, тли, клопы, крестоцветные блошки, скрытнохоботники		20(2)

Клотианидин + зета- циперметрин

Клонрин, к.э. (150 г/л + 100 г/л) ТОО «ФМРус» П-1 03.02.2035 г.	0,1-0,2	Пастбища, участки, заселенные саранчовым, дикая растительность	Саранчовые	Опрыскивание в период массового отрождения личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных препаратом площадях - не ранее 14 дней, сбор грибов и ягод в сезон обработки не разрешается. Расход рабочей жидкости: при наземном опрыскивании 200-400 л/га.	-(1)
	0,1-0,2	Соя	Акациевая огневка, луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости: при наземном опрыскивании 200-400 л/га.	20(1)
	0,1-0,2	Рапс	Рапсовый цветоед		20(2)
	0,1-0,2	Пшеница яровая	Вредная черепашка, трипсы, тли, пьявица		20(2)
	0,1-0,2	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости 100-200л/га.	20(1)

Лямбда-цигалотрин

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 50 г/л					
АХИЛЛЕС, к.э. (50 г/л) ТОО «Пестициды» П-1 06.01.2031 г.	0,15-0,2	Пшеница яровая и озимая	Злаковые мухи, хлебная пьявица, тли, трипсы, вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации	20 (1)
	0,1	Картофель	Колорадский жук		
	0,1-0,2	Участки заселенные саранчовыми	Итальянский прус, азиатская и мароккская саранча	Опрыскивание в период массового отрождения личинок	20 (1)
	0,1-0,2	Пастбища, участки заселенные саранчовыми, дикая растительность	Нестадные саранчовые	Опрыскивание в период массового отрождения личинок	20 (1)

	0,2	Подсолнечник	Луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200- 300 л/га	30 (1)
	0,2	Кукуруза (на зерно)	Луговой мотылек, долгоносик		30 (1)
	0,3	Пастбища	Луговой мотылек		30 (2)
	0,15-0,2	Рапс	Луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	20 (1)
	0,3	Люцерна (семенные посевы)	Луговой мотылек		30 (1)
ГЮХАРАД, 5% к.э. (50 г/л) Моер Кемсайенс Ко. Лтд., Китай П-1 10.12.2028 г.	0,15	Пшеница яровая	Серая зерновая совка, тли, вредная черепашка, пьявица	Опрыскивание в период вегетации	20 (1)
	0,15-0,2	Пшеница яровая	Гессенская муха		
	0,2-0,3	Виноградная лоза	Гроздевая листовёртка, паутинный клещ		
	0,2	Пшеница яровая	Хлебные жуки, трипсы, блошки, цикадки		20 (2)
	0,2	Пшеница яровая	Шведская муха, стеблевые блошки		
	0,5	Хлопчатник	Хлопковая совка, карадрина, паутинный клещ, тли		
	0,2-0,4	Древесные насаждения	Американская белая бабочка		30 (1)
	0,1	Картофель	Колорадский жук		
	0,4-0,8	Яблоня	Плодожорки, листовёртки, моли, клещи		
	0,1-0,15	Участки заселенные саранчовыми	Итальянский прус, азиатская и мароккская саранча	Опрыскивание в период массового отрождения личинок	
	0,5	Хлопчатник	Хлопковая совка, тли, паутинный клещ, белокрылка	Опрыскивание растений в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200- 300 л/га	30 (2)
	0,1-0,15	Участки заселенные саранчовыми	Итальянский прус, азиатская саранча, мароккская саранча	Опрыскивание заселенных площадей. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	30 (1)
	0,15-0,2	Пшеница яровая	Серая зерновая совка	Опрыскивание растений в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200- 300 л/га	30 (1)
	0,1-0,15	Рапс	Клопы, рапсовый цветоед	Опрыскивание в период вегетации	20(2)
ДАПАТЭ, 5 % к.э. (50 г/л) IFODA AGRO KIMYO HIMOYA, Узбекистан П-2 16.07.2029 г.	0,1-0,2	Лён	Блошки, трипсы		
	0,2	Пшеница яровая и озимая	Пшеничный трипс	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	40 (2)
	0,15	Пшеница яровая и озимая	Вредная черепашка, злаковые тли, пьявица		
	0,15-0,2	Пшеница яровая	Гессенская и шведская муха		
	0,15-0,2	Ячмень яровой	Злаковые тли, пьявица, пшеничный трипс, злаковые мухи, стеблевые пилильщики		
	0,1-0,125	Горох	Тли, клубеньковые долгоносики		
	0,1-0,15	Рапс	Рапсовый цветоед		30 (1)
	0,15-0,2	Свекла сахарная	Луговой мотылек		30 (2)
	0,15	Свекла сахарная	Свекловичные блошки, свекловичная листовая тля		20 (1)
	0,1-0,2	Капуста	Крестоцветные блошки, капустная совка, тля	Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости 100-300 л/га	20 (1)
КАРАТОШАНС, к.э. (50 г/л) ООО «Шанс» П-1 20.03.2029 г.	0,1-0,2	Лук	Луковая муха, трипсы	Опрыскивание в период вегетации	30(1-3)
	0,1-0,2	Морковь	Морковная муха	Опрыскивание в период вегетации	25(1-3)
	0,1-0,2	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации	20(1-3)
	0,3-0,4	Соя	Люцерновая, совка, луговой мотыльк	Опрыскивание в период вегетации	20(1-3)
	0,1-0,2	Лён	Блошки, луговой мотыльк, трипсы	Опрыскивание в период вегетации	30(1-3)
	0,15-0,2	Пшеница яровая, ячмень яровой	Хлебные жуки, трипсы, блошки, вредная черепашка, серая зерновая совка, пьявица	Опрыскивание в период вегетации	40(1-3)
	0,15-0,2	Горох, чечевица	Тли	Опрыскивание в период вегетации	21(1-3)
	0,1-0,2	Подсолнечник	Луговой мотыльк, долгоносики	Опрыскивание в период вегетации	20(1-3)
	0,1-0,2	Подсолнечник	Луговой мотылек, долгоносики	Опрыскивание в период вегетации	30(1-3)
КАРАЧАР, к.э. (50 г/л) АО «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ» П-1 03.02.2036 г.	0,1-0,2	Пшеница	Хлебные жуки, трипсы, блошки, цикадки	Опрыскивание в период вегетации	20 (2)
	0,15	Пшеница	Вредная черепашка, пьявица, тли		20 (1)
	0,15	Пшеница яровая	Серая зерновая совка		20 (1)
	0,15-0,2	Ячмень	Мухи, пьявица, цикадки, трипсы, листовые пилильщики, тли		20 (2)
	0,2	Кукуруза	Кукурузный мотылек		30 (1)
	0,4	Соя	Паутинный клещ		30 (1)
	0,1	Горчица	Рапсовый цветоед		30 (1)
	0,5	Хлопчатник	Клещи, тли, хлопковая совка		30 (2)
	0,1	Картофель	Колорадский жук		20 (2)
КАРАТЭ 050, к.э. (50 г/л) Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария П-1 06.02.2029 г.	0,15	Свекла сахарная	Свекловичные блошки, тли, долгоносики	Опрыскивание в фазе “вилочки”	20 (1)
	0,1	Капуста	Крестоцветные блошки, репная белянка, капустная совка и моли, тля	Опрыскивание в период вегетации	30(1)
	0,4-0,8	Яблоня	Плодожорки, листовёртки, клещи		20 (2)
	0,4	Вишня (маточники)	Паутинный клещ, тли, листовёртки		-2
	0,5	Земляника (маточники)	Паутинный клещ, тли, листовёртки		-2
	0,4	Малина (маточники)	Паутинный клещ, тли, листовёртки		-2
	0,3-0,4	Смородина (маточники)	Паутинный клещ, тли, листовёртки		-2
	0,3	Крыжовник (маточники)	Паутинный клещ, тли, пилильщики		-2
	0,5	Хмель	Клещи, тли		30 (2)
	0,2-0,4	Неплодоносящие сады, декоративные насаждения, лесозащитные полосы	Американская белая бабочка		-2
	0,2-0,3	Виноградная лоза	Гроздевая листовёртка, клещи		30 (2)
	0,1-0,15	Рапс	Рапсовый цветоед		20 (2)
	0,15	Люцерна	Клопы, тли, долгоносики, листовблошки, люцерновая толстоножка		30 (2)
30.01.2033 г.	0,15	Люцерна	Долгоносики	Опрыскивание до отрастания культуры	-1
	0,15	Люцерна	Комплекс сосущих вредителей,	Опрыскивание культуры в фазу бутонизации	-1
	0,15	Люцерна	Вредители семян	Опрыскивание культуры в начале бобообразования	-1
	0,15	Горох (кроме зеленого горошка)	Гороховая тля		30 (1)

	0,1-0,15	Участки заселенные саранчовыми	Итальянский прус, мароккская и азиатская саранча	Опрыскивание в период массового отрождения личинок	20 (1)
	0,1- 0,15	Сафлор	Долгоносик сафлорный, сафлорная муха	Опрыскивание в период вегетации	20 (1)
	0,4-0,5	Яблоня	Плодожорка, листовертка, клещи	Опрыскивание в период вегетации	20 (2)
КАРАТЭ ЗЕОН 050, с.к. (50 г/л) Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария П-1 21.11.2032 г.	0,1-0,15	Участки заселенные саранчовыми	Итальянский прус, мароккская и азиатская саранча	Опрыскивание в период массового отрождения личинок	20(1)
21.02.2034 г.	0,1-0,15	Рапс	Блошки, клопы, тли, рапсовый цветоед, капустная белянка	Опрыскивание в период вегетации	20 (2)
	0,15	Подсолнечник	Луговой мотылек, долгоносики		20(1)
11.06.2034 г.	0,1-0,15	Яровая пшеница	Гессенская муха, блошки, трипсы, серая зерновая совка, вредная черепашка		40 (1)
	0,1-0,15	Яровой ячмень	Злаковые мухи, тли		40 (1)
16.06.2027 г.	0,1-0,15	Картофель	Колорадский жук, тли и цикадки переносчики вирусов	Опрыскивание в период вегетации	20 (2)
	0,2-0,3	Хлопчатник	Хлопковая совка, тли, карадрина		30 (2)
	0,1-0,2	Лен	Блошки, луговой мотылек, трипсы		-2
	0,2-0,3	Кукуруза	Кукурузный мотылек, хлопковая совка		30 (2)
Каратель, к.э. (50 г/л) ТОО «QADAMGroup (КАДАМГрупп)» П-1 19.12.2033 г.	0,15	Пшеница яровая	Серая зерновая совка	Опрыскивание в период вегетации	20(1)
	0,4	Соя	Паутинный клещ		30(1)
	0,5	Хлопчатник	Клещи, тли, хлопковая совка		30(2)
	0,1	Картофель	Колорадский жук		20(2)
	0,1-0,2	Лен	Блошки, луговой мотылек, трипсы		-(2)
	0,1-0,15	Рапс	Рапсовый цветоед		20 (2)
	0,2	Пшеница	трипсы, блошки, цикадки		20 (1)
	0,15	Пшеница	Вредная черепашка, пьявица, тли		20 (2)
	0,15-0,2	Ячмень	Мухи, пьявица, цикадки, трипсы, тли		20 (2)
	0,2	Кукуруза	Кукурузный мотылек		30 (1)
Лассо, к.э. (50 г/л) ООО «Интер Групп» П-1 22.10.2034 г.	0,15	Свекла сахарная	Тли	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200- 400 л/га	20 (1)
	0,15	Свекла сахарная	Свекловичные блошки, долгоносики	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 100-200 л/га	20 (1)
	0,1-0,2	Подсолнечник	Луговой мотылек, долгоносики	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	20 (2)
	0,4	Соя	Обыкновенный паутинный клещ		30 (1)
	0,15-0,2	Ячмень	Мухи, пьявица, цикадки, трипсы, стеблевые пилильщики, тли		20 (2)
	0,15-0,2	Пшеница	Клоп вредная черепашка, тли, пьявица		20 (2)
	0,2	Пшеница	Хлебные жуки, трипсы, блошки, цикадки		20 (1)
ЛЯТРИН, к.э. (50 г/л) ТОО «Астана-Нан» П-1 02.10.2030 г.	0,1-0,15	Участки заселенными саранчовыми	Итальянский прус, азиатская саранча, мароккская саранча	Опрыскивание в период вегетации	20 (1)
	0,1-0,2	Подсолнечник	Луговой мотылек , долгоносики		20 (2)
	0,15	Горох (кроме зеленого горошка)	Гороховая тля		30 (1)
	0,1-0,15	Рапс	Рапсовый цветоед		20 (2)
	0,1	Картофель	Колорадский жук		20 (2)
	0,5	Хлопчатник	Клещи, тли, хлопковая совка		30 (2)
	0,4	Соя	Паутинный клещ		30 (1)
	0,2	Пшеница	Хлебные жуки, блошки, трипсы, цикадки		20 (1)
	0,2	Кукуруза	Кукурузный мотылек		30 (1)
	0,15	Пшеница яровая	Серая зерновая совка		20 (1)
	0,15	Пшеница	Вредная черепашка, пьявица, тли		20 (1)
	0,4-0,8	Яблоня	Плодожорки, листовертки, клещи		30 (1)
	0,14-0,2	Лук	Трипсы		30 (1)
	0,3-0,4	Лук	Луковая муха		30 (1)
	0,1	Капуста	Крестоцветные блошки, репная белянка, капустная совка, моли и тля		30 (1)
ТОРО, 5% к.э. (50 г/л) ТОО «Агро Глобал» П-1 24.10.2026 г.	0,15	Пшеница яровая	Серая зерновая совка (гусеницы младших возрастов), гессенская муха	Опрыскивание в период вегетации	20 (1)
	0,1-0,15	Рапс	Рапсовый цветоед		20 (2)
	0,2	Пшеница яровая	Хлебные жуки		20 (1)
	0,5	Хлопчатник	Хлопковая совка		30 (2)
	0,1-0,15	Участки заселенные саранчовыми	Итальянский прус, азиатская саранча, мароккская саранча	Опрыскивание в период массового отрождения личинок	30 (1)
ПЕТРА, 5% к.э. (50 г/л) AGROBEST GRUP, Турция П-1 17.02.2030 г.	0,2	Пшеница яровая	Хлебные жуки, трипсы, блошки, цикадки	Опрыскивание в период вегетации	20 (1)
	0,15	Пшеница яровая	Вредная черепашка, серая зерновая совка		20 (1)
	0,15-0,2	Пшеница яровая	Гессенская и шведская мухи		20 (1)
	0,5	Хлопчатник	Хлопковая совка, карадрина, тли, паутинный клещ		20 (2)
	0,4-0,8	Яблоня	Плодожорки, листовертки, клещи		20 (2)
	0,2-0,3	Виноградная лоза	Гроздевая листовертка, клещи		30 (2)
	0,2-0,4	Древесные насаждения	Американская белая бабочка		30 (1)
	0,1	Картофель	Колорадский жук		30 (1)
	0,1-0,15	Участки заселенные саранчовыми	Итальянский прус, азиатская и мароккская саранча	Опрыскивание в период массового отрождения личинок	30 (1)
ЦЕПЕЛЛИН ЭДВАНС, к.э. (50 г/л) ООО «Агро Эксперт Груп», Россия П-1 19.07.2031 г.	0,1-0,2	Пшеница яровая	Гессенская муха, шведская муха, трипсы, хлебные блошки, цикадки, пьявица, тли, серая зерновая совка, клоп вредная черепашка	Опрыскивание посевов в период вегетации культуры. Расход рабочей жидкости 200- 300 л/га.	40 (1)
	0,1-0,2	Пшеница озимая	Клоп вредная черепашка, злаковые мухи, пьявица, тли, трипсы, хлебные блошки, цикадки.		
	0,1-0,2	Ячмень яровой	Злаковые мухи (в т.ч. шведская муха) блошки, тли, пьявица, трипсы, цикадки, листовые пилильщики		
	0,1	Картофель	Колорадский жук		20 (2)
	0,2	Картофель	Тли, цикадки- переносчики вирусов		
	0,3-0,5	Хлопчатник	Хлопковая совка, тли, карадрина, белокрылка		

	0,1-0,15	Рапс	Рапсовый цветоед, крестоцветные блошки, клопы, тли, белянки, рапсовый пилильщик, капустная моль, луговой мотылек.	Опрыскивание посевов в период вегетации культуры. Расход рабочей жидкости 100-200 л/га.	20 (2)
	0,5	Хлопчатник	Паутинный клещ	Опрыскивание посевов в период вегетации культуры. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га.	20 (2)
	0,1-0,2	Лен	Блошки, луговой мотылек, трипсы, плодоярки, совки		-2
	0,2-0,3	Кукуруза	Кукурузный мотылек, хлопковая совка, луговой мотылек, долгоносики.		30 (2)
	0,15	Подсолнечник	Луговой мотылек, долгоносики, тли, клопы		20 (1)
	0,4	Соя	Паутинный клещ, луговой мотылек, соевая плодоярка		30 (1)
	0,15	Свекла сахарная	Свекловичная листовая тля, стеблевые блошки, долгоносики	Опрыскивание посевов в период вегетации культуры. Расход рабочей жидкости 100-400 л/га.	20 (1)
	0,1-0,15	Участки заселенные саранчовыми	Итальянский прус, азиатская и мароккская саранча, нестадные саранчовые	Опрыскивание в период массового отрождения личинок. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га.	
Концентрация д.в. (+/- 5%) ~ 100 г/л					
БРЕЙК, м.э. (100 г/л) АО Фирма «Август» П-1 17.10.2028 г.	0,2	Соя	Паутинный клещ, луговой мотылек, соевая плодоярка	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	30 (1)
	0,05-0,075	Рапс	Рапсовый цветоед, крестоцветные блошки		20 (2)
30.03.2033 г.	0,05-0,075	Участки заселенные саранчовыми	Итальянский прус, азиатская и мароккская саранча, нестадные саранчовые	Опрыскивание в период массового отрождения личинок. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	20 (1)
22.12.2027 г.	0,075	Пшеница яровая	Серая зерновая совка (гусеницы младших возрастов)	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200- 400 л/га	20 (1)
	0,075	Пшеница яровая	Вредная черепаха		20 (2)
	0,1	Пшеница яровая	Блошки		20 (1)
	0,075-0,1	Пшеница яровая	Гессенская и шведская муха		20 (2)
	0,2-0,4	Яблоня	Яблонная плодоярка, листовертки, клещи	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 800-1500 л/га	20 (2)
	0,25	Хлопчатник	Хлопковая совка, карадрина, тли, паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	30 (2)
ГУНСЯО, 10% к.э. (100 г/л) Наньцин Эссенс Файн-Кемикал Со., Лтд, Китай П-1 18.10.2033 г.	0,05- 0,075	Участки заселенные саранчовыми	Итальянский прус, мароккская саранча, азиатская саранча, нестадные саранчовые	Опрыскивание в период вегетации	20 (1)
	0,1	Пшеница яровая	Хлебные жуки, трипсы, блошки, цикадки		20 (1)
	0,075	Пшеница яровая	Серая зерновая совка		20 (1)
	0,075-0,1	Пшеница яровая	Гессенская и шведская мухи, стеблевые блошки		30 (1)
	0,075	Пшеница яровая	Вредная черепаха	Опрыскивание в период массового отрождения личинок	20 (1)
	0,25	Хлопчатник	Хлопковая совка, карадрина, паутинный клещ, тли		30 (2)
	0,05	Картофель	Колорадский жук		20 (2)
	0,2-0,4	Яблоня	Плодожорки, листовертки, клещи		20 (2)
	0,1-0,15	Виноградная лоза	Гроздевая листовертка, клещи	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)
	0,1-0,2	Древесные насаждения	Американская белая бабочка		-2
	0,1-0,15	Кукуруза	Кукурузный мотылек, хлопковая совка		30 (2)
	0,2	Соя	Паутинный клещ, луговой мотылек, соевая плодоярка	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200– 300 л/га	30 (1)
	0,05-0,075	Рапс	Рапсовый цветоед	Опрыскивание в период вегетации	20 (1)
	0,1	Ячмень яровой	Злаковые мухи, блошки		20 (2)
	0,075	Рапс	Крестоцветные блошки, рапсовый цветоед		20 (2)
	0,1	Пшеница яровая	Серая зерновая совка, гессенская и шведская муха, пшеничный трипс, блошки		20 (1)
	0,05-0,1	Участки заселенные саранчовыми	Итальянский прус, азиатская и мароккская саранча, нестадные саранчовые		20(1)
	0,05-0,1	Сафлор	Сафлорная муха		30(2)
	0,05-0,1	Подсолнечник	Луговой мотылек, долгоносики		
	0,05-0,1	Чечевица	Клубнековые долгоносики		
	0,05-0,1	Горох	Тли		
	0,05-0,1	Лен	Трипсы		
ИНСЕГАР к.э. (100 г/л). ТОО «Еco Harvest Group» П-2 29.12.2035 г.	0,05-0,075	Участки заселенные саранчовыми	Итальянский прус, азиатская и мароккская саранча, нестадные саранчовые	Опрыскивание в период массового отрождения личинок. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	20(1)
	0,075-0,1	Пшеница яровая	Трипсы, блошки	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	20 (1)
КАРАТ СУПЕР 100, к.э. (100 г/л) ТОО «Агро-Хим-Лидер» П-1 06.02.2029 г.	0,075	Пшеница яровая	Серая зерновая совка (гусеницы младших возрастов), вредная черепаха, тли	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200- 300 л/га	20 (1)
	0,1	Пшеница яровая	Гессенская и шведская мухи, блошки, трипсы		20 (1)
	0,1	Ячмень	Злаковые мухи, трипсы, тли, блошки		20 (1)
	0,07-0,1	Кукуруза (на зерно)	Луговой мотылек, кукурузный мотылек		30 (1)
	0,07-0,1	Сахарная свекла	Луговой мотылек, свекловичные блошки, тли, долгоносики		30 (1)
	0,05	Картофель	Колорадский жук		30 (1)
	0,05	Томаты, огурцы защищенного грунта	Тли, трипсы, белокрылки	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 1000- 2000 л/га	30 (1)
	0,15-0,2	Лук	Луковая муха	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200- 300 л/га	30 (1)
	0,07-0,1	Лук	Трипсы		
	0,25	Хлопчатник	Хлопковая совка, карадрина, тли, паутинный клещ		
	0,2	Соя	Паутинный клещ, луговой мотылек, соевая плодоярка		

	0,05-0,075	Рапс	Рапсовый цветоед,крестоцветные блошки, луговой мотылек		20 (1)
	0,05-0,075	Лен	Блошки		
	0,2-0,4	Яблоня	Яблонная плодоярка, зеленая яблонная тля, листовертки, клещи	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 1000- 1500 л/га	30 (2)
	0,05-0,075	Участки заселенные саранчовыми	Итальянский прус, азиатская и мароккская саранча, нестадные саранчовые	Опрыскивание в период массового отрождения личинок. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	30 (1)
НАНДОР, к.э. (100 г/л) Лейтон Агрио Европа Кфт., Венгрия П-1 14.03.2027 г.	0,1	Пшеница яровая	Серая зерновая совка, гессенская и шведская муха, пшеничный трипс, блошки	Опрыскивание в период вегетации	20 (1)
	0,1	Ячень яровой	Злаковые мухи, блошки		20 (2)
	0,075	Рапс	Крестоцветные блошки, рапсовый цветоед		20 (2)
ПИЛАРИНДЗЯ, м.к.с. (100 г/л) Пиларквим (Шанхай) Ко., Лтд. П-1 21.01.2035	0,075-0,1	Пшеница яровая	Зерновые мухи, хлебные жуки, блошки, тля, трипсы, серая зерновая совка	Опрыскивание в период вегетации	20 (1)
	0,05- 0,075	Участки заселенные саранчовыми	Итальянский прус, азиатская и мароккская саранча, нестадные саранчовые	Опрыскивание в период массового отрождения личинок	20 (1)
	0,05- 0,075	Горчица	Крестоцветные блошки, рапсовый цветоед, луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации	20 (2)
РИХТЕР, к.э. (100 г/л) Юнайтед Агри-Кемикал Компани ГмбХ, Швейцария П-1 12.04.2031 г.	0,1	Пшеница яровая	Серая зерновая совка, гессенская и шведская муха, пшеничный трипс,блошки	Опрыскивание в период вегетации	20 (1)
	0,1	Ячень яровой	Злаковые мухи, блошки		20 (2)
	0,075	Рапс	Крестоцветные блошки, рапсовый цветоед		20 (2)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 250 г/л					
Стэйт, м.к.с. (250 г/л) Arysta LifeScience S.A.S П-1 06.12.2034 г.	0,02-0,06	Лен	Тли, трипсы, льняная плодоярка, крестоцветные блошки	Опрыскивание в период вегетации культуры	20(2)
	0,02-0,03	Рапс яровой	Крестоцветные блошки, рапсовый цветоед		
	0,02-0,04	Ячень яровой	Трипсы, цикадки, пьявицы, тли		
	0,02-0,04	Пшеница яровая	Серая зерновая совка, трипсы, цикадки, пьявицы, тли		20(1)
ГАНИМЕД, к.э. (250 г/л) Синтезия Кемп ГмбХ, Германия П-2 04.05.2031 г.	0,04	Пшеница яровая	Злаковые мухи, трипс, тля, хлебные блошки, вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации	20 (1-2)
	0,03		Серая зерновая совка		20 (1)
	0,04	Ячень яровой	Хлебная пьявица, злаковые мухи, хлебные блошки		20 (1-2)
	0,04	Рапс яровой	Крестоцветные блошки, рапсовый цветоед, тли, белянки, клопы		20 (1)
	0,03	Чечевица горох	Тли, долгоносики		20 (2)
LW-Lambdathrin 250 CS, м.к.с. (250 г/л) Guangdong Liwei Chemical indastry Co.Ltd П-1 23.04.2036 г.	0,04	Пшеница яровая	Злаковые мухи, тля, хлебные блошки, вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации	20(1)
	0,04	Рапс	Блошки, клопы, тли, рапсовый цветоед, капустная белянка	Опрыскивание в период вегетации	20(2)
	0,02-0,03	Участки заселенные саранчовыми	Итальянский прус, мароккская и азиатская саранча	Опрыскивание в период массового отрождения личинок	20(1)

Лямбда-цигалотрин+ ацетамиприд+ тиаметоксам

Гоплит, к.с. (115 г/л+ 95 г/л+ 65 г/л) ООО"Шанс" П-3 24.02.2035 г.	0,3	Яблоня	Яблонный цветоед, яблонная плодоярка, тля	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 600- 1200 л/га	20(1)
	0,1–0,2	Капуста, рапс	Крестоцветные блошки, капустная совка, белянки, капустная моль, крестоцветный клоп	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200- 300 л/га	40(1)
	0,1-0,2	Свекла сахарная	Свекловичные блошки, свекловичные долгоносики, луговой мотылек, совки		20(1)
	0,1–0,2	Лук	Луковая муха		20(1)
	0,1–0,2	Кукуруза	Хлопковая совка, стеблевой мотылек,тли		20(1)
	0,1–0,2	Картофель	Колорадский жук		20(1)
	0,1-0,2	Лен масличный	Льняные блошки, льняной трипс, льняная плодоярка, совки		20(1)
	0,1-0,2	Соя, горох	Гороховая зерновка, плодоярка, тли, клубеньковые долгоносики		40(1)
	0,1-0,2	Подсолнечник	Тли, совки, долгоносики, луговой мотылек		20(1)
	0,1–0,2	Пшеница, ячень яровые и озимые	Хлебные блошки, злаковыемухи, тли, трипсы, пьавица, хлебные жуки, клоп вредная черепашка, пилильщики		20(1)

Малатион

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 570 г/л					
АЛИОТ, к.э. (570 г/л) АО Фирма «Август» П-1 26.05.2030 г.	1,0-1,5	Кукуруза	Луговой мотылек, кукурузный мотылек, хлопковая совка	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200- 400 л/га	20(1)
	1,0-1,5	Подсолнечник	Луговой мотылек, озимая и хлопковая совка, долгоносики		
	0,6-1,0	Соя	Луговой мотылек, хлопковая совка		
	0,6-1,0	Рапс	Капустная моль, луговой мотылек		
	14.06.2031 г.	0,4-0,8	Лен масличный		- (1)
04.07.2032 г	1,0-1,5	Хлопчатник	Хлопковая совка		- (1)
ФУФАНОН, 57% к.э. (570 г/л) CHEMINOVA A/S П-1 19.12.2032 г.	2,0-3,0	Участки заселенные саранчовыми	Итальянский прус, мароккская и азиатская саранча	Опрыскивание в период массового отрождения личинок	20 (1)

Малатион+циперметрин

КАРБОЦИН, в.р.таб. (140 г/кг+ 29 г/кг) ТОО «Научно- производственное объединение» Прикладная химия- Казахстан» П-1 06.01.2033 г.	1 (одна таблетка) на10 литров воды	Томаты защищенного грунта, картофель, яблоня, груша	Белокрылка, колорадский жук, тли, медяницы.	Опрыскивание в период вегетации, томат- 2 литра/10 м ² , картофель- 5 литров/100м ² , яблоня, груша-2- 5 литров/на дерево, в зависимости от возраста и сорта.	5-30 (1-2)
---	------------------------------------	---	---	---	------------

Метафлумизон

АЛЬВЕРДЕ, к.с. (240 г/л) БАСФ СЕ, Германия П-1 20.08.2028 г.	0,2-0,25	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации	20 (3)
	0,75-1,0	Томаты	Подгрызающие совки		
	0,75-1,0	Капуста	Капустная белянка, капустная совка, капустная моль, крестоцветные блошки		

Пропаргит

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 570 г/л					
ОПРАЙТ 57%, к.э. (570 г/л) ТОО «Астана- Нан» П-3 14.12.2031 г.	1,5-2,0	Хлопчатник	Клещи	Опрыскивание в период вегетации	45 (2)
	1,0	Свекла сахарная	Клещи		30 (2)
	1,5-3,0	Яблоня	Клещи		42 (2)
	1,2-1,8	Виноградная лоза	Клещи		45 (2)
	1,3	Соя	Клещи		30 (2)
	0,9-1,2	Вишня	Паутинный клещ	Опрыскивание после сбора урожая	45 (2)
	1,5-2,0	Малина (маточники)	Паутинный клещ		
	1,2-1,6	Смородина (питомники)	Паутинный клещ		
	1,5-2,0	Земляника (маточники)	Паутинный клещ		
	2,0	Огурцы защищенного грунта	Паутинный клещ		3 (2)
ОМАЙТ, 57% в.э. (570 г/л) Arysta LifeScience Great Britain Ltd П-3 31.05.2033 г.	1,3	соя	клещи	Опрыскивание в период вегетации.	45(1)
	2,0	яблоня	клещи		42(2)
	2,0	огурцы защищенного грунта	клещи		3(2)
	1,5-2,0	хлопчатник	клещи		45(2)
	1,0 мл/кв.м	незагруженные зернохранилища	клещи	Опрыскивание. Расход рабочей жидкости 200 мл на 1 кв.м. Допуск и загрузка складов через 24 часа после обработки	1

Пиримифос-метил

КАМЕЛОТ, к.э. (500 г/л) Жеджянг Жонгшан Кемикал ГрупСток Ко., Лтд, Китай П-1 21.05.2028г.	1,0	Пшеница озимая	Трипсы, тли	Опрыскивание в период вегетации	25 (1)
	1,5	Картофель	Колорадский жук		20 (2)
	0,3-1,5	Огурцы, томаты,баклажаны открытого грунта	Белокрылка, клещи, тли, трипсы		20 (2)

Пирипроксифен

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 50 г/л					
ГОЛДАМИРАЛ, к.э. (50 г/л) AGROBEST GRUP, Турция П-1 25.01.2032 г.	100 мл на 100 л воды	Огурец и томат защищенного грунта	Тепличная белокрылка, тли	Опрыскивание в период вегетации	1 (1)
	1,0-1,5	Яблоня	Плодожорка, щитовки		14 (1)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 100 г/л					
Агро Адмирал, к.э. (100 г/л) ТОО «Агро-Хим-Лидер» П-3 18.12.2034 г.	1,0	Яблоня	Яблонная плодожорка, калифорнийская щитовка	Опрыскивание в период вегетации, расход рабочей жидкости 1000- 1500 л/га	14 (1)

Спиромезифен + абамектин

ОБЕРОН РАПИД, к.с. (228,6 г/л + 11,4 г/л) ТОО «Байер КАЗ» П-1 27.02.2035 г.	0,6-0,8	Яблоня	Клещи (боярышниковый, красный)	Опрыскивание во время вегетации в фазу выхода личинок из яйца 0,04% рабочим раствором 1500- 2500 л/га	30 (2)
	0,5-0,8	Томаты защищенного грунта	Паутинный клещ, белокрылка	Опрыскивание во время вегетации при появлении вредителя 0,05% рабочим раствором 500-1500 л/га.	3 (2)
	0,5-0,8	Огурцы защищенного грунта	Паутинный клещ, белокрылка		3 (3)
22.07.2029 г.	0,4-0,6	Хлопчатник	Паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации на ранних стадиях развития клеща.	30 (1)
	0,3-0,6	Соя	Паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации на ранних стадиях развития клеща. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	30 (1)

Спиротетрамат + имidakлоприд

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 120 г/л + 120 г/л					
МОВЕНТО ЭНЕРДЖИ, к.с. (120 г/л + 120 г/л) Байер Кроп Сайенс АГ, Германия П-1 25.07.2029 г.	0,4-05	Картофель	Тли, цикадки, колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200- 400 л/га	7 (2)
	0,6	Яблоня	Тли, щитовки, ложнощитовки, яблонный цветоед, яблонная моль	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 500– 1500 л/га	20 (2)
	0,6	Груша	Грушевая медяница, тли, ложнощитовка		

	0,6	Виноград	Грушевая листовертка	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 400–800 л/га	20 (2)
	0,4-0,6	Лук (кроме на перо)	Трипсы, луковая муха	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 100–300 л/га	7 (2)
	0,4-0,6	Капуста белокочанная	Капустная тля, трипсы	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	7 (2)
	0,4-1,5	Огурец и томат защищенного грунта	Тепличная белокрылка, трипсы, тли	Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,04-0,05% (до 0,06% против трипсов). Расход рабочей жидкости – 1000-3000 л/га	3 (2)
	0,4-1,5	Перцы защищенного грунта	Тепличная белокрылка, трипсы, тли		
	0,4-0,6	Бахчевые	Трипсы, цикадки, тли	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 300-600 л/га	20 (2)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 150 г/кг + 350 г/кг					
Bang Spiroprid, в.д.г. (150 г/кг + 350 г/кг) Jiangxi Huihe Chemical Co. Ltd П-3 09.12.2034 г.	0,4-1,0	Томат защищенного грунта	Тепличная белокрылка, трипсы, тли	Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,04-0,05% (тепличная белокрылка, тли), в концентрации 0,04-0,06%(трипсы). Расход рабочей жидкости 1000-3000 л/га	3 (2)

Спинотерам

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 120 г/л + 120 г/л					
РАДИАНТ, к.э. (120 г/л) ТОО «Кортева Агрисаенс Казахстан» П-1 14.01.2036 г.	0,3-0,4-0,5	Рапс	Капустная моль	Опрыскивание в период вегетации в начале отрождения гусениц. Интервал между обработками 7-14 дней. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	7 (2)
	0,3-0,4-0,5	Рапс	Рапсовый цветоед	Опрыскивание в период вегетации массового отрождения личинок в период бутонизации. Интервал между обработками 7-14 дней. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	
	0,4-0,5	Томат	Хлопковая совка, томатная моль	Опрыскивание в период вегетации в начале отрождения гусениц. Интервал между обработками 7-14 дней. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	3 (2)
	0,4-0,5	Капуста	Капустная моль, капустная белянка, капустная совка	Опрыскивание в период вегетации в начале отрождения гусениц. Интервал между обработками 7-14 дней. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	7(2)
	0,7-0,8-0,9	Яблоня	Яблонная плодожорка, листовертки	Опрыскивание в период вегетации в начале отрождения гусениц. Интервал между обработками 7-14 дней. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га. Концентрация рабочего раствора: 0,07%, 0,08%, 0,09%. Расход рабочей жидкости 800 -1000 л/га	7 (2)
	0,4-0,5	Хлопчатник	Хлопковая совка, карадрина	Опрыскивание в период вегетации в начале отрождения гусениц. Интервал между обработками 7-14 дней. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	21 (2)

Профенофос + лufenuron

РОНФОС, к.э. (500 г/л + 50 г/л) Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд П-1 29.06.2028 г.	0,5-0,7	Хлопчатник	Хлопковая совка, карадрина, белокрылка, паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)
--	---------	------------	--	---------------------------------	--------

Профенофос + лямбда- цигалотрин

САМБО 315, к.э. (300 г/л + 15 г/л) ТОО «Агрохимия» П-1 19.02.2031 г.	1	Хлопчатник	Хлопковая совка, карадрина (гусеницы младших возрастов)	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)
---	---	------------	---	---------------------------------	--------

Профенофос + циперметрин

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 400 г/л + 40 г/л					
Политрин форте, к.э. (400 г/л + 40 г/л) ТОО «Мивоки» П-1 21.01.2036 г.	0,7-1,0	Хлопчатник	Белокрылка, хлопковая совка, паутинный клещ, подгрызающие совки, карадрина	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	30 (2)
	0,35-0,5	Хлопчатник	Тли, трипсы		
	0,5 – 1,0	Лук	Луковая муха, трипсы		
	0,35-0,5	Участки, заселенные саранчовыми	Итальянский прус, мароккская и азиатская саранча, нестадная саранча	Опрыскивание в период массового отрождения личинок. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	6 (1)
ЦИПРОФЕН 440 , к.э. (400 г/л + 40 г/л) ТОО «Agro Mark Kaz» П-1 07.06.2033 г.	0,7-1,0	Хлопчатник	Белокрылка, хлопковая совка, паутинный клещ, подгрызающие совки, клопы, карадрина	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)
	0,35-0,5	Хлопчатник	Тли, трипсы		30 (2)
	0,35-0,5	Участки, заселенные саранчовыми	Итальянский прус, нестадные саранчовые		20 (1)
Фенфос Плюс, к.э. (400 г/л + 40 г/л) Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд П-1 27.03.2036 г.	0,3-0,5	Хлопчатник	Тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации	30(2)
	0,7 - 0,9	Хлопчатник	Хлопковая совка, карадрина (гусеницы младших возрастов), белокрылка, паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации	30(2)

Тебуконазол + флутриафол + клотианидин (инсекто-фунгицид)

Концентрация д.в. (+/- 5%)– 337 г/л + 78 г/л + 73 г/л					
САНСЭР КОМБИ, к.с. (337 г/л + 78 г/л + 73 г/л) Синтезия Кеми ГмБХ, Германия П-3 08.04.2029 г.	0,25-0,35	Пшеница яровая, ячмень яровой	Блошки, пшеничный трипс, бурая, стеблевая ржавчина, септориоз, гельминтоспориозные пятнистости	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	30 (1)
	0,25-0,35	Пшеница яровая	Клоп вредная черепашка, серая зерновая совка, гессенская муха, хлебные жуки, желтая, стеблевая ржавчина, септориоз, гельминтоспориозные пятнистости	Опрыскивание в период вегетации	
ТРИФОРС КОМБО, к.с. (337 г/л + 78 г/л + 73 г/л) ТОО «QADAM Group (КАДАМ Групп)» П-3 12.03.2036 г.	0,5-0,75	Пшеница яровая, ячмень яровой	Бурая, стеблевая ржавчина, септориоз, гельминтоспориозные пятнистости, блошки, трипс	Опрыскивание в период вегетации.Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	30 (1)
РОДОНИТ, к.с. (337 г/л + 78 г/л + 73 г/л) ТОО «Астана Нан П-3 29.07.2036 г.	0,25-0,35	Пшеница яровая	Бурая, стеблевая ржавчина, септориоз, гельминтоспориозные пятнистости, блошки, трипсы	Опрыскивание в период вегетации	30 (1)
	0,25-0,35	Ячмень яровой	Желтая, стеблевая ржавчина, септориоз, гельминтоспориозные пятнистости, блошки, трипсы	Опрыскивание в период вегетации	30 (1)

Тетранилипрол

Вайего, к.с. (200 г/л) ТОО «Байер КАЗ» П-3 04.02.2036 г.	0,1-0,25	Яровой рапс	Капустная моль	Опрыскивание до фазы бутонизации и/или после цветения. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	14 (2)
	0,3-0,5	Томат защищённого грунта	Совки, пасленовый минер, томатная минирующая моль	Внесение под корень при капельном поливе в период вегетации. Расход воды: 2000–3000 л/га. Концентрация 0,03-0,05%.	7 (2)
	0,15-0,25	Капуста	Капустная моль, капустная муха, блошки	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 300-400 л/га.	7 (2)
	0,05-0,06	картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 300-400 л/га.	
	0,2-0,3	Виноград	Гроздевая листовёртка	Опрыскивание после цветения. Расход рабочей жидкости 500 -1000 л/га.	
	0,25-0,35	яблоня	Яблонная плодожорка, листовёртки	Опрыскивание после цветения. Расход рабочей жидкости – 600- 1500 л/га	
	0,05-0,06	Томат открытый грунт	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 300-600 л/га.	
	0,15-0,25	Томат открытый грунт	Хлопковая совка, томатная минирующая моль	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 300-600 л/га.	
	0,5	Картофель	Проволочники, совки подгрызающие	Опрыскивание дна борозды во время посадки. Расход рабочей жидкости 80-120 л/га	- (1)

Тефлубензурон

НОМОЛТ, 15% с.к. (150 г/л) БАСФ Агро Б.В., Швейцария П-3 17.02.2031 г.	0,2	Лиственные и хвойные леса	Непарный шелкопряд	Опрыскивание в период массовой яйцекладки- начала отрождения гусениц	30 (1)
---	-----	---------------------------	--------------------	--	--------

Тефлутрин

ФОРС 1,5, гранулы (15 г/кг) Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария П-2 27.11.2034 г.	15	Картофель	Проволочники	Внесение в почву	30 (1)
	15	Лук	Луковая муха, проволочники	Внесение в почву	30 (1)

Тиаметоксам

Концентрация д.в. (+/- 5%)– 240 г/кг					
АКТАРА 250, в.д.г. (250 г/кг) Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария П-1 27.10.2030 г.	2-4 г/дерево	Яблоня	Красная кровяная тля	Пролив почвы в приствольном круге (2 г на 10 л воды до цветения и после сбора урожая)	60 (2)
	0,5-1,5 г/куст	Виноград	Корневая филлоксеры		
29.10.2034 г.	0,4	Томаты защищенного грунта, томаты открытого грунта	Тли	Внесение в грунт через систему капельного полива при появлении вредителей	3 (1)
	0,6	Томаты защищенного грунта	Трипсы		
	0,8	Томаты защищенного грунта	Белокрылки		
19.12.2035 г.	0,1-0,6	Огурцы открытого грунта	Тли	Опрыскивание в период вегетации 0,01-0,02% рабочим раствором	3 (2)
	0,4	Огурцы защищенного грунта	Тли	Внесение под корень при капельном поливе. Высота растений менее 1 м	3 (2)
	0,6	Огурцы защищенного грунта	Тли, трипсы, белокрылки		
Тиамакс, к.с. (240 г/л) ТОО «ФМРус» П-1 03.02.2035 г.	0,7-1,4	Пшеница, ячмень	Внутрстеблевые мухи, блошки	Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаговременн о. Расход рабочей жидкости 10 л/т.	-1
	0,1-0,2	Пшеница	Клоп вредная черепашка, пьявицы	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200- 400 л/га.	-1
	0,1-0,2	Ячмень	Пьявицы		30(1)
	0,1-0,2	Рапс яровой	Рапсовый цветоед		30(1)
	12,0-15,0	Рапс яровой	Крестоцветные блошки, проволочники, ложнопроволочники	Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаговременн о. Расход рабочей жидкости 20 л/т	-1
	0,3-0,4	Картофель	Колорадский жук, проволочники, ложнопроволочники	Обработка клубней перед посадкой. Расход рабочей жидкости 10 л/т.	-1
	0,1-0,2	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200- 400 л/га.	20(1)
	0,1-0,2	Яблоня	Яблонная медяница, яблонный цветоед	Опрыскивание до цветения.Расход рабочей жидкости 800-1200 л/га.	60(1)

	0,1-0,15	Лен масличный	Трипсы, блошки	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200- 400 л/га	30(1)
Концентрация д.в. (+/- 5%)– 350 г/л					
ТИМАТЕРР, к.с. (350 г/л) ФОРВАРД П-1 16.05.2034 г.	0,04-0,06	Яровая пшеница	Трипсы (пшеничный трипс), вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации	-(1)
	0,04-0,06	Лен	Блошки	Опрыскивание в период вегетации	-(1)
	0,05-0,1	Соя, нут	Гороховая зерновка,гороховая плодоярка, гороховая тля, хлопковая совка, бобовая огневка, луговой мотылек, нутовая минирующая муха	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)
	0,05-0,1	Рапс	Крестоцветные блошки, рапсовый пилильщик, рапсовый цветоед, рапсовый семенной скрытнохоботник , капустная моль	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)
	0,04-0,06	Картофель	Колорадский жук , тля	Опрыскивание в период вегетации	20 (2)
	0,05-0,1	Горох	Гороховая зерновка, гороховая плодоярка, гороховая тля, хлопковая совка, бобовая огневка, луговой мотылек, нутовая минирующая муха	Опрыскивание в период вегетации	20 (2)
	0,04-0,06	Пшеница озимая и яровая	Пьявица	Опрыскивание в период вегетации	20 (2)
	0,04-0,06	Ячмень яровой и озимый	Клоп вредная черепашка, пьявица	Опрыскивание в период вегетации	20 (2)
	0,07-0,11	Пшеница озимая и яровая, ячмень яровой и озимый	Хлебная жужелица	Опрыскивание в период вегетации	20 (2)
Концентрация д.в. (+/- 5%)– 480 г/л, г/кг					
ОРФЕЙ 480, к.с. (480 г/кг) Синтезия Кеми ГмБХ, Германия П-1 20.01.2035 г.	0,03-0,04	Пшеница яровая	Злаковые мухи (гессенская, шведская), пшеничный трипс, тля, хлебные блошки, клоп вредная черепашка, хлебные жуки	Опрыскивание в период вегетации культуры	60(1)
	0,05-0,075	Пшеница яровая	Серая зерновая совка		20(1)
	0,035	Ячмень яровой	Хлебная пьявица, злаковые мухи		60(1)
	0,05-0,075	Рапс яровой	Крестоцветные блошки, рапсовый цветоед, тли, белянки, луговой мотылек		30(1)
	0,03	Картофель	Колорадский жук, тли	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200- 400 л/га.	20(1)
	0,03-0,04	Сафлор	Долгоносик сафлорный,сафлорная муха	Опрыскивание в период вегетации культуры	40(1)
	0,05	Чечевица, горох	Клубеньковые долгоносики, гороховая и люцерновая тли, луговой мотылек		15(1)
	0,05	Подсолнечник	Луговой мотылек		40(1)
Сеттер, в.д.г. (500 г/кг) ТОО «EcoSave» П-1 18.03.2036 г.	0,04-0,05	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации	20 (2)
	0,04-0,05	Пшеница яровая	Трипсы, серая зерновая совка		
Концентрация д.в. (+/- 5%)– 700 г/л					
ОРФЕЙ, в.д.г. (700 г/кг) Синтезия Кеми ГмБХ, Германия П-1 08.04.2032 г.	25-30 г/га	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации	20(2)
	40-50 г/га	Горчица	Тли, крестоцветные блошки, семенной скрытнохоботник		20(1)
	40-50 г/га	Рапс	Тли, крестоцветные блошки, семенной скрытнохоботник		
	30-40 г/га	Ячмень яровой	Тли		30(1)
	30-40 г/га	Пшеница яровая	Пшеничный трипс, серая зерновая совка (гусеницы младших возрастов)		
Концентрация д.в. (+/- 5%)– 800 г/л					
Эссфейт, в.д.г. (800 г/кг) НАНЬЦИН ЭССЕНС ФАЙН-КЕМИКАЛ КО. ЛТД П-1 05.05.2036 г.	0,03–0,07	Ячмень яровой	Пшеничный трипс, серая зерновая совка, тли	Опрыскивание в период вегетации	20(1)
	0,03–0,07	Пшеница яровая	Пшеничный трипс, серая зерновая совка, тли		

Тиаметоксам + бифентрин

Концентрация д.в. (+/- 5%) ~ 300 г/л + 200 г/л					
Секарио, к.с. (300 г/л + 200 г/л) ТОО "Terra Prime" П-1 15.04.2036 г.	0,05-0,1	Пшеница яровая	Клоп вредная черепашка, хлебные блошки, хлебные жуки, злаковые мухи, тли, трипсы, пьявицы	Опрыскивание в период вегетации	30(1)
	0,05-0,1	Подсолнечник	Луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации.	30(1)
	0,05-0,1	Лен	Блошки, луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации	20(2)
	0,05-0,1	Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Нестадные саранчовые, мароккская саранча, итальянский прус, азиатская саранча	Опрыскивание в период массового отрождения личинок.	30(1)

Тиаметоксам + имidakлоприд + лямбда-цигалотрин

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 57 г/л + 210 г/л + 105 г/л					
АГРИС, к.с. (57 г/л + 210 г/л + 105 г/л) Синтезия Кеми ГмБХ, Германия П-3 20.04.2028 г.	0,05-0,06	Пшеница яровая	Блошки, трипсы	Опрыскивание в период вегетации	28 (2)
	0,05-0,06	Картофель	Колорадский жук		20 (2)
	0,05-0,06	Рапс	Рапсовый цветоед, капустная белянка, луговой мотылек		38 (2)
ИНТЕГРАЛ, к.с. (57 г/л + 210 г/л + 105 г/л) ARCUS INVEST HOLDING B.V. П-3 11.10.2032 г.	0,05-0,06	Пшеница яровая	Блошки, тли, трипсы, злаковые мухи	Опрыскивание в период вегетации	30 (1)
	0,05-0,06	Ячмень яровой	Блошки, тли, трипсы, злаковые мухи		30 (1)
	0,05-0,06	Картофель	Колорадский жук		30 (1)
	0,05-0,06	Рапс	Крестоцветные блошки, рапсовый цветоед, капустная белянка		30 (1)

	0,1	Рапс	Капустная моль		30 (1)
	0,05-0,06	Сафлор	Сафлорная муха		30 (1-2)
	0,05-0,06	Чечевица	Клубеньковые долгоносики		30 (1-2)
	0,05-0,06	Подсолнечник	Луговой мотылек , долгоносики		30 (2)
	0,05-0,06	Горох	Тли		30 (1-2)
	0,05-0,06	Лен	Трипсы		30 (1-2)

Тиаметоксам + имидаклоприд + альфа-циперметрин

Доберман, к.с. (130 г/л + 70 г/л +147 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-2 07.02.2035 г.	0,07-0,1	Подсолнечник	Луговой мотылек, тли	Опрыскивание в период вегетации культуры	40(1)
	0,07-0,1	Сафлор	Долгоносик сафлорный, сафлорная муха		40(1)
	0,07-0,1	Горох, чечевица	Клубеньковые долгоносики, гороховая и люцерновая тли, луговой мотылек		20(1)
	0,07-0,1	Рапс яровой	Крестоцветные блошки, рапсовый цветоед, тли, белянки, луговой мотылек		20(2)
	0,07	Ячмень яровой	Хлебная пядица, злаковые мухи, хлебные блошки		30(1)
	0,07	Пшеница яровая	Серая зерновая совка		30(1)
	0,07-0,1	Пшеница яровая	Злаковые мухи (шведская), пшеничный трипс, тля, хлебные блошки, клоп вредная черепашка		30(2)

Тиаметоксам + лямбда-цигалотрин

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 126 г/л + 94 г/л					
БОМБАРДИР 220,с.к. (126 г/л+ 94 г/л) Филиал «Hangzhou Ruijiang Crop Science Co.,Ltd., Казахстан» « HangzhouRuijiangCrop Science Co., Ltd.,Китай» в городе Алматы П-1 26.04.2033 г.	0,2	Участки заселенные саранчовыми	Мароккская саранча, итальянский прус, азиатская саранча, нестадные саранчовые	Опрыскивание в период массового отрождения личинок	30 (1)
	0,2	Пшеница яровая	Тли, пшеничный трипс, вредная черепашка, серая зерновая совка, хлебные жуки, гессенская муха, шведская муха	Опрыскивание в период вегетации	20 (2)
	0,2	Лен	Блошки, луговой мотылек		20 (2)
	0,25	Лук	Луковая муха, табачный трипс		30 (1)
	0,5	Яблоня	Яблонная плодожорка, моли, листовертки, клещи, калифорнийская щитовки		30 (2)
	0,25	Люцерна	Фитонимус, люцерновая толстоножка		20 (2)
	0,2	Бахчевые культуры	Дынная муха		20 (2)
	0,12	Картофель	Колорадский жук		20 (2)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 141 г/л + 106 г/л					
ГЕДЕОН, к.э. (141 г/л + 106 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ,Германия П-1 01.03.2027 г.	0,15	Пшеница яровая	Скрытостеблевые вредители, вредная черепашка, злаковые мухи	Опрыскивание в период вегетации	20 (2)
	0,1-0,15	Кукуруза	Хлопковая совка	Опрыскивание в период. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га	60(1)
	0,25	Хлопчатник	Хлопковая совка		30(2)
	0,1 л/га	Картофель	Колорадский жук		20(2)
	0,15	Горчица	Рапсовый цветоед, тли, блошки		30(2)
	0,25	Горчица	Капустная белянка, капустная моль		
	0,15	Рапс	Рапсовый цветоед, тли, блошки		
ГОТИКА, к.с. (141 г/л +106 г/л) ЛЕЙТОН АГРИО ЕВРОПА КФТ П-1 29.03.2032 г.	0,25	Рапс	Капустная белянка, капустная моль		
	0,1-0,15	Участки заселенные саранчовыми	Итальянский прус, мароккская и азиатская саранча	Опрыскивание в период массового отрождения личинок	-1
	0,2-0,3	Горчица	Крестоцветные блошки, рапсовый цветоед, рапсовый семенной скрытнохоботник, капустная моль	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200- 300 л/га	-1
	0,2-0,3	Рапс яровой	Крестоцветные блошки, рапсовый пилильщик, рапсовый цветоед, рапсовый семенной скрытнохоботник, капустная моль, рапсовый листоед	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	-(1)
	0,1-0,2	Ячмень яровой	Пьявицы, трипсы, клоп вредная черепашка, блошки, злаковые мухи, злаковые тли, цикадки	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	-(1)
ИЗУМИ с.к. (141 г/л + 106 г/л) ТОО «QADAMGroup (КАДАМГрупп)» П-1 10.10.2032 г.	0,1-0,2	Пшеница яровая	Блошки, злаковые мухи, тли, трипсы, пьявиц, цикадок	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	-(1)
	0,2	Лук	Луковая муха, табачный трипс	Опрыскивание в период вегетации	30(1)
	0,25	Хлопчатник	Хлопковая совка, карадина		30(2)
	0,2	Лен	Блошки, луговой мотылек		20 (2)
	0,1	Картофель	Колорадский жук		
	0,1-0,15	Ячмень яровой	Злаковые тли		
ИНСЕКТ, с.к. (141 г/л + 106 г/л) ТОО «Астана-Нан» П-1 18.06.2036 г.	0,15	Пшеница яровая	Вредная черепашка, серая зерновая совка, злаковые мухи	Опрыскивание в период вегетации	20 (2)
	0,1-0,15	Рапс, горчица	Рапсовый цветоед, крестоцветные блошки		
	0,1-0,15	Пшеница яровая	Тли, пшеничный трипс		
	0,15	Пшеница яровая	Вредная черепашка, серая зерновая совка, гессенская муха		
	0,1-0,15	Ячмень яровой	Злаковые тли		
	0,15	Яровой ячмень	Шведская муха		
	0,25	Хлопчатник	Хлопковая совка, карадина	Опрыскивание в период вегетации	20 (1)
	0,2	Хлопчатник	Хлопковая тля, табачный трипс, клещ паутинный, белокрылка		20 (2)
	0,1-0,15	Участки заселенные саранчовыми	Итальянский прус, мароккская и азиатская саранча, нестадные саранчовые		20 (2)
	0,25	Капуста	Белянка, тля, совки, клещи		20 (2)
	0,1	Картофель	Колорадский жук		30 (2)
	0,2	Лук	Луковая муха, табачный трипс		30 (1)
	0,2	Томаты открытого грунта	Бахчевая тля, хлопковая совка, трипсы, паутинный клещ, белокрылка	Опрыскивание в период вегетации	20 (2)
	0,4-0,6	Древесные насаждения	Листогрызущие вредители (чешуекрылые, жесткокрылые)	Опрыскивание в период вегетации	20 (1)
	0,3-0,4	Яблоня	Яблоневая плодожорка, зеленая яблонная тля	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)

	0,1-0,15	Чечевица	Гороховая плодоярка, гороховая тля, клубеньковые долгоносики, зерновка чичевичная	Опрыскивание в период вегетации	20 (1)
	0,2	Лен	Блошки, луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации	20 (1)
	0,15	Дыня	Дынная муха	Опрыскивание в период вегетации	20 (2)
	0,15	Горох	Долгоносики, зерновки, тли	Опрыскивание в период вегетации	20 (2)
	0,5-0,6	Виноград	Гроздевая листовертка	Опрыскивание в период вегетации	20 (2)
СОЛАМ, к.с. (141 г/л + 106 г/л) Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд, Китай П-1 27.07.2027 г.	0,1-0,15	Пшеница яровая	Тли, пшеничный трипс	Опрыскивание в период вегетации	20 (1)
	0,15	Пшеница яровая	Вредная черепашка, серая зерновая совка, хлебные жуки, гессенская муха		20 (2)
	0,2	Лен	Блошки, луговой мотылек		20 (1)
19.04.2029 г.	0,1	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации	20 (2)
	0,075-0,1	Рапс	Блошки, клопы, тли, рапсовый цветоед, капустная моль, капустная белянка		20 (2)
	0,25	Хлопчатник	Хлопковая совка, карадрина		30 (2)
ТИАМЕТРИН, с.к. (141 г/л + 106 г/л) ТОО «Агро-Хим-Лидер» П-1 19.04.2032 г.	0,1-0,15	Участки заселенные саранчовыми	Итальянский прус, мароккская, азиатская саранча, нестадные саранчовые	Опрыскивание в период массового отрождения личинок	20(1)
	0,25	Хлопчатник	Хлопковая совка, карадрина	Опрыскивание в период вегетации.	30(1)
	0,2	Хлопчатник	Тли, трипсы, паутинный клещ, белокрылка		30(1)
	0,1-0,15	Пшеница, ячмень яровые	Тли, пшеничный трипс		20(1)
	0,15	Пшеница, ячмень яровые	Клоп вредная черепашка, серая зерновая совка, хлебные жуки, гессенская, шведская мухи		20(1)
	0,2	Люцерна	Долгоносики, люцерновые семяеды		20(1)
	0,25-0,3	Люцерна	Фитономус		20(1)
	0,2	Лен	Блошки, луговой мотылек		20(1)
	0,25	Капуста	Белянка, совки, тля, клещи		25(1)
	0,1	Картофель	Колорадский жук, тля		20(2)
	0,2	Лук	Луковая муха, табачный трипс		30(1)
	0,2	Томаты	Тли, хлопковая совка, трипсы, паутинный клещ, белокрылка		20(2)
	0,5-0,6	Виноград	Гроздевая листовертка		20(2)
	0,15	Дыня	Дынная муха		20(2)
	0,3-0,4	Яблоня	Яблоневая плодоярка, тли		30(2)
	0,4-0,6	Древесные насаждения	Листогрызущие вредители		20(1)
ТИАМИКС, к.с. (141 г/л + 105 г/л) ТОО «АЙБАД-2015» П-1 30.06.2035 г.	0,1-0,15	Соя, горох, чечевица	Минирующие мухи, тли, совки, плодоярки, долгоносики	Опрыскивание в период вегитации	20 (1)
	0,4-0,6	Древесные насаждение	Листогрызущие вредители		20 (1)
	0,2	Хлопчатник	Тли, трипсы, паутинный клещ, белокрылка		30 (1)
	0,25	Хлопчатник	Хлопковая совка, карадрина		30 (1)
	0,2	Рапс	Крестоцветные блошки, рапсовый цветоед, клопы, белянки, капустная моль, луговой мотылек		20 (1)
	0,2	Лен	Блошки, луговой мотылек, трипсы		20 (1)
	0,15	Пшеница и ячмень яровые	Клоп вредная черепашка, серая зерновая совка, хлебные жуки		20 (1)
	0,1-0,15	Пшеница и ячмень яровые	Тли, пшеничный трипс		20 (1)
ЭНЖИО 247, с.к. (141 г/л + 106 г/л) Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария П-1 07.02.2030 г.	0,2	Лук	Луковая муха, табачный трипс	Опрыскивание в период вегетации	30 (1)
27.10.2030 г.	0,2	Томаты	Бахчевая тля, хлопковая совка, трипсы, паутинный клещ, белокрылка		20 (2)
09.03.2033 г.	0,2	Люцерна	Долгоносики, люцерновые семяеды		20 (2)
	0,5-0,6	Виноград	Гроздевая листовертка, филлоксеры листовая		20 (2)
	0,15	Горох	Долгоносики, зерновки, тли		20 (2)
	0,15	Нут	Долгоносики, зерновки, тли		20 (1)
	0,15	Дыня	Дынная муха		20 (2)
	0,4-0,6	Древесные насаждения	Листогрызущие вредители (чешуекрылые, жесткокрылые)		20 (1)
08.09.2030 г	0,1-0,15	Чечевица	Гороховая плодоярка, гороховая тля, клубеньковые долгоносики, зерновка чичевичная		20 (1)
		Подсолнечник	Луговой мотылек		40(1)
12.08.2034 г.	0,1-0,15	Пшеница яровая	Тли, пшеничный трипс		20 (1)
	0,15	Пшеница яровая	Вредная черепашка, серая зерновая совка, хлебные жуки, гессенская муха		20 (2)
	0,1-0,15	Ячмень яровой	Злаковые тли		20(2)
	0,15	Ячмень яровой	Шведская муха		20 (2)

	0,25	Хлопчатник	Хлопковая совка, карадрина		30 (2)
	0,2	Хлопчатник	Хлопковая тля, табачный трипс, паутинный клещ, белокрылка		30 (2)
		0,1-0,15	Участки заселенные саранчовыми	Итальянский прус, мароккская и азиатская саранча	Опрыскивание в период массового отрождения личинок
25.11.2035 г.	0,25	Капуста	Белянка, совки, тля, клещи	Опрыскивание в период вегетации	25 (1)
	0,1	Картофель	Колорадский жук, тля		20 (2)
16.06.2027 г.	0,3-0,4	Яблоня	Яблоневая плодоярка, зеленая яблонная тля		30 (2)
21.02.2034 г.	0,2	Лен	Блошки, луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации	20 (2)
LW-Thiamethrin 247 SC, к.с. (141 г/л +106 г/л) Guangdong Liwei Chemical indastry Co.Ltd П-1 23.04.2036 г.	0,1-0,15	Пшеница яровая	Пшеничный трипс, луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации	20(1)
	0,15	Пшеница яровая	Серая зерновая совка	Опрыскивание в период вегетации	20(1)
	0,15	Участки заселенные саранчовыми	Итальянский прус, мароккская и азиатская саранча	Опрыскивание в период массового отрождения личинок	30(1)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 150 г/л + 100 г/л					
ЭНЖИ ИКС к.с. (150 г/л + 100 г/л) TOO «GOOD JOB INDUSTRY KAZAKHSTAN» («ГУД ДЖОБ ИНДАСТРИ КАЗАХСТАН») П-1 08.11.2033 г.	0,05	Картофель	Колорадский жук, тля	Опрыскивание в период вегетации	(2)
	0,1-0,15	Пшеница яровая	Тля, пшеничный трипс		(1)
	0,3-0,4	Яблоня	Яблонная плодоярка, яблонная тля, щитовка и ложная щитовка		(2)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 257 г/л + 142 г/л					
ГЕДЕОН ПРАЙМ, к.с. (257 г/л+142 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ,Германия П-1 07.02.2035 г.	0,08-0,1	Подсолнечник	Луговой мотылек, тли	Опрыскивание в период вегетации культуры	40(1)
	0,08-0,1	Сафлор	Долгоносик сафлорный, сафлорная муха		40(1)
	0,08-0,1	Горох, чечевица	Тли, клубеньковые долгоносики, луговой мотылек		20(1)
	0,08-0,1	Картофель	Колорадский жук, тля		20(2)
	0,08-0,1	Рапс яровой	Крестоцветные блошки, рапсовый цветоед, тли, белянки, луговой мотылек		20(2)
	0,08-0,1	Ячмень яровой	Хлебная пиявица, злаковые мухи, хлебные блошки		20(2)
	0,08-0,1	Пшеница яровая	Серая зерновая совка		20(2)
	0,08-0,1	Пшеница яровая	Злаковые мухи (шведская), пшеничный трипс, тля, хлебные блошки, клоп вредная черепаха, хлебные жуки,		20(2)
Туаметоксам + лямбда-цигалотрин+лufenuron					
ЭНЖИО топ 325 с.к. (150 г/л + 100 г/л + 75) SYNGENTA CROP PROTECTION П-1 12.11.2029	0,1-0,15	Участки заселенные саранчовыми	Нестадные саранчовые	Опрыскивание в период массового отраждения личинок	-1
	0,1-0,15	Пшеница яровая	Вредная черепаха, тли, трипсы, серая зерновая совка,блошки, злаковые мухи	Опрыскивание в период вегетации	40(1)
	0,1-0,15	Подсолнечник	Тли	Опрыскивание в период вегетации, не менее чем за 25 дней до цветения	40(2)
	0,2	Подсолнечник	Луговой мотылек		
	0,2	Лен масличный	Листоблошки, луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации	40(2)
	0,1-0,15	Хлопчатник	Тли		
	0,3	Хлопчатник	Хлопковая совка, карадрина		
Туаметоксам +фипронил					
СПАРРИНГ, м.д. (150 г/л + 90 г/л) АО «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ» П-1 21.05.2035 г	0,07-0,1	Пастбища, участки заселенные саранчовыми	Итальянский прус, азиатская саранча, мароккская саранча, нестадые саранчовые	Опрыскивание в период массового отрождения личинок	-1
	0,1-0,2	Рапс	Рапсовый цветоед, крестоцветные блошки	Опрыскивание в период вегетации	30(2)
	0,2-0,3	Рапс	Капустная моль		30(2)
	0,1-0,2	Подсолнечник	Луговой мотылек, подгрызающие совки, долгоносики		30(2)
	0,1-0,2	Пшеница яровая	Клоп вредная черепаха, хлебные блошки, злаковые мухи, хлебные жуки, зерновая совка, трипсы, луговой мотылек		30(2)
Туаметоксам + флониамид					
Bang Flotroxam, в.д.г. (500 г/кг + 250 г/кг) Jiangxi Huihe Chemical Co. Ltd П-3 06.12.2034 г.	0,03-0,05	Пшеница яровая	Тли	Опрыскивание в период вегетации	40 (2)
Туаклоприд					
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 240 г/л					
АПИС, мас.дисп. (240 г/л) TOO «Астана-Нан» П-3 09.12.2031 г.	0,2-0,3	Рапс	Рапсовый цветоед, скрытнохоботник, галлицы, тля	Опрыскивание в период вегетации	28 (1)
	0,2-0,3	Картофель	Колорадский жук, картофельная тля		28 (2)
БСКАЯ, м.д. (240 г/л) TOO «Байер КАЗ» П-3 15.04.2031 г.	0,2-0,3	Рапс	Рапсовый цветоед, скрытнохоботник, галлицы, тля	Опрыскивание в период вегетации	28 (1)
	0,2-0,3	Картофель	Колорадский жук, картофельная тля		28 (2)
12.03.2036 г.	0,2-0,4	Томаты открытого грунта	Колорадский жук, тли, минирующие мухи, трипсы	Опрыскивание растений в период вегетации	20 (3)

	0,2-0,4	Огурцы открытого грунта	Тли, минирующие мухи, трипсы		
	0,5-0,7	Томаты и огурцы защищенног о грунта	Белокрылка, тли, трипсы		
	0,2-0,3	Подсолнечник	Луговой мотылек, долгоносики		
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 480 г/л					
АСПИД с.к. (480 г/л) АО Фирма « АВГУСТ» П-3 13.06.2032 г.	0,1-0,15	Рапс	Рапсовый цветоед, рапсовый семенной скрытнохоботник, крестоцветные блошки, капустная моль	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	45(2)
КАЛИПСО, к.с. (480 г/л) ТОО «Байер КАЗ» П-3 17.04.2035 г.	0,18-0,3	Яблоня	Яблонный цветоед	Опрыскивание в период обособления бутонов. Расход рабочей жидкости 600-1000 л/га	-1
	0,3-0,45	Яблоня	Яблонная плодожорка, боярышниковая листовертка, щитовки	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 1000-1500 л/га	28 (2)
	0,2-0,3	Виноград	Гроздевая листовертка	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 800-1200 л/га	-2
КАЛИНА, к.с. (480 г/л) ООО «Шанс» П-3 07.02.2034 г.	0,3—0,45	Яблоня	Яблонная плодожорка, листовертки, щитовки	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 1000-1500 л/га	10(2)
	0,18—0,3	Яблоня	Яблонный цветоед	Опрыскивание в период обособления бутонов. Расход рабочей жидкости 600—1000 л/га	10(1)
	0,2—0,3	Виноград	Гроздевая листовертка	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 800—1200 л/га	40(2)
МЕРЛИН, к.с. (480 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-3 31.12.2035 г.	0,1-0,15	Рапс	Крестоцветные блошки, капустная белянка	Опрыскивание в период вегетации.	28 (1)
	0,1-0,15	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации.	28 (2)
ТЕЙЯ, к.с. (480 г/л) АО «Щелково Агрохим» П-3 14.04.2031 г.	0,3-0,45	Яблоня	Яблонная плодожорка,калифорнийская щитовка	Опрыскивание в период вегетации	10(3)
	0,18-0,3		Яблонный цветоед		10(1)
	0,3-0,45	Сафлор	Сафлорный долгоносик, сафлорная муха		28(1-2)

Тиаклоприд + дельтаметрин

ПРОТЕУС, м.д. (100 г/л + 10 г/л) ТОО «Байер КАЗ» П-2 06.08.2036 г.	0,5-0,75	Рапс	Крестоцветные блошки, скрытнохоботники, капустная моль, рапсовый цветоед, белянки, клопы, тли	Опрыскивание растений в период вегетации	20 (2)
	0,5-1,0	Томаты открытого грунта	Тли, подгрызающие совки, колорадский жук		
	0,5-1,0	Капуста	Капустная совка, моль, белянки, крестоцветные блошки, тли		

Тиоциклам гидроген оксалат

Эвисект 75%, в.д.г. (750 г/кг) Филиал АО «Сумитомо Корпорэйшн" в Алматы П-3 27.06.2035 г.	0,45-0,6	Лук	Трипсы	Листовое опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 600 л/га	3 (3)
	0,45-0,6	Томаты (закрытый грунт - теплицы)	Белокрылки, минирующие мухи		

Фенитротион

СУМИТИОН, 50% к.э. (500 г/л) Сумитомо Кемикал Агро Юроп С.А.С., Франция П-1 31.01.2027 г.	0,75-1,0	Хлопчатник	Тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)
	1,5		Хлопковая совка, карадрина		
	1,75		Подгрызающие совки		

Фипронил

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 250 г/л					
КОЙРА,к.с. (250 г/л) Представительство ООО «Агро Эксперт Групп» в РК П-1 17.10.2032 г.	0,06-0,10	Картофель	Колорадский жук, тли, цикадки	Опрыскивание в период вегетации культуры. Расход рабочей жидкости 200- 300 л/га.	30 (2)
	0,02	Участки, заселённые саранчовыми	Итальянский прус, азиатская и мароккская саранча, нестадные саранчовые	Опрыскивание в период массового отрождения личинок. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га.	-(1)
	0,07-0,1	Ячмень яровой	Злаковые мухи (в т.ч. шведская муха), блошки, тли, пьявица, трипсы, цикадки, листовые пилильщики	Опрыскивание посевов в период вегетации культуры. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	30(1)
	0,07-0,1	Пшеница яровая	Злаковые мухи (в т.ч. гессенская и шведская), серая зерновая совка, клоп вредная черепашка, пьявица, трипсы, тли, блошки		
СКУТУМ с.к. (250 г/л) АО Фирма «Август» П-1 20.03.2034 г.	0,1	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	10 (1)
	0,1	Пшеница яровая, пшеница озимая	Трипсы,пилильщики		40 (1)
	0,1	Хлопчатник	Хлопковая совка, карадрина		-1
	0,015-0,025	Участки заселенные саранчовыми	Итальянский прус, мароккская и азиатская саранча	Опрыскивание в период массового отрождения личинок. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	30 (1)
	0,2-0,4	Картофель	Проволочники, подгрызающие совки, хрущи	Опрыскивание дна борозды и клубней во время посадки. Расход рабочей жидкости – 70- 150 л/га	1
	4,0-5,0	Рапс, подсолнечник, кукуруза	Проволочники, подгрызающие совки	Обработка семян перед посевом. Расход рабочей жидкости – 15 л/т	1

Ария, к.с. (250 г/л) Представительство ООО «ЗЕМЛЯКОФФ КРОП ПРОТЕКШЕН» в РК П-1 13.12.2034	0,02	Пастбища, участки заселенные саранчовыми, дикая растительность	Нестадные саранчовые, мароккская и азиатская саранча	Опрыскивание в период массового отрождения личинок. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	30 (1)
<i>Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 800 г/кг</i>					
ФИПРОМАКС 80%, в.д.г. (800 г/кг) Представительство Компании «DVA Agro GmbH» в городе Петропавловск, РК П-1 04.05.2034 г.	0,02-0,025	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	30 (2)
ФИПРОН, в.д.г. (800 г/кг) ARCUS INVEST HOLDING B.V П-1 14.12.2032 г.	0,0065	Участки заселенные саранчовыми	Итальянский прус, мароккская и азиатская саранча, нестадные саранчовые	Опрыскивание в период массового отрождения личинок	30 (1)
	0,035-0,045	Рапс	Капустная моль	Опрыскивание в период вегетации от фазы розетки до фазы бутионизации (от фазы ВВСН 18 до фазы ВВСН 55 по шкале Зодакса)	30 (2)

Флометокин

Гладиус 10%, с.к. (106 г/л) Филиал АО «Сумитомо Корпорэйшн» в Алматы П-3 27.06.2035 г.	0,3-0,6	Томаты, огурец (закрытый грунт – теплицы)	Трипсы, белокрылки	Листовое опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости 600 л/га.	1 (3)
--	---------	--	--------------------	--	-------

Флубендиамид

БЕЛТ, к.с. (480 г/л) ТОО «Байер КАЗ» П-2 23.07.2029 г.	0,3–0,4	Яблоня	Яблонная плодoжорка, листовертки, яблонная моль	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 500–1200 л/га	21(2)
	0,3–0,4	Виноград	Гроздевая листовертка	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 400–800 л/га	21(2)
	0,15	Хлопчатник	Хлопковая совка, совка карадрина	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	21(1)
	0,15	Соя	Хлопковая совка		7 (3)
	0,1-0,15	Томат открытого грунта	Хлопковая совка, томатная минирующая моль		
	0,1-0,15	Яровой рапс	Капустная моль, луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителей. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	20 (2)

Хлорантранилипрол

<i>Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 200 г/л</i>					
Бисект, к.с. (200 г/л) AGROBEST GRUP, Турция П-3 11.06.2035 г.	0,15 - 0,25	Рапс	Крестоцветные блошки, рапсовый цветоед, капустная моль	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)
	0,15-0,25	Яблоня	Яблонная плодoжорка		14 (2)
	0,15-0,2	Хлопчатник	Хлопковая совка, карадрина		21 (2)
Винка Хлорантранилипрол, к.с. (200 г/л) ЧЖЭЦЗЯН СИНЬАНЬХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ГРУППА П-3 04.12.2034 г.	0,15-0,2	Хлопчатник	Хлопковая совка, карадрина	Опрыскивание в период вегетации	30(2)
	0,1-0,2	Рапс	Капустная моль	Опрыскивание в период отрождения гусениц	14(2)
	0,1-0,2	Капуста	Капустная белянка, капустная моль, капустная совка		14(2)
	0,15-0,3	Томаты	Озимая совка		21(2)
КОРАГЕН, к.с. (200 г/л) ТОО «ЭфЭмСи Агро Казахстан» П-3 02.11.2028 г.	0,15-0,2	Хлопчатник	Хлопковая совка, карадрина	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)
13.01.2033 г.	0,15-0,30	Яблоня	Яблонная плодoжорка, листовертки	Опрыскивание в период вегетации	21 (2)
28.02.2034 г.	0,15-0,30	Томаты	Озимая совка	Опрыскивание в период отрождения гусениц	21 (2)
	0,04-0,05	Томаты	Колорадский жук	Опрыскивание в период отрождения личинок	21 (2)
	0,10-0,20	Капуста	Капустная белянка, капустная моль, капустная совка	Опрыскивание в период отрождения гусениц	14 (2)
07.02.2029 г.	0,21	Томаты открытого грунта	Южноамериканская томатная моль	Опрыскивание в период вегетации. Интервал между обработками 7-10 дней. Расход рабочей жидкости 300-400 л/га	21 (2)
	0,315	Томаты защищенного грунта	Южноамериканская томатная моль	Опрыскивание в период вегетации. Интервал между обработками 7-10 дней. Расход рабочей жидкости 500-1000 л/га	1 (2)
17.06.2031 г.	0,04-0,05	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)
КАРАВАН, к.с. (200 г/л) ТОО «Астана-Нан» П-3 23.02.2034 г.	0,15-0,2	Хлопчатник	Хлопковая совка, карадрина	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)
	0,04-0,05	Картофель	Колорадский жук		30 (2)
	0,15-0,3	Яблоня	Яблонная плодoжорка, листовертки.		25 (2)
	0,15-0,3	Томаты	Озимая совка		25 (2)
	0,04-0,05	Томаты	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации	25 (1)
	0,1-0,2	Капуста	Капустная белянка, капустная моль, капустная совка	Опрыскивание в период отрождения гусениц	25 (2)
КЛЕВЕРОЛ, к.с. (200 г/л) Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд П-3	0,15-0,2	Хлопчатник	Хлопковая совка, карадрина	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	30 (2)
	0,04-0,05	Картофель	Колорадский жук		30 (2)
	0,15-0,3	Яблоня	Яблонная плодoжорка, листовертки		21 (2)

03.04.2035 г.	0,15-0,3	Томаты	Озимая совка		21 (2)
	0,1-0,2	Капуста	Капустная белянка, капустная моль, капустная совка		14 (2)
ПИЛАРФЛАМ, к.с., (200 г/л) Пиларквим (Шанхай) Ко., Лтд., Китай П-3 10.01.2033 г.	0,15 – 0,2	Хлопчатник	Хлопковая совка, карадрина	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)
	0,04 – 0,05	Картофель	Колорадский жук, тли		
Proven, с.к., (200 г/л) THAI HARVEST LIMITED П-3 30.07.2036 г.	0,15–0,3	Яблоня	Яблонная плодояорка, листовёртки	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости –800 –1500 л/га	21 (2)
	0,04–0,05	Картофель	колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости –200 –400 л/га	30 (2)
	0,15–0,2	Томаты	хлопковая совка	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости –200 –400 л/га	21 (2)
	0,04–0,06	Томаты	колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости –200 –400 л/га	21 (2)
Транил 20%, к.с., (200 г/л) SixF Crop Protection Co., LTD. П-3 02.02.2036 г.	0,1 – 0,2	Рапс	Капустная моль	Опрыскивание в период отрождения гусениц. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	14 (2)
	0,2	Подсолнечник	Луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании – 200-400 л/га, при авиационном опрыскивании –50-100 л/га	30 (2)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 250 г/л					
Король Премиум, ,к.с. (250 г/л) ТОО «Агро-Хим-Лидер» П-3 13.02.2035 г.	0,04-0,05	Участки заселенные саранчовыми	Итальянский прус, мароккская и азиатская саранча. Нестадная саранча	Опрыскивание в период массового отрождения личинок расход рабочей жидкости 200-300 л/га	6(1)
	0,2	Томаты	Хлопковая совка, моли	Опрыскивание в период вегетации, расход рабочей жидкости 200-300 л/га	21(1)
	0,2	Хлопчатник	Хлопковая совка		21(2)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 600 г/л					
ВАНТАКОР, к.с. (600 г/л) ТОО «ЭфЭмСи Агро Казахстан» П-3 07.02.2035 г.	0,035-0,05	Кукуруза	Совки	Опрыскивание в период вегетации, расход рабочей жидкости 100- 200 л/га.	7(2)
	0,035-0,05	Кукуруза	Луговой мотылек, хлопковая совка	Опрыскивание в период вегетации, расход рабочей жидкости 200-300 л/га	7(2)
	0,04-0,06	Рапс	Капустная моль, капустная совка, луговой мотылек		20(2)
	0,04-0,06	Подсолнечник	Хлопковая совка, луговой мотылек		
	0,05-0,1	Яблоня	Яблонная плодояорка, листовертки	Опрыскивание в период вегетации, расход рабочей жидкости 800- 1500 л/га	21(2)
	0,05-0,08	Виноград	Гроздевая листовертка	Опрыскивание в период вегетации, расход рабочей жидкости 600-1000 л/га	21(2)
	0,07	Томаты открытого грунта	Южноамериканская томатная моль	Опрыскивание в период вегетации. Интервал между обработками 7-10 дней. Расход рабочей жидкости –300-400 л/га	21(2)
	0,1	Томаты защищенного грунта	Южноамериканская томатная моль	Опрыскивание в период вегетации. Интервал между обработками 7-10 дней. Расход рабочей жидкости –500-1000 л/га	1(2)
	0,05-0,1	Томаты	Озимая совка	Опрыскивание в период отрождения гусениц	21(2)
	0,03-0,06	Капуста	Капустная белянка, капустная моль, капустная совка		14(2)
	0,01	Томаты	Колорадский жук		Опрыскивание в период отрождения личинок

Хлорантранилипрол + лямбда-цигалотрин

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 100 г/л + 50 г/л					
АМПЛИГО 15, м.к.с. (100 г/л + 50 г/л) Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария П-1 14.03.2033 г.	0,2-0,4	Капуста	Белянки, совки, блошки, капустная моль, тли	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)
	0,4	Хлопчатник	Хлопковая совка	Опрыскивание в период вегетации. Две обработки	7 (1)
	0,2-0,4	Хлопчатник	Карадрина, тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации	7 (1)
	0,2-0,4	Яровой рапс	Моли, белянки, совки	Опрыскивание в период вегетации	7 (1)
	0,2-0,4	Яровой рапс	Рапсовый цветоед, рапсовый семенной скрытнохоботник, крестоцветные блошки, капустная моль	Опрыскивание в период вегетации в фазу бутонизации	7 (1)
	0,3-0,4	Яблоня	Плодожорки, листовертки	Опрыскивание в период вегетации	20 (1)
	0,2-0,3	Подсолнечник	Луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации	50 (1)
	0,2-0,3	Лен масличный	Блошки, луговой мотылек	Опрыскивание в периодвегетации	30 (1)
Анима м.к.с. (100 г/л + 50 г/л) ТОО «QADAM Group (КАДАМ Групп)» П-1 06.03.2034 г.	0,2-0,3	Кукуруза	Хлопковая совка, кукурузный стеблевой мотылёк	Опрыскивание в период вегетации	30 (1)
	0,2-0,3	Рапс	Рапсовый цветоед		20 (1)
	0,2-0,3	Подсолнечник	Луговой мотылёк, хлопковая совка		30 (1)
Керуен м.к.с. (100 г/л + 50 г/л) ТОО «Астана-Нан» П-1 25.08.2035 г.	0,35-0,4	Яблоня	Яблонная плодожорка, листовертки	Опрыскивание растений в период вегетации	20(1)
	0,2-0,4	Капуста	Белянки, совки, блошки, тли, капустная моль	Опрыскивание в период вегетации	30(2)
ЛАСТРОЛ к.с., (100 г/л + 50 г/л) Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал КО., ЛТД	0,2-0,3	Подсолнечник	Хлопковая совка, луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании – 200-400 л/га, при	50 (2)

П-1 19.05.2033 г.				авиационном опрыскивании – 50-100 л/га	
	0,2-0,4	Капуста	Белянки, совки, блошки, капустная моль, тли	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)
	0,3-0,4	Томат защищенного грунта	Тли, совки, южноамериканская томатная моль	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 1000-3000 л/га	5 (1)
	0,2-0,3	Кукуруза	Хлопковая совка, луговой мотылек, кукурузный мотылек	Сплошное опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	55 (2)
	0,2-0,4	Рапс	Белянки, совки, блошки, капустная моль, тли		30 (2)
ПИЛАРФЕНД ЗС, м.к.с. (100 г/л + 50 г/л) Пиларквим (Шанхай) Ко., Лтд. П-1 25.12.2034 г.	0,2-0,4	Капуста	Белянки, совки, блошки, капустная моль, тли	Опрыскивание в период вегетации	30(2)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 110 г/л + 55 г/л					
ВЕКТОР к.с. (110 г/л + 55 г/л) Синтезия Кеми ГмБХ, Германия П-1 04.07.2034 г.	0,18 –0,36	Рапс	Крестоцветные блошки, капустная моль, белянки, рапсовый цветоед	Опрыскивание в период вегетации	20(2)
	0,18 –0,36	Горчица	Крестоцветные блошки, капустная моль, белянки, рапсовый цветоед		
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 150 г/л + 100 г/л					
Амигаса, м.к.с. (150 г/л + 100 г/л) ТОО «HARVEST Ltd (Харвест Ltd)» П-1 10.03.2036 г.	0,15-0,3	Яблоня	Яблонная плодожорка, тли	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 600 –1200 л/га.	20(2)
	0,15-0,3	Рапс	Крестоцветные блошки, рапсовый цветоед, капустная моль, луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости –200 –400 л/га.	
	0,15-0,3	Горчица	Крестоцветные блошки, рапсовый цветоед, капустная моль, луговой мотылек		

Хлорантранилипрол + тиаметоксам

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 200 + 200 г/л, г/кг					
Bang Chlorthoxam, в.д.г. (200 г/кг + 200 г/кг) Jiangxi Huihe Chemical Co. Ltd П-3 06.12.2034 г.	0,4-0,5	Яблоня	Яблонная плодожорка, минирующие моли, тли	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 800- 1500 л/га	14 (3)
КОРОЛЬ 400, с.к. (200 г/л + 200 г/л) Филиал "Hangzhou Ruijiang Crop Science Co.,Ltd., Казахстан" "Hangzhou Ruijiang Crop Science Co., Ltd.,Китай" в городе Алматы П-3 31.01.2035 г.	0,15-0,25	Хлопчатник	Хлопковая совка, карадрина	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)
	0,2- 0,3	Яблоня	Яблонная моль, плодожорка, листовертка, тля		

Хлорантранилипрол + эмаектин бензоат

Кинжал, к.с. (125 г/л + 50 г/л) ТОО «ФМРус» П-3 12.03.2035 г.	0,3–0,5	Яблоня, груша	Комплекс вредителей (плодожорки, минирующие моли, клещи), в том числе: плодожорка яблонная, моль яблонная минирующая, клещ яблоневый	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 800- 1500 л/га.	21(3)
	0,3-0,5	Хлопчатник	Хлопковая совка, трипс, тля, паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200- 400 л/га	28 (3)
	0,3–0,5	Соя	Паутинный клещ		

Хлорпирифос

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 480 г/л					
ДУРСБАН, к.э. (480 г/л) Дау АгроСаенсес, США П-1 16.03.2030 г.	2,0-2,5	Свекла сахарная	Обыкновенный свекловичный долгоносик, совки, крошка, щитососки	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)
	1,5	Свекла сахарная	Блошки		
	0,8	Свекла сахарная	Листовая тля		
	1,5-2,0	Свекла сахарная	Луговой мотылек, мертвоеды		
	2,0	Яблоня	Плодожорки, листовертки, моли, клещи, щитовки, тли		40 (2)
	2,0	Персик	Ложнощитовки		60 (1)
	1,5	Картофель	Колорадский жук		30 (2)
	1,5	Хмель	Паутинный клещ, тли		30 (2)
	3,0	Хмель	Люцерновый долгоносик		-2
	1,5	Люцерна	Фитонемус		25 (1)
	0,3-0,8	Участки заселенные саранчовыми	Итальянский прус, мароккская и азиатская саранча	Опрыскивание в период массового отрождения личинок	25 (1)
ТАЙРА к.э. (480 г/л) АО Фирма «Август» П-1 03.06.2031 г.	0,8-1,2	Пшеница яровая	Клоп вредная черепашка, зерновая совка, злаковые мухи, тли, трипсы, хлебные жуки	Опрыскивание в период вегетации.	40(2)
04.07.2032 г.	1,5	Хлопчатник	Хлопковая совка	Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	-(2)
	2-2,5	Свекла сахарная	Свекловичные долгоносики		30 (2)
	1,5-2,0	Свекла сахарная	Луговой мотылек		30 (2)
	0,8	Свекла сахарная	Свекловичная листовая тля		30 (2)
	1,5	Свекла сахарная	Свекловичные блошки	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 100- 200 л/га	30 (2)

Хлорпирифос + бифентрин

Концентрация д.в. (+/- 5%)– 400 г/л+ 20 г/л					
ПИРИНЕКС СУПЕР, к.э. (400 г/л + 20 г/л) Адама Агрикалчер Б.В.,Нидерланды П-1 29.12.2030 г.	1,5	Хлопчатник	Трипсы, тля, хлопковая совка, паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)
	1,5	Яблоня	Клещи, яблонная плодожорка		40 (2)
	0,5	Капуста	Капустная белянка, тля		40 (2)
	0,7	Бахчевые культуры	Дынная муха		20 (2)
ПИРЕЛЛИ, к.э. (400 г/л + 20 г/л) АО «Щелково Агрохим» П-1 13.04.2032 г.	0,5	Рапс	Рапсовый цветоед, крестоцветные блошки	Опрыскивание в период вегетации	30 (1-2)
	0,5-1,0	Рапс	Капустная моль		
	0,5	Кукуруза	Кукурузный мотылек		30 (1-2)
	0,5-1,0	Кукуруза	Подгрызающие совки, хлопковая совка		
	0,8-1,0	пшеница яровая, пшеница озимая	Пшеничный цветочный клещ, пшеничный четырехногий клещ		

Хлорпирифос + циперметрин

Концентрация д.в. (+/- 5%)– 480 г/л+ 50 г/л					
ВАЛСАРЕЛ, к.э. (480 г/л + 50 г/л) Стоктон Кемикал Корпорейшн, США П-1 10.01.2029 г.	0,3-0,5	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)
	1,5	Яблоня	Калифорнийская, яблонная запятовидная щитовка и ложнощитовки		40 (2)
	1,5-2,0	Рапс	Крестоцветные блошки, капустная моль, рапсовый цветоед		30 (2)
	0,5-0,7	Сафлор	Сафлорный долгоносик, сафлорная муха		30 (2)
ЕЛНУР-Д, к.э. (500 г/л + 50 г/л) Наньцзин Эссенс Файн- Кемикал Со., Лтд, Китай П-1 02.02.2034	1,5	Хлопчатник	Хлопковая совка, карадрина, тли, трипсы, клещи	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)
	0,5-0,7	Бахчевые культуры	Дынная муха		20 (2)
	0,75-1,0	Яровая пшеница	Серая зерновая совка, хлебные жуки, пьявица, тли, трипс		30 (2)
	0,75-1,0	Озимая пшеница	Хлебная жужелица		30 (1)
	1,0-2,0	Рапс	Рапсовый цветоед, крестоцветные блошки, пилильщик, белянки, тли		30 (2)
	0,3-0,5	Картофель	Колорадский жук		30 (2)
	1,5 л/га	Яблоня	Плодожорки, тли, клещи, листовертки, моли		40 (2)
КАРДИНАЛ, к.э. (500 г/л + 50 г/л) ТОО «Agro Mark Kaz» П-1 06.01.2031 г.	1,5	Хлопчатник	Карадрина, хлопковая совка, тли, паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)
	0,2	Участки заселенные саранчовыми	Итальянский прус, мароккская саранча	Опрыскивание в период массового отрождения личинок	20 (1)
	0,1-0,2	Участки заселенные саранчовыми	Нестадные саранчовые, азиатская саранча	Опрыскивание в период массового отрождения личинок	20 (1)
	0,5-0,7	Бахчевые культуры	Дынная муха на посевах (двукратная обработка)	Опрыскивание в период вегетации (двукратная обработка)	30 (2)
КАРДИНАЛ СУПЕР, к.э. (500 г/л + 50 г/л) ТОО «Agro Mark Kaz» П-1 05.05.2032 г.	0,1-0,2	Участки заселенные саранчовыми	Итальянский прус, мароккская саранча, азиатская саранча, нестадные саранчовые	Опрыскивание в период массового отрождения личинок	20 (1)
КОМБАТ 550, к.э. (500 г/л + 50 г/л) Моер Кемсайенс Ко, Китай П-1 26.11.2030 г.	1,5	Хлопчатник	Хлопковая совка, карадрина, тли, паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)
	1,5	Яблоня	Яблонная плодожорка, тли, моли, листовертки, клещи		40 (2)
	0,3-0,5	Виноград	Гроздевая листовертка, паутинный клещ		30 (2)
	0,5-0,7	Лук	Луковая муха, трипс		30 (2)
	0,5-0,7	Бахчевые	Дынная муха	Опрыскивание в период массового отрождения личинок	20 (2)
	0,15	Участки заселенные саранчовыми	Итальянский прус, азиатская и мароккская саранча		30 (1)
КОРАЛЛ Д, к.э. (500 г/л + 50 г/л) ТОО «Бартонс Кемикал ГмБХ» П-1 16.03.2031 г.	1,5	Хлопчатник	Хлопковая совка, паутинный клещ, тли	Опрыскивание в период вегетации	30 (1)
	0,3-0,5	Картофель	Колорадский жук		30 (2)
	1,5	Яблоня	Яблонная плодожорка, тли, клещи, листовертки, моли		40 (2)
	0,5-0,7	Бахчевые культуры	Дынная муха		20 (2)
КОУИН, к.э. (500 г/л + 50 г/л) Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд, Китай П-1 30.05.2027 г.	1,5	Хлопчатник	Хлопковая совка, паутный клещ, тли	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)
21.02.2029 г.	0,3-0,5	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)
НУКЕР ПРО, к.э. (500 г/л + 50 г/л) ТОО «QADAM Group» (Кадам Групп) П-1 25.11.2035 г.	1,5	Хлопчатник	Хлопковая совка, тли, клещи	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)
	0,3-0,5	Картофель	Колорадский жук		30 (2)
	0,5-0,7	Дыня	Дынная муха		30 (2)
	1,5-2,0	Рапс	Рапсовый цветоед		30 (2)
	1,5	Яблоня	Плодожорки, щитовки, листовертки, моли		40(2)
НУРЕЛЛ Д, к.э. (500 г/л + 50 г/л) Дау Агро Саенсес, США П-1 11.02.2030 г.	0,5-0,7	Сафлор	Сафлорный долгоносик, сафлорная муха	Опрыскивание в период вегетации	20 (1)
26.01.2027 г.	0,5-0,7	Бахчевые культуры	Дынная муха	Опрыскивание в период вегетации	20 (2)

СЕКТОР, к.э. (500 г/л + 50 г/л) ООО «Шанс» П-1 08.08.2031	0,6-0,8	Пшеница озимая	Хлебная жужелица, клоп вредная черепашка, хлебные жуки, тли, блошки, трипсы, серая зерновая совка, шведская и гессенские мухи	Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	42(1)
	0,6-0,8	Пшеница яровая	Хлебная жужелица, клоп вредная черепашка, хлебные жуки, тли, блошки, трипсы, серая зерновая совка, шведская и гессенские мухи	Опрыскивание культуры при наличии вредителей в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	30 (1)
	0,5-0,6	Ячмень яровой	Пьявицы, блошки , хлебная жужелица		
	0,6-0,8	Свекла сахарная	Свекловичные блошки, долгоносики	Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га	40(1)
	0,6	Рапс яровой и озимый	Крестоцветные блошки		43(1)
	0,6-0,8	Рапс яровой и озимый	Рапсовый цветоед, семенной скрытнохоботник , капустная моль	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-400 л/г	43(1)
	1,5	Хлопчатник	Хлопковая совка, карадрина, тли, трипсы, клещи	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	30 (2)
	0,5-0,7	Бахчевые культуры	Дынная муха		
	1,5	Яблоня	Яблонная плодожорка, тли, моли, листовертки, клещи	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 800-1200 л/га.	40 (2)
	0,3-0,5	Виноград	Гроздевая листовертка, паутинный клещ		30 (2)
ХЛОРЦИРИН, 55% к.э. (500 г/л + 50 г/л) Arysta LifeScience Benelux Sprl П-1 5.03.2031 г.	1,5	Хлопчатник	Хлопковая совка, паутинный клещ, тли	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)
	1,5	Яблоня	Яблонная плодожорка, тли, клещи, листовертки, моли	Опрыскивание в период вегетации	40 (2)
	0,2	Участки заселенные саранчовыми	Итальянский прус, азиатская саранча	Опрыскивание в период массового отрождения личинок	30 (1)
ЦИПЕРФОС-Д, к.э. (500 г/л + 50 г/л) ТОО «Дегеш Агро ЛТД» П-1 26.02.2030 г.	0,1-0,2	Участки заселенные саранчовыми	Азиатская саранча, мароккская саранча, итальянский прус, нестадные саранчовые	Опрыскивание в период массового отрождения личинок	20 (1)
	1,5	Хлопчатник	Хлопковая совка, карадрина, тли, трипсы, клещи	Опрыскивание в период вегетации	20 (1)
	0,5-0,7	Бахчевые культуры	Дынная муха		20 (2)
	1,5	Яблоня	Яблонная плодожорка, калифорнийская, зятовидная щитовки и ложнощитовки, тли, листовертки, моли, клещи		40 (2)
	1,3-1,5	Свекла сахарная	Свекловичный долгоносик, совки, блошки, тли, луговой мотылек, щитососки		45 (2)
	0,3-0,5	Картофель	Колорадский жук		30 (2)
	1,0-2,0	Рапс	Рапсовый цветоед, крестоцветные блошки, пилильщик, белянки, тли		30 (2)
ЦИФОС 550, к.э. (500 г/л + 50 г/л) ТОО «Агро-Хим-Лидер» П-1 28.03.2028 г.	1,5	Хлопчатник	Хлопковая совка, тли, паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	30 (1)
	0,5-0,7	Бахчевые культуры	Дынная муха	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 250-300 л/га	20 (2)
	0,3-0,5	Картофель	Колорадский жук		30 (1)
	1,0	Капуста	Тли, белянки	Опрыскивание растений до образования кочанов. Расход рабочей жидкости 250-300 л/га	30 (1)
	1,5	Яблоня	Яблонная плодожорка, тли, клещи, листовертки, моли	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 500 л/га	30 (2)
	0,2	Участки заселенные саранчовыми	Итальянский прус, мароккская саранча	Опрыскивание в период массового отрождения личинок. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	20 (1)
	0,1-0,2	Участки заселенные саранчовыми	Азиатская саранча, нестадные саранчовые		
ШАМАН, к.э. (500 г/л + 50 г/л) ТОО «ФМРус» П-1 19.03.2035 г.	0,1-0,2	Участки заселенные саранчовыми	Итальянский прус, азиатская и мароккская саранча	Опрыскивание в период массового отрождения личинок	20 (1)
	1,5-2,0	Рапс	Рапсовый цветоед	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)
	0,3-0,5	Картофель	Колорадский жук		
	0,5-0,7	Дыня	Дынная муха		
	1,3-1,5	Кукуруза	Озимая совка, кукурузный мотылек		20 (2)
	1,3-1,5	Подсолнечник	Озимая и хлопковая совка, долгоносики (подсолнечниковый усач)		
	1,5	Хлопчатник	Хлопковая совка, тли, паутинный клещ		

Циперметрин

ШАРПЕЙ, м.э. (250 г/л) АО Фирма «Август» П-1 16.01.2033 г.	0,2	Пшеница	Вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200- 400 л/га	20 (2)
	0,2	Пшеница и ячмень яровые	Злаковая тля, хлебный клопик, пьявица, блошки, хлебные трипсы		
	0,32	Кукуруза	Хлопковая совка		
	0,15	Кукуруза	Кукурузный мотылек, луговой мотылек		
	0,1-0,15	Картофель	Колорадский жук		
	0,2	Участки заселенные саранчовыми	Итальянский прус, мароккская и азиатская саранча	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200- 400 л/га	20 (1)
	0,2	Горох	Гороховая тля		20 (2)
	0,3	Горох	Гороховая зерновка		
	0,2	Рапс	Капустная моль		
	0,32	Хлопчатник	Хлопковая, подгрызающие совки, клопы		
	0,16-0,32	Яблоня	Плодожорки, листовертки, яблонная моли	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 1000 л/га	25 (3)

Циантрилипрол

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 100 г/л					
БЕНЕВИЯ, м.д. (100 г/л) ТОО «ЭфЭмСи Агро Казахстан» П-3 03.10.2034 г.	0,25-0,50	Томаты (открытый грунт)	Совки, минёры, белокрылка	Раннее опрыскивание в период яйцекладки – появления первых вредителей. Интервал между обработками10-14 дней. Расход рабочей жидкости- 400 л/га	(1) 2
	0,25-0,50	Томаты (защищённый грунт)	Белокрылка, тли трипсы		(1) 2
	0,50-0,75 + прилипатель Кодасайд 2,5 л/га	Томаты (открытый и защищённый грунт)	Тля, трипсы		(1) 2
	0,25-0,50	Лук	Луковая муха		(14) 2
	0,50-0,75 + прилипатель Кодасайд 2,5 л/га	Лук	Трипсы		(14) 2
	0,25-0,50	Капуста	Чешуекрылые вредители (капустная белянка, капустная моль), крестоцветные блошки, капустная муха		(7) 2
	0,50-0,75 + прилипатель Кодасайд 2,5 л/га	Капуста	Тля		(7) 2
	0,25-0,50	Огурцы (открытый и защищённый грунт)	Белокрылка		(1) 2
0,50-0,75 + прилипатель Кодасайд 2,5 л/га	Огурцы (открытый и защищённый грунт)	Тля, трипсы	(1) 2		
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 200 г/л					
ВЕРИМАРК, к.с. (200 г/л) ТОО «ЭфЭмСи Агро Казахстан» П-3 03.10.2034 г.	0,25-0,50	Томаты (открытый и защищённый грунт)	Совки, минёры, белокрылка, тли, трипсы	Раннее внесение с капельным поливом в период яйцекладки – появления первых вредителей. Интервал между обработками 10-14 дней. Поливные ленты/капельницы должны быть установлены в рядке с растениями, но не между рядками. Необходимо использовать по возможности больший расход поливной воды	(1) 2
	0,25-0,50	Лук	Луковая муха, трипсы		(14) 2
	0,25-0,50	Капуста	Чешуекрылые вредители (белянки, капустная моль, капустные совки) крестоцветные блошки, капустная муха, тли трипсы		(7) 2
	0,25-0,50	Огурцы (открытый и защищенный грунт)	Белокрылка, тли, трипсы		(1) 2

Циантрилипрол+ абамектин

Пирум 078 с.к. (60 г/л + 18 г/л) SYNGENTA CROP PROTECTION AG П-1 04.03.2034 г.	1,2-1,5	Томаты закрытого грунта	Клещи	Опрыскивание в период вегетации ВВСН51-89	3 (2)
	1,2-1,5	Томаты открытого грунта	Томатная минирующая моль	Опрыскивание в период вегетации ВВСН20-89	10(1)
	1,2-1,5	Хлопчатник	Клещи	Опрыскивание в период вегетации ВВСН 15	10(1)
	1,2-1,5	Хлопчатник	Хлопковая совка	Опрыскивание в период вегетации ВВСН 73-75.	10(1)

Эмаектин бензоат

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 50 г/л, г/кг					
ДЮССАК, к.э. (50 г/л) АО Фирма «Август» П-1 19.01.2036 г.	0,3-0,4	Подсолнечник	Хлопковая совка	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200 -400 л/га	7 (2)
	0,3-0,4	Рапс	Блошки	Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га	
	0,3-0,4	Рапс	Капустная моль, капустная совка, капустная и репная белянки	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200 -400 л/га	
САРРЕНДЕР, в.р.г. (50 г/кг) AGROBEST GRUP, Турция П-1 25.01.2032 г.	0,3-0,4	Томаты	Хлопковая совка	Опрыскивание в период отрождения гусениц	7(2)
	0,4	Хлопчатник	Хлопковая совка		20 (2)
	0,4-0,5	Яблоня	Плодожорка, листовёртки		10 (2)
Пиларклэйм, в.г. (50 г/кг) Пиларквим (Шанхай) Ко, Лтд. П-1 07.11.2032 г.	0,1-0,15-0,2 г/га	Хлопчатник	Хлопковая совка	Опрыскивание в период вегетации	20 (3)
	0,1-0,15 г/га	Рапс	Капустная моль, крестоцветная блошка	Опрыскивание в период вегетации	20 (2)
ЮНОНА, м.э., (50 г/л) АО «Щелково Агрохим» П-1 10.03.2033 г.	0,3-0,4	Рапс	Совки	Опрыскивание в период вегетации	10 (2)
	0,2-0,4	Подсолнечник	Луговой мотылек, совки		

Эмаектин бензоат + луфенурон

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 50 г/кг + 400 г/кг					
ПРОКЛЭЙМ ФИТ 450, в.г. (50 г/кг + 400 г/кг) Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария П-1 26.03.2030 г.	0,1-0,15	Томаты	Хлопковая совка	Опрыскивание посевов в период вегетации	20 (2)
	0,1-0,15	Хлопчатник	Хлопковая совка		20 (3)
	0,15-0,2	Яровой рапс	Капустная моль	Опрыскивание в период вегетации (ВВСН20 ВВСН59 от роста боковых побегов до фазы жел –той почки)	30 (3)
11.02.2036 г.	0,1-0,2	Яблоня	Яблонная плодожорка, боярышниковая листовёртка	Опрыскивание в период вегетации	28 (2)
07.10.2030 г.	0,15	Томаты открытого грунта	Томатная минирующая моль	Опрыскивание в период вегетации	28 (2)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 100 г/кг + 400 г/кг					
Армцид Плюс, в.д.г.	0,05-0,075	Хлопчатник	Хлопковая совка	Опрыскивание в период вегетации	20(3)

(100 г/кг + 400 г/кг) ШАНДОНГ ВЕЙФАНГ РЕЙНБОУ КЕМИКАЛ КО., ЛТД П-1 16.04.2035 г.	0,05-0,1	Яблоня	Яблонная плодожорка, боярышниковая листовертка		28(2)
	0,05-0,07	Томаты открытого грунта	Томатная минирующая моль		
	0,063-0,075	Кукуруза	Совки (карадрина, томатная совка, совка кукурузная листовая и др.), кукурузный стеблевой мотылёк	Сплошное опрыскивание в период вегетации	14(2)
	0,04	Рапс	Совка, листовертка табачная		14(3)

Эмаектин бензоат + тиаметоксам

Агро Лидер, в.д.г. (50 г/кг + 150 г/кг) ТОО «Агро-Хим-Лидер» П-1 18.12.2034 г.	0,3	Кукуруза	Озимая совка	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	20 (2)
	0,3	Лук	Луковая муха, трипсы		30 (2)
	0,3	Хлопчатник	Хлопковая совка, тли, моли, белокрылка		30 (2)
	0,3	Яблоня	Яблонева плодoжорка, яблоневая моль, листовертки	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 1000-1500 л/га	30 (2)

Эсфенвалерат

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 50 г/л					
СЭМПАЙ, к.э. (50 г/л) АО Фирма «Август» П-1 26.05.2030 г.	0,2	Капуста	Капустная моль, белянки,совки	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	30 (1)
	0,5	Хлопчатник	Белокрылка, хлопковая совка		-1
	0,5-1,0	Подсолнечник	Озимая и хлопковая совка		30 (1)
	0,5-1,0	Рапс	Капустная моль		30 (1)
	0,2-0,3	Лен-долгунец	Блошки	Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости 100-200 л/га	-1

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 100 г/л					
ИМПЕРА, к.э. (100 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-1 03.02.2035 г.	0,1-0,13 л/га	Пшеница яровая	Злаковые мухи, трипс, хлебные блошки, клоп вредная черепашка, серая зерновая совка	Опрыскивание в период вегетации культуры	20(2)
	0,1-0,13 л/га	Ячмень яровой	Хлебные блошки, злаковые мухи, хлебная пьявица		
	0,1-0,13 л/га	Лен	Льняная блошка, льняной трипс		20(2)
	0,2-0,3 л/га	Рапс	Капустная моль, рапсовый цветоед, рапсовые блошки ,белянки, клопы		20(2)
	0,1-0,2 л/га	Подсолнечник	Хлопковая совка, луговой мотылек		20(2)

РОДЕНТИЦИДЫ

Торговое название, препаративная форма, фирма-регистраント. Дата окончания срока регистрации (число, месяц, год)	Норма расхода препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т)	Культура, обрабатываемый объект	Вредный организм, объект	Способ, время, кратность обработки, ограничения
--	--	---------------------------------	--------------------------	---

Бродифакум

КЛЕРАТ Г, 0,005% гранулы (0,05 кг/кг) Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария 07.11.2032 г.	0,005% в приманке	Склады, хранилища, защищенный грунт, хозяйственные постройки	Домовая мышь	Гранулы смачивают подсолнечным маслом и раскладывают по 6-8 г в приманочные ящики. Их ставят у каждого убежища как внизу, так и на других уровнях в объекте. Порции восполняют в течение 2 недель
	0,005% в приманке	Склады, хранилища, защищенный грунт, хозяйственные постройки	Серая и черные крысы	Гранулы смачивают подсолнечным маслом и раскладывают по 30-60 г в приманочные ящики. Не менее 4 в отсеке до 50 кв.м, а в более крупных помещениях и с внешней стороны объекта интервал между смежными точками 10-15 м. Поедаемые порции восполняют на 7-й день. Общий срок борьбы 2 недели

Флокумафен

ШТОРМ, 0.005% восковые брикеты (0,05 г/кг) БАСФ Агро Б.В., Швейцария 22.02.2027 г.	1,0-3,0	Зерновые и вблизи их посевов	Суслики	Раскладка восковых брикетов весной в период полного пробуждения сусликов, равномерно через каждые 6-7 м: - 1 кг/га по 4 г при численности 11-20 сусликов на 1 га; - 2 кг/га по 8 г при численности 21-30 сусликов на 1 га; - 3 кг/га по 12 г при численности свыше 30 сусликов на 1 га. На 5-7 день после обработки восковые брикеты восполняются по мере необходимости.
	1,0-3,0	Полезащитные лесополосы	Мышевидные грызуны (обыкновенная полевка, лесная и домовая мышь, обыкновенный хомяк)	Раскладка восковых брикетов весной и осенью в местах резервации и перезимовки грызунов, равномерно через каждые 6-7 м: - 1 кг/га по 4 г при численности 3-5 грызунов на 25 ловушко-ночей; - 2 кг/га по 8 г при численности 6-8 грызунов на 25 ловушко-ночей; - 3 кг/га по 12 г при численности свыше 8 грызунов на 25 ловушко-ночей. На 5-7 день после обработки восковые брикеты восполняются по мере необходимости.

ФУНГИЦИДЫ

Торговое название, препаративная форма, фирма-регент. Дата окончания срока регистрации (число, месяц, год)	Норма расхода препарат а (л/га, кг га, л/т, кг т)	Культура, обрабатываемый объект	Вредный организм	Способ, время обработки, ограничения	Срок последней обработки, в днях до сбора урожая, в (максимальная кратность обработок
1	2	3	4	5	6

Азоксистробин

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 250 г/л					
ИНТРАДА, с.к. (250 г/л) АО Фирма «Август» П-3 20.03.2034 г.	0,6-0,8	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз, ризоктониоз	Трехкратное опрыскивание в период вегетации в фазы: начала смыкания рядков, бутонизация, конец цветения. Расход рабочей жидкости 300-400 л/га.	21 (3)
	0,4-0,6	Томаты	Фитофтороз, мучнистая роса, альтернариоз	Двукратное опрыскивание в период вегетации: первое после цветения 1-2 кистей, последующее – с интервалом 7-14 дней. Расход рабочей жидкости 600 л/га	10 (2)
	0,8-1,0	Дыня	Мучнистая роса	Трехкратное опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее – с интервалом 7-14 дней. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га.	21 (3)
	0,6-0,8	Соя	Аскохитоз, мучнистая роса, антракноз, ржавчина	Опрыскивание в период вегетации. Первое – при появлении первых признаков одного из заболеваний, второе – через 10 -14 дней. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	50 (2)
	0,8-1,0	Рапс	Склеротиниоз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезней (фаза вытягивания стеблей – начало образования стручков в нижнем ярусе). Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	
КСИСТРО, с.к. (250 г/л) ТОО «QADAM Group (КАДАМ Групп)» П-3 21.01.2036 г.	0,5-1,0	Картофель	Ризоктониоз, ржавчина, фомоз, аскохитоз, фузариоз	Опрыскивание почвы при посадке клубней. Расход рабочей жидкости - 80-200 л/га	60 (1)
	0,5-1,0	Подсолнечник	Ризоктониоз, ржавчина, фомоз, аскохитоз, фузариоз, пероноспороз	Опрыскивание в фазе 4-10 листьев или в фазе цветения	50 (2)

Азоксистробин + дифеноконазол

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 125 г/л + 125 г/л					
АМИСТАР ГОЛД 250, с.к. (125 г/л + 125 г/л) Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария П-3 26.10.2032 г.	0,5-1,0	Яровой рапс	Фомоз, альтернариоз, склеротиниоз	Опрыскивание в период вегетации	10 (2)
	0,5-1,0	Подсолнечник	Ржавчина, фомоз, фомопсис, альтернариоз, склеротиниоз, септориоз		70 (1)
	0,5-1,0	Лен масличный	Антракноз, аскохитоз, альтернариоз		40 (1)
	0,5-1,0	Соя	Аскохитоз, альтернариоз, мучнистая роса, пероноспороз, антракноз		50 (1)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 200 г/л + 125 г/л					
АМИСТАР ТОП 325, с.к. (200 г/л + 125 г/л) Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария П-3 05.02.2028 г.	0,5-1,0	Рис	Пирикулярриоз, альтернариоз, фузариоз	Опрыскивание в период вегетации	30 (1)
	0,75-1,0	Дыня	Мучнистая роса, аскохитоз		14 (3)
	0,75-1,0	Картофель	Фитофтороз,макроспориоз, альтернариоз, ризоктониоз		14 (3)
	0,75-1,0	Лук	Пероноспороз, альтернариоз, стеμφилиум, фузариозное увядание		14 (3)
	0,75-1,0	Морковь	Альтернариоз, церкоспороз, мучнистая роса		14 (3)
	0,75-1,0	Томаты	Фитофтороз, макроспориоз, альтернариоз, мучнистая роса		14 (3)
08.09.2030 г	0,5-1,0	Чечевица, нут	Мучинистая роса, аскохитоз, антрокноз, перенаспроз		30(2)
Альванит 325, с.к. (200 г/л + 125 г/л) ТОО «Астана-Нан» П-3 17.07.2036 г.	0,5-1,0	Нут	Мучнистая роса, аскохитоз, антракноз, пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации	30(2)
	0,75-1,0	Томаты	Фитофтороз, макроспориоз, альтернариоз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации	14 (3)
	0,75-1,0	Морковь	Альтернариоз, церкоспороз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации	14 (3)
	0,75-1,0	Лук	Пероноспороз, альтернариоз, стеμφилиум, фузариозное увядание	Опрыскивание в период вегетации	14 (3)
	0,75-1,0	Картофель	Фитофтороз, макроспориоз, альтернариоз, ризоктониоз	Опрыскивание в период вегетации	14 (3)
	0,75-1,0	Дыня	Мучнистая роса, аскохитоз	Опрыскивание в период вегетации	14 (3)
	0,5-1,0	Чечевица	Мучинистая роса, аскохитоз, антракноз, переноспороз	Опрыскивание в период вегетации	30(2)
	0,5-1,0	Рис	Пирикулярриоз, альтернариоз, фузариоз	Опрыскивание в период вегетации	30 (1)

Азоксистробин + мефеноксам

ЮНИФОРМ 446, с.э., (322 г/л + 124 г/л) Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария П-3 14.01.2029 г.	1,5	Картофель	Ризоктониоз, серебристая парша, фитофтороз, питиозная корневая гниль	Опрыскивание почвы при посадке клубней	60 (1)
	0,5-1,5	Лук	Фузариоз, ризоктониоз, вертициллёз, питиоз	Внесение препарата через систему капельного полива. Первое внесение через 2-3 дня после высадки рассады в грунт, при прямом севе в фазу 2-3 настоящих листьев. При однократном внесении 1,5 л/га. При двукратном – 0,5-1,5 л/га с интервалом 10-14 дней. Вносить препарат в 3-ю четверть поливного цикла	30 (2)
	0,7-1,0	Томаты открытого грунта	Корневые и прикорневые гнили (фузариозные, питиозные, фитофторозные)	Полив под корень: первый полив в течение 3 -х дней после высадки рассады на постоянное место, второй – при необходимости. Расход рабочей жидкости: 100 мл/растение.	40 (2)

	0,7-1,0	Томаты защищенного грунта	Корневые и прикорневые гнили (фузариозные, питиозные, фитофторозные)	Полив под корень: первый полив в течение 3 -х дней после высадки рассады на постоянное место, второй – при необходимости. Расход рабочей жидкости: 100 мл/растение. Только земляной неограниченный грунт.	40 (2)
--	---------	---------------------------	--	---	--------

Азоксистробин + тебуконазол					
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 200 г/л + 160 г/л					
СПАРТАК, к.с. (200 г/л + 160 г/л) ЛЕЙТОН АГРИО ЕВРОПА КФТ, Венгрия П-3 17.03.2032 г.	0,8-1,0	Подсолнечник	Ложная мучнистая роса, белая гниль, септориоз, фомоз, фомопсис, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	-1
	0,8-1,0	Соя	Пероноспороз, белая гниль, септориоз, аскохитоз, альтернариоз, фомопсис, фузариоз		
	0,8-1,0	Рапс, горчица	Пероноспороз, альтернариоз		
	0,8-1,0	Пшеница яровая, ячмень яровой	Бурая ржавчина, септориоз	Опрыскивание в период вегетации. Опрыскивание по вегетирующим сорнякам. Расход рабочей жидкости – 200- 300 л/га.	30 (1)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 200 г/л + 250 г/л					
Азоки Про с.к. (200 г/л + 250 г/л) ТОО «Бартонс Кемикал ГмбХ» П-3 25.12.2035 г.	0,5-1,0	Пшеница яровая	Бурая ржавчина, мучнистая роса, пиренофороз	Опрыскивание в период вегетации в фазы появления флаг-листа начала колошения	48 (1-2)
	0,5-1,0	Ячмень яровой	Мучнистая роса, тёмно-бурая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации: первое- в фазы появления флаг -листа -выдвижения колоса	48 (1)
Тебаз Про с.к. (200 г/л + 250 г/л) ArystaLifeScience S.A.S П-3 31.01.2034 г.	0,5-1,0	Пшеница яровая	Бурая ржавчина, пиренофороз	Опрыскивание в период вегетации в фазы появления флаг-листа начала колошения	48 (1)
	0,5-1,0	Рапс яровой	альтернариоз, склеротиниоз(белая гниль), фомоз	Опрыскивание в период вегетации:при появлении первых признаков одного из заболеваний.	60 (1)

Азоксистробин + тебуконазол + флутриафол					
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 90 г/л + 317 г/л + 93 г/л					
ТРИАКТИВ, к.с. (90 г/л + 317 г/л + 93 г/л) ARCUS INVEST HOLDING B.V. П-3 12.10.2032 г.	0,25	Лен	Альтернариоз, антракноз, ржавчины, полиспороз, аскохитоз	Опрыскивание посевов в период вегетации	30 (1)
	0,25	Ячмень яровой,	Ржавчина желтая, стеблевая, септориоз, гельминтоспориозные пятнистости		
	0,25	Пшеница яровая	Ржавчина бурая, стеблевая, септориоз, гельминтоспориозные пятнистости		
	0,35	Чечевица	Фузариозное увядание, антракноз, ржавчина, аскохитоз, ростостимулирующее действие	Опрыскивание посевов в период вегетации	30 (1)
САНСЭР УЛЬТРА, к.с. (90 г/л + 317 г/л + 93 г/л) Синтезия Кемп ГмбХ, Германия П-2 16.11.2032 г.	0,25	Пшеница яровая	Желтая ржавчина, септориоз, гельминтоспориозные пятнистости	Опрыскивание в период вегетации	30 (1)
	0,25	Ячмень яровой	Желтая ржавчина, гельминтоспориозные пятнистости		
	0,25-0,35	Чечевица	Фузариозное увядание, антракноз, ржавчина, аскохитоз		
	0,25-0,35	Соя	Фузариозное увядание, антракноз, ржавчина, аскохитоз, мучнистая роса		
ЭМИТИ, к.с. (90 г/л + 317 г/л + 93 г/л) Синтезия Кемп ГмбХ, Германия П-3 24.04.2028 г.	0,25	Пшеница яровая	Бурая, желтая, стеблевая ржавчина, септориоз, гельминтоспориозные пятнистости	Опрыскивание в период вегетации	30 (1)
	0,25	Ячмень яровой	Стеблевая, желтая ржавчина, гельминтоспориозные пятнистости		
	0,25	Лен	Альтернариоз, антракноз		
	0,3 - 0,4	подсолнечни к	Ржавчина, фомоз, альтернариоз, склеротиниоз		
	0,3 – 0,35	Соя, нут	Аскохитоз, ржавчина, антракноз, фузариоз, мучнистая роса		
	0,3 – 0,35	Горох	Аскохитоз, ржавчина, фузариоз		
	0,3 - 0,35	Чечевица	Аскохитоз, ржавчина, фузариоз		
					30(2)

Азоксистробин + протиоконазол					
Концентрация д.в. (+/- 5%) ~ 200 г/л + 200 г/л					
Гравелли, с.к. (200 г/л + 200 г/л) ТОО «Terra Prime» П-3 15.04.2036 г.	0,3-0,4	Горох, чечевица	Аскохитоз, ржавчина	Двукратное опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое или при проявлении первых признаков одного из заболеваний, второе через 10 –14 дней. Расход рабочей жидкости 200–400 л/га.	30(2)
	0,3-0,4	Подсолнечник	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200–400 л/га.	30(2)
	0,2-0,3	Пшеница яровая	Ржавчина бурая, стеблевая, септориоз, гельминтоспориозная пятнистость	Опрыскивание в период вегетации: первое-в фазы конец кущения -начало выхода в трубку, второе-в фазы появления флагового листа -начало колошения. Расход рабочей жидкости- 200 л/га.	30(2)

Азоксистробин + ципроконазол					
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 200 г/л + 80 г/л					

АМИСТАР ЭКСТРА 280,с.к. (200 г/л + 80 г/л) Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария П-3 22.09.2030 г.	0,5-0,75	Пшеница озимая	Бурая и желтая ржавчина, септориозно-гельминтоспориозные пятнистости, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)
	0,5-0,75	Ячмень яровой	Бурая и желтая ржавчина, мучнистая роса, септориозно-гельминтоспориозные пятнистости	Опрыскивание в период вегетации	30 (1)
12.11.2035 г.	0,75	Подсолнечник	Мучнистая роса, аскохитоз	Опрыскивание в период вегетации	30 (1)
17.03.2027 г.	0,5-0,75	Пшеница яровая	Бурая, стеблевая и желтая ржавчина, септориоз, гельминтоспориоз, гельминтоспориозная и сетчатая пятнистости листьев, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации	30 (1)
06.12.2028 г.	0,5-0,75	Лен	Антракноз, фомоз, альтернариоз, полиспороз, аскохитоз	Опрыскивание в период вегетации	30 (1)
АМЕТИСТ с.к. (200 г/л + 80 г/л) ТОО «QADAM Group (КАДАМ Групп)» П-3 07.03.2034 г.	0,5-0,75	Рапс	Альтернариоз, пероноспороз, серая гниль	Опрыскивание в период вегетации	30 (1)
	0,75	Подсолнечник	Мучнистая роса, аскохитоз		
	0,5-0,75	Лен	Антракноз, фомоз, альтернариоз		
	0,5-0,75	Пшеница яровая	Бурая, стеблевая и желтая ржавчина, септориоз, мучнистая роса		
	0,5-0,75	Ячмень яровой	Бурая и желтая ржавчина, септориозногельминтоспориозные пятнистости, мучнистая роса		
	0,5-0,75	Пшеница озимая	Бурая и желтая ржавчина, септориозногельминтоспориозные пятнистости, мучнистая роса		30 (2)
Кейден, с.к. (200 г/л + 80 г/л) ФОРВАРД П-3 03.03.2036 г.	0,5-0,75	Лен	Антракноз, фомоз, альтернариоз, полиспороз, аскохитоз	Опрыскивание в период вегетации	30 (1)
	0,5-1,0	Ячмень яровой и озимый	Мучнистая роса, желтая ржавчина, гельминтоспориозная пятнистость, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, ринхоспориоз, карликовая ржавчина, стеблевая ржавчина		30 (1-2)
	0,75-1,0	Подсолнечник	Мучнистая роса, аскохитоз, фомоз, ржавчина, белая гниль, альтернариоз		30 (1)
	0,5-1,0	Соя	Антракноз, церкоспороз, ржавчина, склеротиниоз		30 (1)
	0,5-1,0	Кукуруза	Фузариозная стеблевая гниль, гельмонтоспориоз ная стеблевая гниль, гельминтоспориоз ная пятнистость листьев, гельминтоспориоз ная прикорневая гниль		30 (1)
	0,5-1,0	Рапс	Альтернариоз, серая гниль, мучнистая роса, фомоз		30 (1)
	0,5-1,0	Пшеница яровая и озимая	Темно-бурая пятнистость, мучнистая роса, септориоз, чернь колоса, бурая, желтая ржавчина, гельминтоспориоз ная пятнистость, пиренофороз, фузариоз колоса		30 (1-2)
СТРОБИШАНС ПРО, с.к. (200 г/л + 80 г/л) ООО «Шанс» П-3 14.02.2034 г.	0,5-1,0	Ячмень озимый	Сетчатая пятнистость, темно- бурая пятнистость, ринхоспориоз, мучнистая роса, карликовая ржавчина, фузариозная пятнистость листьев	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков заболевания, второе – при необходимости с интервалом 21 день. Расход рабочей жидкости – 300 л/га	48(2)
	0,5-1,0	Ячмень яровой	Сетчатая пятнистость, темно- бурая пятнистость, ринхоспориоз, мучнистая роса, карликовая ржавчина	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков заболевания, второе – при необходимости с интервалом 21 день. Расход рабочей жидкости – 300 л/га	48(2)
	0,75-1,0	Пшеница яровая и озимая	Фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации: конец колошения – начало цветения. Расход рабочей жидкости 300 л/га	48(2)
	0,5-1,0	Пшеница яровая и озимая	Бурая ржавчина, стеблевая ржавчина, септориоз листьев и колоса, чернь колоса, мучнистая роса, пиренофороз	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков заболевания, второе – по необходимости с интервалом 21 день. Расход рабочей жидкости – 300 л/га	48(2)
СКАЙСТАР, к.с. (200 г/л + 80 г/л) Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд, Китай П-3 12.06.2027 г.	0,5-0,75	Пшеница яровая	Бурая ржавчина, септориозно-гельминтоспориозные пятнистости	Опрыскивание в период вегетации	30 (1)
	0,5-0,75	Пшеница озимая	Бурая ржавчина, септориозно-гельминтоспориозные пятнистости	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)
	0,5-0,75	Лен	Антракноз, альтернариоз, аскохитоз	Опрыскивание в период вегетации	30(1)
21.02.2029 г.	0,75	Подсолнечник	Мучнистая роса, аскохитоз	Опрыскивание в период вегетации	30 (1)
СУПЕРСТАР, к.с. (200 г/л + 80 г/л) Наньцзин Эссенс Файн- Кемикал Ко., Лтд., Китай П-3 09.09.2029 г.	0,5-0,75	Пшеница яровая	Мучнистая роса, бурая и стеблевая ржавчина, гельминтоспориозная пятнистость	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	30 (1)
	0,5-0,75	Пшеница озимая	Мучнистая роса, септориоз, бурая, желтая ржавчина, гельминтоспориозная пятнистость		

	0,5-0,75	Ячмень яровой	Мучнистая роса, желтая ржавчина, гельминтоспориозная, сетчатая пятнистость	
	0,5-0,75	Рапс	Альтернариоз, серая гниль, мучнистая роса	
	0,75-1,0	Подсолнечник	Мучнистая роса, аскохитоз, фомоз, ржавчина	

Азоксистробин + ципроконазол+ карбендазим

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 107 г/л + 267 г/л +137 г/л					
АПЕКС, к.с. (107 г/л + 267 г/л +137 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-3 20.03.2036 г.	0,15-0,25	Пшеница яровая	Бурая, желтая и стеблевая ржавчина, септориоз, гельминтоспориозная пятнистость	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 100-200 л/га.	30(2)
	0,15-0,25	Ячмень яровой	Стеблевая и желтая ржавчина, гельминтоспориозная пятнистость		
	0,15-0,3	Чечевица	Ржавчина, аскохитоз, антракноз, мучнистая роса, фузариоз, серая гниль		
	0,15-0,3	Лён	Альтернариоз, фузариозное увядание, антракноз, фомоз, аскохитоз	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 100-200 л/га.	30(1)
	0,15-0,3	Подсолнечник	Ржавчина, фомоз, альтернариоз, бурая пятнистость, склеротиниоз, аскохитоз		

Азоксистробин + эпоксиконазол

СИКУРС, с.к. (240 г/л + 160 г/л) АО Фирма «Август» П-3 07.02.2029 г.	0,5-0,7	Пшеница яровая и озимая	Бурая, стеблевая ржавчина, септориоз листьев и колоса, мучнистая роса, пиренофороз	Опрыскивание в период вегетации: первое – в фазы конец кущения – начало выхода в трубку, второе – в фазы появления флагового листа – начало колошения. Расход рабочей жидкости 200 л/га	-2
22.04.2030 г.	0,5-0,7	Подсолнечник	Фомоз, ржавчина, ложная мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	30 (1)
	0,3-0,6	Соя	Аскохитоз, фузариоз, антракноз, серая гниль, ржавчина, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200 л/га	30 (1)
08.08.2032 г.	0,5-0,7	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз	Двукратное опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое или при проявлении первых признаков одного из заболеваний, второе через 10-14 дней. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	30 (2)
	0,4-0,5	Горох, нут чечевица	Аскохитоз, мучнистая роса, ржавчина, белая и серая гниль		

Алюминия фосэтил

ФОСЭТИЛ СУПЕР, с.п. (800 г/кг) ТОО «КазАгро-Вет-Снаб» П-3 28.08.2030 г.	1,5-3,0	Яблоня	Бактериальный ожог	Первую обработку культуры следует проводить заблаговременно, по сигналу службы прогнозов. В крайнем случае, обработку следует проводить при появлении первых признаков болезни. Опрыскивание 0,3% водной суспензией. Опрыскивание проводят свежеприготовленным раствором в безветренную сухую погоду рано утром или под вечер, равномерно смачивая листья растений раствором. Не допускайте стекания рабочего раствора с листьев.	7 (2)
	1,2-2,0	Лук (за исключением лука предназначенного «на перо»)	Переноспороз	Первую обработку культуры следует проводить заблаговременно, по сигналу службы прогнозов. В крайнем случае, обработку следует проводить при появлении первых признаков болезни. Опрыскивание 0,4% водной суспензией. Опрыскивание проводят в свежеприготовленным раствором в безветренную сухую погоду рано утром или под вечер, равномерно смачивая листья растений раствором. Не допускайте стекания рабочего раствора с листьев.	20 (5)

Беномил

БЕНОРАД, с.п. (500 г/кг) АО Фирма «Август» П-3 07.02.2029 г.	1,0-1,5	Подсолнечник	Серая гниль, белая гниль, фомоз	Опрыскивание посевов вегетации. Расход рабочей жидкости 400 л/га	20 (2)
	2,0	Рис	Пирикулярриоз	Опрыскивание в период вегетации в фазе выметывания метелок. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	30 (1)
04.07.2032 г.	0,5-1,0	Дыня	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 300 л/га	30 (2)

Боскалид + пираклостробин

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 252 г/кг + 128 г/кг					
БЕЛЛИС, в.д.г. (252 г/кг + 128 г/кг) BASF SE, Германия П-3 12.04.2029 г.	0,2-0,35	Картофель	Альтернариоз	Опрыскивание посевов при появлении первых признаков заболевания	10 (2)
Кластро Дуо в.д.г. (252 г/кг +128 г/кг) ТОО «Астана-Нан» П-3 25.08.2035 г.	0,8	Яблоня	Парша, мучнистая роса, монилиоиз, гнили плодов при хранении	Опрыскивание в период вегетации. Против гнилей плодов при хранении, опрыскивание за 7-10 дней до сбора урожая яблок, предназначенных для хранения.	7(3)
ЯДРО ЭКСТРА, в.р.г. (252 г/кг + 128 г/кг) Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд, Китай П-3 21.06.2028 г.	0,8	Яблоня	Парша, мучнистая роса, монилиоиз, гнили плодов при хранении	Опрыскивание в период вегетации. Против гнилей плодов при хранении, опрыскивание за 7-10 дней до сбора урожая яблок, предназначенных для хранения	7 (3)
19.04.2029 г.	0,8	Томаты	Фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации	10 (2)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 580 г/кг + 290 г/кг					

ЯДРО, в.д.г. (580 г/кг + 290 г/кг) Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд, Китай П-3 02.11.2027 г.	0,35	Яблоня	Парша, мучнистая роса, монилиоз, гнили плодов при хранении	Опрыскивание в период вегетации. Против гнилей плодов опрыскивание за 7-10 дней до сбора урожая яблок, предназначенных для хранения	7 (3)
--	------	--------	--	---	-------

Боскалид + тиофанат-метил + флутриафол

ЛАНТУС ФОРТЕ, к.с. (57 г/л + 193 г/л + 247 г/л) Синтезия Кеми Гмбх, Германия П-3 29.05.2030 г.	0,4-0,5	Пшеница яровая	Бурая, желтая, стеблевая ржавчина, септориоз, гельминтос порозные пятнистости	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	30 (1)
	0,4-0,5	Ячмень яровая	Желтая, стеблевая ржавчина, септориоз, гельминтос по-розные пятнистости		
	0,4-0,5	Лен масличный	Фомоз, антракноз	Опрыскивание в период вегетации	
	0,4-0,5	Чечевица	Аскохитоз, антракноз		

Гидроксид меди

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 350 г/кг					
КОСАЙД 2000, в.д.г. (350 г/кг) COSACO LLC США П-3 22.05.2035 г.	2,0-3,0	Яблоня	Парша яблони, плодовая гниль, бактериальны й ожог	Опрыскивание профилактическое или при появлении первых признаков болезни. Интервал между обработками 7-14 дней. Расход рабочей жидкости 800-1500 л/га	(15) 2
	2,0-3,0	Виноград	Милдью, серая гниль, антракноз	Опрыскивание профилактическое или при появлении первых признаков болезни. Интервал между обработками 7-14 дней. Расход рабочей жидкости 600-1000 л/га	(20) 2
	4,5-6,0	Абрикос	Монилиоз, клястероспор иоз	Опрыскивание профилактическое или при появлении первых признаков болезни. Интервал между обработками 7-14 дней. Расход рабочей жидкости 300-1000 л/га	(20) 2
	1,5-2,0	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание профилактическое или при появлении первых признаков болезни. Интервал между обработками 7-14 дней. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	(15) 2
	1,5-2,5	Томаты	Фитофтороз, альтернариоз		(5) 2
	1,5-2,0	Лук	Пероноспороз, бактериоз		(15) 2
	1,5-2,0	Огурцы	Пероноспороз, бактериоз		(5) 2
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 770 г/кг					
Косейт 770, с.п. (770 г/кг) ТОО «Агро-Хим-Лидер» П-3 12.03.2035 г.	1,2-2,0	Яблоня	Парша, плодовая гниль, бактериальный ожог	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 10-12 дней. Расход рабочей жидкости 1000-1500 л/га	3(3)

Димоксистробин + боскалид

ПИКТОР 40%, к.с. (200 г/л + 200 г/л) БАСФ СЕ, Германия П-3 18.02.2031 г.	0,4-0,5	Рапс	Альтернариоз, склеротиниоз, мучнистая роса, пероноспороз , фомоз, повышение урожайности	Опрыскивание в период начала – середины цветения культуры	30 (2)
	0,4-0,5	Подсолнечник	Склеротиниоз , ложная мучнистая роса, ржавчина, фомоз, серая, сухая гнили, бурая пятнистость, повышение урожайности	Опрыскивание в фазу 8 листьев культуры – начало-середина цветения	30 (2)

Диметоморф+ флуазинам

ИНСАЙД, с.к. (200 г/л + 200 г/л) АО Фирма « АВГУСТ», Россия П-3 07.03.2034 г.	0,8-1,0	Картофель	Фитофтороз	Четырехкратное опрыскивание в период вегетации: первое – в фазе смыкания рядков, последующие – с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20 (4)
--	---------	-----------	------------	---	--------

Дифеноконазол

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 250 г/л					
АМИГО 250, к.э. (250 г/л) Моер Кемсайенс Ко, Китай П-4 26.11.2030 г.	0,15-0,2	Яблоня	Парша, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)
АЛЬТРИН, к.э. (250 г/л) ТОО «Астана-Нан» П-3 14.12.2031 г.	0,15-0,2	Яблоня, груша	Парша, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации до и после цветения с интервалом не более 14 дней.	20 (4)
	0,3-0,5	Томат открытого грунта	Альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезни, последующее — с интервалом 10–14 дней	20 (2)
	0,2	Персик, абрикос, вишня, слива, черешня	Кластероспо риоз , курчавость листьев, коккомикоз	Опрыскивание в период вегетации: первое — в фазе «зеленый конус», второе — после цветения	20 (2)
	0,3-0,5	Картофель, морковь	Альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезни, последующее — с интервалом 10–14 дней	20 (2)
	0,3-0,4	Виноград	Оидиум, черная пятнистость, краснуха, черная гниль	Опрыскивание в период вегетации: первая обработка — весной в фазе бутонизация— цветение, вторая — до смыкания ягод в грозди, дальнейшие обработки с интервалом 10–14 дней.	30 (1-4)

ДИКОР, к.э. (250 г/л) ТОО «Агро-Хим-Лидер» П-3 04.12.2034 г.	0,2-0,3 л/га	Яблоня	Парша, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации 0,015-0,02% эмульсией препарата. Расход рабочей жидкости 1000-1500 л/га	20(4)
РАЕК, к.э. (250 г/л) АО Фирма «Август» П-3 10.02.2032 г.	0,15-0,2	Яблоня	Парша, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации в фазы: «зеленый конус», розовый бутон, последующие обработки – после цветения с интервалом 10- 15 дней	20 (4)
04.07.2032 г.	0,4	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 300 л/га.	20 (2)
	0,3-0,4	Лук	Альтернариоз		
СКОР 250, к.э. (250 г/л) Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария П-4 07.02.2034 г.	0,15-0,2	Яблоня	Парша, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации 0.015-0.02% эмульсией препарата	20 (4)
	0,4	Свекла сахарная	Мучнистая роса, церкоспороз	Опрыскивание в период вегетации	20 (2)
16.06.2027 г.	0,2-0,3	Вишня	Монилиоз, кластероспориоз	Опрыскивание в период вегетации культуры: после цветения с интервалом 14 дней	20 (2)
	0,2-0,3	Абрикос	Монилиоз, кластероспориоз	Опрыскивание в период вегетации культуры: первое в фазе «зеленый конус», второе – после цветения	20 (2)
СКОРОШАНС, к.э. (250 г/л) ООО «Шанс» П-3 26.03.2029 г.	0,15-0,2	Яблоня, груша	Парша, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации в фазах: «зеленый конус», розовый бутон, последующие после цветения с интервалом 10-15 дней. Расход рабочей жидкости 800-1000 л/га	28 (4)
	0,3-0,35	Яблоня	Альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации до и после цветения в фазах: розовый бутон и опадания лепестков с интервалом между обработками не более 15 дней. Расход рабочей жидкости – 1500 л/га	28 (2)
	0,3-0,4	Картофель	Альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков заболевания с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	10 (2)

Дифеноконазол + флутриафол

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 50 г/л + 30 г/л					
МЕДЕЯ, м.э. (50 г/л + 30 г/л) АО «Щелково Агрохим» П-3 31.10.2035 г.	0,8-1,0	Яблоня	Парша, мучнистая роса, монилиоз, филлостиктоз, гнили при хранении	Опрыскивание в период вегетации	30(1-4)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 65 г/л + 25 г/л					
ВИНТАЖ, м.э. (65 г/л + 25 г/л) АО «Щелково Агрохим» П-3 14.04.2031 г.	0,6-0,8	Соя	Аскохитоз, антракноз, септориоз, фузариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое –при появлении единичных признаков одной из болезней; второе – при необходимости через 10-14 дней	40(1-2)
	0,8-1,0	Горох	Аскохитоз, ржавчина, мучнистая роса		28(1-2)
	0,8 -1,0	Рис	Пирикулярриоз	Опрыскивание в период вегетации: первое-профилактическое или при появлении единичных признаков болезни в фазу появления флагового листа; второе-в начале	40(1-2)

Дифеноконазол + флуксапироксад

Серкадис Плюс, к.с. (50 г/л + 75 г/л) BASF Agro B.V. П-3 17.10.2034 г.	0,75-1,0	Яблоня	Парша, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации в фазы: появление соцветий – цветение-развитие плода. Расход рабочей жидкости - 200 л/га.	30 (3)
	0,75-1,0	Картофель	Альтернариоз		
	0,75-1,0	Томаты, капуста, лук	Альтернариоз, мучнистая роса		
	0,75-1,0	Дыня	Альтернариоз, мучнистая роса, аскохитоз		
	0,75-1,0	Морковь	Альтернариоз, мучнистая роса, пятнистость		

Дифеноконазол + ципроконазол

ЦИПРЕСС 400, к.э. (250 г/л + 150 г/л) Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария П-3 26.10.2032 г.	0,3-0,6	Подсолнечник	Ржавчина, фомоз, альтернариоз, септориоз	Опрыскивание в период вегетации в фазу 6-8 листьев	10 (1)
---	---------	--------------	--	--	--------

Дифеноконазол + цифлупрофен

ЦИДЕЛИ ТОП 140, д.к. (125 г/л + 15 г/л) Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария П-3 07.02.2030 г.	0,6-0,7	Абрикос	Монилиоз, кластероспориоз	Опрыскивание в период вегетации. Две обработки	10 (2)
	0,7-0,9	Томаты открытого грунта	Альтернариоз, кладоспориоз, мучнистая роса		
	0,6-0,7	Яблоня	Парша, мучнистая роса, монилиоз		

Дифеноконазол+ пирипроксифен

МИРАВИС ДУО 200, с.к. (125 г/л + , 75 г/л) Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария П-4 14.12.2032 г.	0,7-1,0	Огурцы закрытого грунта	Аскохитоз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации. Три обработки	10 (3)
	0,7-1,0	Яблоня	Парша, мучнистая роса, монилиоз		
	0,7-1,0	Томаты открытого грунта	Септориоз, альтернариоз, мучнистая роса, кладоспориоз		
	0,7-1,0	Томаты закрытого	Бурая пятнистость, альтернариоз, мучнистая роса		

		грунта			
--	--	--------	--	--	--

Дифеноконазол+ паклобутразол

Сетар 375 с.к. (250 г/л+125г/л) Сингента Кроп Протекшн АГ,Швейцария П-2 11.05.2033 г.	0,3-0,5	Яровой рапс	Альтернариоз, фомоз	Опрыскивание в период вегетации в фазу бутонизации	30 (1)
--	---------	-------------	---------------------	--	--------

Дифеноконазол+ масло чайного дерева

ШРИЛАНК, к.м.э. (400 г/л+150 г/л) АО ФИРМА «АВГУСТ» П-3 10.02.2036 г.	0,5-0,7	Виноград	Оидиум, серая гниль	Опрыскивание в период вегетации: первая обработкавесной в фазе бутонизация -цветение, вторая - до смыкания ягод в грозди, дальнейшие обработки с интервалом -10-14 дней. Расход рабочей жидкости 800-1000 л/га	12(4)
	0,3 - 0,7	Яблоня, груша	Парша, мучнистая роса, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации до и после цветения с интервалом не более 10-14 дней. Расход рабочей жидкости - 800 -1000 л/га	21 (3)

Додин

СИЛЛИТ, к.с. (400 г/л) Ариста ЛайфСайенс Бенилюкс Спрл, Бельгия П-3 18.01.2029 г.	1,4-2,0	Яблоня, груша	Парша	Опрыскивание в период вегетации в фазы: зеленый конус (розовый бутон), опадение 70% лепестков. Расход рабочей жидкости до 1000 л/га	60 (2)
--	---------	---------------	-------	---	--------

Ипродион

ФЛИНТ, к.э. (500 г/л) Синтезия Кемп ГмБХ, Германия П-3 28.01.2036 г.	1,5	Подсолнечник	Серая и белая гнили, ржавчина,бурая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации.	20 (2)
	1,5	Рапс	Альтернариоз		20 (1)
	1,5	Горох	Аскохитоз, серая гниль		

Ипровакарб + медь оксихлорида

Новесто, в.д.г. (84 г/кг + 406 г/кг) ТОО «Байер КА3» П-4 08.11.2034 г.	1,5-1,75	Виноград	Милдью	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 10-14 дней.	20 (3)
	1,5-1,75	Бахчевые, огурец, лук	Пероноспороз, бактериоз		
	1,5-1,75	Томат	Фитофтороз, альтернания		
	1,5-1,75	Картофель	Фитофтороз,		

Каптан

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 800 г/кг					
МАЛВИН 80%, в.д.г. (800 г/кг) Ариста ЛайфСайенс С.А.С., Франция П-3 01.03.2028 г.	1,5-2,2	Груша	Парша, монилиоз	Опрыскивание в период вегетации в фазы: зеленый конус, опадение 70% лепестков, последующие с интервалом в 8-10 дней. Расход рабочей жидкости до 1500 л/га	30 (3)
18.01.2029 г.	1,5-2,2	Яблоня	Парша, монилиоз		
ТАНКАП ЭКСТРА, в.д.г. (800 г/кг) ШАНДОНГ ВЕЙФАНГ РЕЙНБОУ КЕМИКАЛ КО., ЛТД П-3 07.04.2035 г.	1,5-2,5	Яблоня	Парша, монилиоз	Опрыскивание в период вегетации в фазы: зеленый конус, опадение 70% лепестков, последующие с интервалом в 8-10 дней. Расход рабочей жидкости до 1500 л/га	30(3)

Карбендазим

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 500 г/л					
ЗИМОШАНС, к.с. (500 г/л) ООО «Шанс» П-3 29.03.2029 г.	0,3-0,6	Пшеница яровая, ячмень яровой	Корневые, прикорневые гнили и предотвращение полегания	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 300 л/га	40 (1)
	0,5-0,6	Пшеница яровая, ячмень яровой	Мучнистая роса, гельминтоспориоз		40 (2)
	0,6-0,8	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса		48 (3)
КАРДОН, к.с. (500 г/л) ООО «Форвард», Россия П-3 27.05.2029 г.	0,3-0,6	Пшеница яровая	Корневые гнили, предотвращение полегания, мучнистая роса, гельминтоспориоз		30 (1)
	0,6-0,8	Сахарная свекла	Церкоспороз, мучнистая роса		30 (2)
КЕРБЕН 500, к.с. (500 г/л) ТОО «Agro Mark Kaz» П-3 24.03.2033 г.	0,4-0,6	Пшеница яровая	Бурая, желтая, стеблевая ржавчина, септориоз	Опрыскивание в период вегетации	30 (1)
	0,3-0,6	Пшеница, ячмень, рожь, рис	Корневые гнили, предотвращение полегания		30 (1)
	0,5-0,6	Пшеница, ячмень, рожь	Мучнистая роса, гельминтоспориоз		30 (2)
	0,4-0,6	Ячмень яровой	Стеблевая ржавчина		20 (1)
	0,4-0,6	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса		20 (3)
КРЕДО, с.к. (500 г/л) АО Фирма «Август» П-3 26.05.2030 г.	0,4-0,6	Пшеница яровая	Бурая, желтая, стеблевая ржавчина, септориоз	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	40 (2)
	0,3-0,6		Корневые гнили, предотвращение полегания		
	0,5-0,6		Мучнистая роса, гельминтоспориоз		
	0,4-0,6		Альтернариоз, мучнистая роса		
		Рапс	Белая гниль, серая гниль, фомоз, мучнистая роса	Опрыскивание посевов в фазе «елочки». Расход рабочей жидкости 300 л/га	30 (1)
	1,0-1,5	Подсолнечник			
	1,0	Лен масличный	Антракноз, фузариоз, пасмо		
	0,6-0,8	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса		30 (1)
	1,0-1,5	Соя, горох, нут, чечевица	Антракноз, аскохитоз, мучнистая роса	Опрыскивание посевов в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30 (1)

Карбендазим + азоксистробин

АЗОРРО, к.с. (300 г/л + 100 г/л) АО «Щелково Агрохим» П-3 09.04.2031 г.	0,6-0,8	Пшеница яровая	Бурая, стеблевая, желтая ржавчина, мучнистая роса, септориоз, пиренофороз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезни	20 (1-2)
		Ячмень яровой	Сетчатая и темно-бурая пятнистость, ринхоспориоз		

Карбендазим + пираклостробин

ФЕРАЗИМ ГРИН, к.с. (300 г/л + 100 г/л) Представительство ООО «Агро Эксперт Групп» в РК П-3 15.07.2031 г.	0,8-1,0	Пшеница яровая	Бурая, стеблевая и желтая ржавчина, септориоз, гельминтоспориозные пятнистости, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	30 (2)
	0,8-1,0	Ячмень яровой	Стеблевая и желтая, карликовая ржавчина, гельминтоспориозные пятнистости, сетчатая и темно- бурая пятнистости, мучнистая роса		30 (2)
	0,8-1,5	Лен	Антракноз, аскохитоз, альтернариоз, фомоз и ржавчина		- (1)

Касугамицин

КАСУМИН 2Л, 2% в.р. (20 г/л) Хокко Кемикал Индастри Ко., Лтд, Япония П-3 14.03.2027 г.	2,0-4,0	Яблоня, груша	Бактериальный ожог плодовых культур	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 1000-1500 л/га	7 (3)
	1,0-1,5	Рис	Пирикулярриоз	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 100-300 л/га	7 (3)
	1,0-2,0	Томаты	Бактериальный рак томатов, сосудистые бактериозы овощных культур	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	7 (3)

Каллоидное серебро

ЗЕРОКС, в.к.р. (3000 мг/л) ООО «Нанобиотех», Россия П-3 05.03.2030 г.	0,3-0,4	Картофель	Ризоктониоз, фузариоз, бактериальные гнили	Опрыскивание клубней перед посадкой. Расход – 10 л/га	-1
	2,0-3,0	Картофель	Фитофториоз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое-профилактическое, последующие – с интервалом 7-9 дней. Расход рабочей жидкости – 300 л/га	14 (3)
	1,0-2,0	Капуста	Сосудистый бактериоз		14 (4)
	2,0-4,0	Яблоня	Парша, мучнистая роса, бактериальный ожог	Опрыскивание в период вегетации: первое-в фазе зеленый конус, второе-начало цветения, третье – в фазе развития плода «лещина», четвертое – профилактическое в фазе роста плодов. Расход рабочей жидкости – 300-400 л/га	14 (4)
	1,0-2,0	Лук	Пероноспороз, шейковая гниль	Опрыскивание в период вегетации: первое-профилактическое, последующие – с интервалом 7-9 дней. Расход рабочей жидкости – 300 л/га	

Крезоксим-метил

СТРОБИ 50%, в.д.г. (500 г/кг) BASF SE, Германия П-3 05.04.2033 г.	0,15-0,2	Яблоня	Парша, мучнистая роса, монилиоз	Опрыскивание в период вегетации	30 (3)
--	----------	--------	---------------------------------	---------------------------------	--------

Крезоксим-метил + эпоксиконазол

ИДЕАЛ, к.с. (250 г/л + 250 г/л) Представительство ООО «Землякофф кроп протекшен» в РК П-3 16.03.2032 г.	0,4-0,5	Пшеница озимая, яровая; ячмень озимый и яровой	Для пшеницы озимой и яровой: мучнистая роса, бурая ржавчина, пиренофороз, септориоз листьев и колоса, темно- бурая пятнистость, фузариоз колоса. Для ячменя озимого и ярового: мучнистая роса, карликовая ржавчина, стеблевая ржавчина, сетчатая и темно- бурая пятнистости, ринхоспориоз.	Для пшеницы озимой и яровой: Опрыскивание в период вегетации в фазы конец кущения- начало колошения; против фузариоза колоса: конец колошения – начало цветения. Расход рабочей жидкости – 200 л/га. Для ячменя озимого и ярового: Опрыскивание в период вегетации в фазы конец кущения- выдвигание колоса. Расход рабочей жидкости 200 л/га.	30(2)
--	---------	--	--	---	-------

Мандипропамид

РЕВУС 250, с.к. (250 г/л) Сингента Кроп Протекшн АГ,Швейцария П-3 09.03.2033 г.	0,6	Томаты	Фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации	20 (2)
--	-----	--------	------------	---------------------------------	--------

Мандипропамид + дифеноконазол

РЕВУС ТОП 500, с.к. (250 г/л + 250 г/л) Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария П-3 22.01.2034 г.	0,6	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации	20 (2)
17.12.2035 г.	0,6	Томаты открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз		14 (2)

Манкоцеб

Концентрация д.в. (+/- 5%)– 800 г/кг					
Дитан М-45, с.п. (800 г/кг) Arysta LifeScience S.A.S П-4 14.01.2036 г.	1,2-1,6	Картофель, томаты	Фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации	20 (3)
	2,5-3,0	Яблоня	Парша		- (2)
ФУНГОЦЕБ 80%, с.п. (800 г/кг) ДВА Агро ГмбХ, Германия П-4 13.01.2031 г.	1,2-1,6	Картофель, томаты	Фитофтороз, макроспориоз	Опрыскивание в период вегетации	20 (5)
	2,0-3,0	Виноградная лоза	Милдью		30 (6)
	2,5-3,0	Яблоня	Парша		30 (2)
	2,0-2,5	Картофель семенной	Ризоктониоз		30 (5)

Манкоцеб + диметоморф

АКРОБАТ МЦ, в.д.г. (600 г/кг + 90 г/кг) БАСФ Агро Б.В., Швейцария П-4 19.02.2030 г.	2	Картофель	Фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации	20 (3)
	2	Лук, огурцы	Пероноспороз		15 (3)
	2	Виноград	Милдью		15 (3)

Манкоцеб + металаксил

Концентрация д.в. (+/- 5%) – 640 г/кг + 40 г/кг					
Манлакс Плюс, в.д.г. (640 г/кг + 40 г/кг) ШАНДОНГ ВЕЙФАНГ РЕЙНБОУ КЕМИКАЛ КО., ЛТД, П-3 19.02.2036 г.	2,5	Виноград	Мучнистая роса, пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации 0.5-0.6% суспензией препарата с интервалом 10-14 дней	20 (3)
	2,5	Картофель	Фитофтороз, макроспориоз		
	2,5	Лук	Пероноспороз		
	2,5	Томаты открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации	10 (3)
Концентрация д.в. (+/- 5%) – 640 г/кг + 80 г/кг					
Агромил Голд, с.п. (640 г/кг + 80 г/кг) ТОО «Агро-Хим-Лидер» П-4 28.08.2034 г.	2,5	Виноград	Милдью	Опрыскивание в период вегетации	20 (3)
	2,5	Томаты открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз		10 (3)
	2,5	Огурцы открытого грунта	Пероноспороз		6 (3)
	2,5	Лук	Пероноспороз		15 (3)
	2,5	Картофель	Фитофтороз, макроспориоз		15 (3)
МЕТАКСИЛ, с.п. (640 г/кг + 80 г/кг) АО Фирма «Август» П-3 27.12.2032 г.	2,0-2,5	Картофель	Фитофтороз, макроспориоз	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости 400 л/га	15 (3)
	2,0-2,5	Лук	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости 600 – 800 л/га	15 (3)
	2,0-2,5	Огурцы открытого грунта	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости - 400 – 600 л/га	6 (3)
	2,0-2,5	Томаты открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости 300 – 500 л/га	10 (3)
	2,0-2,5	Виноградная лоза	Милдью	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости 800- 1000 л/га	15-20 (3)
МЕТАМИЛ МЦ, с.п. (640 г/кг + 80 г/кг) АО «Щелково Агрохим» П-3 30.12.2032 г.	2,0-2,5	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание: первое – профилактическое, последующие с интервалом 10-14 дней	20 (3)
МЕТАШАНС, с.п. (640 г/кг + 80 г/кг) ООО «Шанс» П-3 15.03.2029 г.	2,0-2,5	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое , последующие с интервалом 10- 14 дней. Расход рабочей жидкости – 300-500 л/га	20 (3)
РАТАМИЛ 72%, с.п. (640 г/кг + 80 г/кг) AGROBEST GRUP, Турция П-3 17.02.2030 г.	2,5	Картофель	Фитофтороз, макроспориоз	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 10-14 дней	20 (3)
	2,5	Виноградная лоза	Милдью	Опрыскивание в период вегетации 0,02% суспензией препарата	20 (3)
ТЯНЬ-ШАНЬ 72%, с.п. (640 г/кг + 80 г/кг) ТОО «Agro Mark Kaz» П-3 17.03.2033 г.	2,5	Картофель	Фитофтороз, макроспориоз	Опрыскивание в период вегетации	15 (3)
	2,5	Лук	Пероноспороз		6 (3)
	2,5	Огурцы открытого грунта	Пероноспороз		10 (3)
	2,5	Томаты открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз		20 (3)
	2,0-2,25	Виноградная лоза	Милдью		
ФАНТОМ, с.п. (640 г/кг + 80 г/кг) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-3 04.05.2031 г.	2,0-2,5	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание: первое- профилактическое , последующие с интервалом 10-14 дней	10-14 (3)
	2,0-2,5	Томаты открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз		
	2,0-2,5	Огурцы открытого грунта	Пероноспороз		

Манкоцеб + мефеноксам

РИДОМИЛ ГОЛД МЦ 68, в.д.г. (640 г/кг + 40 г/кг) Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария П-4 27.10.2030 г.	2,5	Томаты	Фитофтороз, бурая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации	10 (3)
17.03.2027 г.	2,5	Картофель	Фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации 0.5-0.6% суспензией препарата с интервалом 10-14 дней	20 (3)
	2,5	Лук	Пероноспороз		
	2,5	Огурцы	Мучнистая роса, пероноспороз		
	2,5	Виноград	Милдью		

Манкоцеб + цимоксанил

ОРДАН МЦ, с.п. (640 г/кг + 80 г/кг) АО Фирма «Август» П-3 20.06.2032 г.	2,0-2,5	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое- профилактическое последующие с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости 400- 600 л/га	28 (3)
	2,0-2,5	Томаты открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз		10 (3)
	2,0-2,5	Огурцы открытого грунта	Пероноспороз		12 (3)
	2,0	Лук	Пероноспороз		20 (3)
	2,0-2,5	Виноград	Милдью	Опрыскивание в период вегетации: первое-профилактическое последующие с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости 800- 1000 л/га	20 (3)
	2-2,5	Яблоня	Парша	Опрыскивание в период вегетации: первое- профилактическое , последующие с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости – до 1000 л/га	20 (3)

Меди оксихлорид + оксадикил

ХЛОРОШАНС, с.п. (670 г/кг + 130 г/кг) ООО «Шанс» П-3 20.03.2029 г.	1,5-2,0	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первая обработка до смыкания рядков или при высоте растений 15-20 см, вторая в период бутонизации, последующая в зависимости от развития болезни и погодных условий. Расход рабочей жидкости – 300-500 л/га	10 (3)
	1,5-2,0	Виноград	Милдью	Опрыскивание в период вегетации: первая обработка при появлении первых пятен в фазе образования – разрыхления соцветий и обособление бутонов (за 10 дней до цветения), вторая – позднее цветение, третья – формирование ягод, четвертая – ягода размером с горошину. Расход рабочей жидкости – 800-1000 л/га	20 (4)
	1,5-2,0	Томаты открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первая обработка при появлении первых признаков заболевания или профилактическая, последующие с интервалом 10-12 дней. Расход рабочей жидкости – 300-500 л/га	14 (3)
	1,5-2,0	Огурцы открытого грунта	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первая обработка при появлении первых признаков заболевания, последующие с интервалом 7-10 дней в зависимости от развития болезни. Расход рабочей жидкости 800 л/га	5 (3)

Меди сульфат трехосновный

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 345 г/л					
КУМИР, с.к. (345 г/л) АО Фирма «Август» П-3 07.02.2029 г.	5	Яблоня	Парша	Опрыскивание в период вегетации: первое – в фазу «зеленый конус», последующие с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости до 1000 л/га	15 (3)
	5,0-6,0	Виноград	Милдью	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое (перед цветением), последующие с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости до 1000 л/га	20 (4)
22.04.2030 г.	5	Картофель	Фитофтороз, макроспориоз, ризиктониоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости до 400 л/га	30 (3)
	5	Томат	Фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости до 400-500 л/га	20 (3)
ИНДИГО, к.с. (345 г/л) АО «Щелково Агрохим» П-3 14.04.2031 г.	3,0-5,0	Яблоня, груша	Парша, монилиальный ожог	Опрыскивание в период вегетации: первое – до цветения при появлении первых признаков болезни, последующие – через 7-10 дней	15 (3)
	3,0-6,0	Виноград	Серая гниль, антракноз, черная пятнистость, милдью		20 (3)
	3,0-5,0	Слива, персик, вишня	Монилиоз, клостероспориоз, курчавость листьев		7 (3)
	5,0	Лук	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: 1-профилактическое, последующие с интервалом 7-10 дней.	20(3)
	5,0	Огурцы открытого грунта	Пероноспороз, бурая угловатая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации: 1-профилактическое, последующие с интервалом 7-10 дней.	20(3)
	5,0	Томаты открытого грунта	фитофтороз, альтернариоз		20(3)
	5,0	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз		30(3)
ЧИСТОСАД, к.с. (345 г/л) ООО «Шанс» П-3 09.02.2034 г.	5,0	Яблоня	Парша	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости до 1000 л/га	15(3)
	5,0–6,0	Виноград	Милдью	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 800–1000 л/га	20(4)
	4,5-5,0	Косточковые культуры (абрикос)	Клястероспориоз, курчавость листьев, монилиоз	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание – профилактическое в фазе распускания плодовых почек, последующие – с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости 800-1000 л/га	7(4)

Мефеноксам + тебуконазол

СЕРТИКОР 050, к.с. (20 г/л + 30 г/л) Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария П-3 07.02.2030 г.	0,75-1,0	Пшеница озимая	Пыльная, твердая головня, корневые гнили и плесневение семян	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры	-1
---	----------	----------------	--	--	----

Мепикват-хлорид + пираклостробин+ прогексадион кальция

Архитект, с.э. (150 г/л + 100 г/л +25 г/л) BASF Agro B.V. П-4 20.02.2034 г.	1,0- 1,5	Подсолнечник	Склеротиниоз, фомоз, альтернариоз, ржавчина, септориоз, регулятор роста растений	Опрыскивание культуры от фазы 6 настоящих листьев до фазы Конца образования корзинки. Расход рабочей жидкости – 200 л/га	50 (2)
--	----------	--------------	--	--	--------

Сульфат гентамицина + гидрохлорид окситетрациклина

Агри Гент Плюс 800, с.п. (20 г/кг+60 г/кг) Филиал АО "Сумитомо Корпорэйшн" в Алматы П-3 17.09.2035 г.	1,75 – 2,8	Огурец	Бактериальное увядание, Угловатая бактериальная пятнистость листьев огурца, бактериальная гниль	Листовое опрыскивание	2 (3)
	2,4	Томаты	Рак томатов	Листовое опрыскивание	5 (3)
	1,75 – 2,8	Томаты	Бактериальная пятнистость	Листовое опрыскивание	5 (2)
	0,8 – 1,6	Груша, яблоня	Бактериальный ожог плодовых культур	Листовое опрыскивание	21 (2)

Спироксамин + протиоконазол + тебуконазол

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 224 г/л + 53 г/л + 148 г/л					
СОЛИГОР, к.э.	0,4-0,6	Пшеница яровая и озимая	Ржавчины (бурая, стеблевая, желтая), септориоз, гельминтоспориозные пятнистости, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации	30 (1)

(224 г/л + 53 г/л + 148 г/л) Байер КрокСайенс АГ, Германия П-3 15.04.2031 г.	0,4-0,6	Ячмень яровой	Стеблевая ржавчина, гельминтоспориоз ные пятнистости, мучнистая роса		40 (1)
23.07.2029 г.	0,6-0,8	Горох	Ржавчина, аскохитоз, фузариоз		
	0,6-0,8	Нут	Аскохитоз, фузариоз,		
	0,6-0,8	Чечевица	Ржавчина, аскохитоз, фузариоз		
	0,6-0,8	Соя	Аскохитоз, фузариоз		
	0,6-0,8	Лен	Альтернариоз, фузариозное увядание, антракноз, фомоз, аскохитоз		
Торианит, к.э. (224 г/л + 53 г/л + 148 г/л) ТОО «Астана-Нан» П-3 26.02.2036 г.	0,6-0,8	Нут, соя	Аскохитоз, фузариоз,	Опрыскивание в период вегетации	40 (1)
	0,6-0,8	Чечевица, горох	Ржавчина, аскохитоз, фузариоз		
	0,6-0,8	Лен	Альтернариоз, фузариозное увядание, антракноз, фомоз, аскохитоз		
	0,6-0,8	Рапс	Альтернариоз, фомоз		
Хелс Про, к.э. (224 г/л + 53 г/л + 148 г/л) ТОО «EcoSave» П-3 26.02.2036 г.	0,4-0,6	Пшеница яровая	Ржавчины (бурая, стеблевая, желтая), септориоз, гельминтоспориоз ные пятнистости	Опрыскивание в период вегетации	30 (1)

Спироксамин + тебуконазол + триадименол

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 250 г/л + 167 г/л + 43 г/л					
ПРОФЕССОР, к.э. (250 г/л + 167 г/л + 43 г/л) Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд, Китай П-3 02.11.2027 г.	0,4-0,6	Пшеница яровая	Бурая ржавчина, септориоз, гельминтоспориозная пятнистость	Опрыскивание в период вегетации	30 (1)
	0,6	Пшеница озимая	Стеблевая ржавчина, септориоз, гельминтоспориозная пятнистость		
РЕМИ, к.э. (250 г/л + 167 г/л + 43 г/л) Синтезия Кемп ГмбХ, Германия П-3 29.12.2035 г.	0,4-0,6	Пшеница яровая	Ржавчина бурая, септориозно-гельминтоспориоз ные пятнистости	Опрыскивание в период вегетации	30 (1)
	0,4-0,6	Ячмень яровой	Стеблевая ржавчина, гельминтоспориоз ная пятнистость		
Тенгри к.э. (250 г/л + 167 г/л + 43 г/л) ТОО «Агро Глобал» П-2 25.12.2035 г.	0,4-0,6	Пшеница яровая	Бурая ржавчина, мучнистая роса, септориоз, гельминтоспориоз ная пятнистость	Опрыскивание в период вегетации	30 (1)
	0,4-0,6	Ячмень яровой	Мучнистая роса, стеблевая ржавчина, гельминтоспориозная пятнистость		
	0,6	Пшеница озимая	Стеблевая ржавчина, септориоз, гельминтоспориоз ная пятнистость, мучнистая роса		
Триадин к.э. (250 г/л + 167 г/л + 43 г/л) ТОО «Астана-Нан» П-3 09.09.2035 г.	0,4-0,6	Пшеница яровые	Бурая ржавчина, мучнистая роса, септориоз, гельминтоспориозная пятнистость, стеблевая ржавчина, септориоз, гельминтоспориозная пятнистость, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации	30(1)
	0,6	Пшеница озимая			
	0,4	Виноград	Оидиум	Опрыскивание в период вегетации до цветения, после цветения, ягода размером с крупинку, зеленая ягода.	35(3)
	0,5-0,6	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз	Опрыскивание в период вегетации в фазе начало смыкания рядков, последующие - с интервалом 14-16 дней.	35(2)
ФАЛЬКОН 46%, к.э. (250 г/л + 167 г/л + 43 г/л) Байер КрокСайенс АГ П-3 15.04.2031 г.	0,4-0,6	Пшеница яровая	Бурая ржавчина, мучнистая роса, септориоз, гельминтоспориозная пятнистость	Опрыскивание в период вегетации	30 (1)
	0,6	Пшеница озимая	Стеблевая ржавчина, септориоз, гельминтоспориозная пятнистость, мучнистая роса		
	0,4-0,6	Ячмень яровой	Мучнистая роса, стеблевая ржавчина, гельминтоспориозная пятнистость		

Пенконазол

ТОПАЗ 100, к.э. (100 г/л) Сингента Крок Протекшн АГ, Швейцария П-3 16.11.2032 г.	0,125-0,15	Огурцы открытого грунта	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации	20 (2)
	0,5-0,75	Огурцы защищенного грунта	Мучнистая роса	0.025% эмульсией препарата	3 (3)
	0,2-0,4	Смородина черная	Американская мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации 0.025-.005% эмульсией препарата	20 (4)
	0,4-0,5	Виноградная лоза	Оидиум	Опрыскивание в период вегетации 0.05% эмульсией препарата	20 (4)
	0,5-1,0	Персик	Мучнистая роса, плодовая гниль		20 (3)
	0,3-0,5	Земляника	Мучнистая роса	Опрыскивание до цветения и после сбора урожая 0.05% эмульсией препарата	-2
	0,3-0,4	Вишня (маточки)	Коккомикоз		-2
	0,3-0,4	Смородина черная (маточки, питомники)	Мучнистая роса		-4
	0,3-0,6	Малина (питомники)	Пурпуровая пятнистость, серая гниль	Опрыскивание в период вегетации 0.05- 0.1% эмульсией препарата	-2

Пиракlostробин

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 200 г/л					
Кластро, к.э. (200 г/л) ТОО «Астана-Нан» П-3 27.01.2035 г.	0,5-1,0	Нут, чечевица, горох	Аскохитоз, антракноз	Опрыскивание в период вегетации	30(1)
	0,6	Лён	Альтернариоз, фомоз, антракноз		
	0,5-1,0	Подсолнечник	Склеротиниоз (белая гниль), серая гниль	Опрыскивание в фазу 8 листьев культуры. Начало - середина цветения	30(1)
	0,6	Ячмень яровой	Желтая и стеблевая ржавчины, роса мучнистая, септориоз, гельминтоспориоз	Опрыскивание в период вегетации	30(1)

	0,6	Пшеница яровая	Бурая и стеблевая ржавчины, роса мучнистая, септориоз, гельминтоспориоз		
ОПТИМО 20%, к.э. (200 г/л) БАСФ СЕ, Германия П-3 17.02.2031 г.	0,6	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Бурая, желтая и стеблевая ржавчина, септориоз, гельминтоспориоз, желтая, темно-бурая и сетчатая пятнистости, мучнистая роса, повышение урожайности	Опрыскивание в период вегетации	30(1)
17.07.2028 г.	0,5	Соя	Аскохитоз, пероноспороз, повышение урожайности	Опрыскивание посевов в фазе бутонизация – начало цветения профилактическое или при появлении первых признаков болезни	30(1)
	0,5	Кукуруза	Пузырчатая головня, фузариоз, плесневение початков, повышение урожайности	Опрыскивание посевов с видимого образования междоузлий – выметывание початков нитей	30(1)
Пиракрос к.э. (200 г/л) ТОО «АЙБАД-2015» П-3 30.07.2034 г.	0,6	Пшеница яровая, ячмень яровой	Бурая, желтая и стеблевая ржавчина, септориоз, гельминтоспориоз, желтая, темно-бурая и сетчатая пятнистости, мучнистая роса, повышение урожайности	Опрыскивание в период вегетации	30(1)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 250 г/л					
Инспектор к.э. (250 г/л) ТОО «ФМРус» П-3 28.02.2034 г.	0,4	Кукуруза (на зерно)	Фузариоз	Опрыскивание в период вегетации профилактическое или при появлении первых признаков болезней в фазы видимое образование междоузлий или выметание початковых нитей. Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании – 300 л/га, авиационном – 50 л/га.	60(1)
	0,4	Соя	Аскохитоз, пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации профилактическое при появлении первых признаков болезней. Расход рабочей жидкости 300 л/га	60(1)
	0,3-0,6	Пшеница яровая	Ржавчина, септориоз	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га.	30(1)
	0,3-0,6	Подсолнечник	Аскохитоз, ржавчина, белая и серая гнили, альтернариоз, фомоз	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 300-400 л/га	30(1)
	0,3-0,6	Горох	Аскохитоз, ржавчина, белая и серая гнили, альтернариоз, фомоз	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 300 л/га	30(1)
	0,4	Яблоня	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 1000 л/га	30(1)
	0,4	Соя	Септориоз	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	30(1)
	0,4	Кукуруза	Пузырчатая головня, гельминтоспориоз	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	30(1)

Пиракlostробин + пропиконазол

МАСТЕР ПЛЮС, к.э. (200 г/л + 100 г/л) ТОО «Agro Mark Kaz» П-4 17.02.2027 г.	0,4-0,6	Пшеница яровая	Мучнистая роса, бурая, стеблевая, желтая ржавчина, септориозно-гельминтоспориозные пятнистости, септориоз, фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации (кроме фузариоза колоса) в фазах флаговый лист – начало колошения. Против фузариоза колоса – конец колошения. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	30 (1)
	0,4-0,6	Пшеница озимая	Мучнистая роса, септориозно-гельминтоспориозные пятнистости, желтая ржавчина	Опрыскивание в период вегетации (кроме фузариоза колоса) в фазах флаговый лист – начало колошения. Против фузариоза колоса – конец колошения. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	30 (1)
	0,4-0,6	Ячмень яровой и озимый	Сетчатая пятнистость, мучнистая роса, желтая ржавчина	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых симптомов заболевания. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	0 (1)
	0,7	Рапс	Альтернариоз, фомоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых симптомов заболевания в фазе вытягивания стеблей – начало образования стручков в нижнем ярусе растений. Расход рабочей жидкости 200- 400 л/га	30 (1)
	0,5	Соя	Аскохитоз, пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков заболевания. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	30 (2)

Пиракlostробин + тебуконазол

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 97 г/л + 400 г/л					
РИДЕЛЬ, к.с. (97 г/л + 400 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-3 20.04.2028 г.	0,25	Пшеница яровая	Бурая, желтая, стеблевая ржавчина, септориоз, гельминтоспориозные пятнистости	Опрыскивание в период вегетации	28 (1)
	0,25	Ячмень яровой	Стеблевая, желтая ржавчина, септориоз, гельминтоспориозные пятнистости		
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 115 г/л + 230 г/л					
ПИЛАРТЕП, к.с. (115 г/л + 230 г/л) Пиларквим Шанхай Ко Лтд, Китай П-3 21.02.2030 г.	0,4-0,6	Яровая пшеница	Бурая, желтая, стеблевая ржавчина, септориоз, гельминтоспориоз, желтая пятнистость, повышение урожайности	Опрыскивание в период вегетации	14 (2)
		Озимая пшеница	Бурая, желтая, стеблевая ржавчина, септориоз, гельминтоспориоз, желтая, темно-бурая, сетчатая пятнистость, мучнистая роса, повышение урожайности		
		Яровой ячмень	Бурая, стеблевая ржавчина, септориоз, гельминтоспориоз, желтая, темно-бурая, сетчатая пятнистость, повышение урожайности		

Пиракlostробин + тебуконазол + дифеноконазол

МИСТЕРИЯ, м.э. (80 г/л + 80 г/л + 40 г/л.) АО «Щелково Агрохим» П-3 13.02.2033 г.	0,8-1,0	Подсолнечник	Альтернариоз, белая гниль, серая гниль, фомоз, ржавчина	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одной из болезней, последующее - с интервалом 10-14 дней	40 (1-2)
	0,8-1,0	Соя	Аскохитоз, септориоз, церкоспороз, пероноспороз.		40 (1-2)
	0,8-1,0	Свёкла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз		21 (1-2)

Пикоксистробин + ципроконазол

АКАНТО ПЛЮС, к.с. (200 г/л + 80 г/л) ТОО «Кортева Агрисаенс Казахстан» П-3 24.03.2027 г.	0,5-0,7	Рис	Пирикулярриоз	1-ое опрыскивание – появление флаг-листа, 2-ое опрыскивание – начало выметывания метелки. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га при наземной обработке и 50-100 л/га при авиационной	40 (2)
15.10.2028 г.	0,5-0,7	Рапс	Альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое при появлении первых признаков болезни или начало образования стручков. Расход рабочей жидкости: 300-400 л/га	40 (1)
	0,5-0,7	Соя	Пероноспороз, аскохитоз, антракноз, фузариозное увядание	Опрыскивание в период вегетации: бутонизация – начало цветения. Расход рабочей жидкости 300 л/га	40 (2)

Пиракlostробин + эпоксиконазол

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 62,5 г/л + 62,5 г/л					
АБАКУС УЛЬТРА, с.э. (62,5 г/л + 62,5 г/л) BASF SE, Германия П-3 30.11.2026 г.	1,0-1,5	Пшеница и ячмень яровые	Бурая и стеблевая ржавчины, септориозно-гельминтоспориозные пятнистости, повышение урожайности	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)
	1,0-1,5	Пшеница озимая	Бурая ржавчина, септориозно-гельминтоспориозные пятнистости		
РАСТ, с.э. (62,5 г/л + 62,5 г/л) ТОО «Астана-Нан» П-3 20.12.2031 г.	1,0-1,5	Пшеница и ячмень яровые. Озимая пшеница	Бурая, стеблевая и желтая ржавчины, мучнистая роса, септориозно-гельминтоспориозные пятнистости, повышение урожайности	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 85 г/л + 62,5 г/л					
РОСКАНА, с.э. (85 г/л + 62,5 г/л) AGROBEST GRUP, Турция П-3 26.10.2032 г.	1,0-1,5	Озимая пшеница	Бурая, желтая ржавчина, септориозно-гельминтоспориозные пятнистости, повышение урожайности	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)
	1,0-1,5	Яровая пшеница, яровой ячмень	Бурая, стеблевая ржавчина, септориозно-гельминтоспориозные пятнистости, повышение урожайности		
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 133 г/л + 50 г/л					
ПИКСТАР, с.э. (133 г/л + 50 г/л) Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд, Китай П-3 23.07.2028 г.	1,5	Пшеница яровая	Бурая, стеблевая ржавчина, мучнистая роса, септориозно-гельминтоспориозные пятнистости, повышение урожайности	Опрыскивание посевов в период вегетации	30 (2)
	1,5	Пшеница озимая	Бурая, желтая ржавчина, мучнистая роса, септориозно-гельминтоспориозные пятнистости, повышение урожайности		
	1,5	Ячмень яровой	Бурая, стеблевая, желтая ржавчина, мучнистая роса, септориозно-гельминтоспориозные пятнистости, повышение урожайности		

Пропамакарб + фосэтил

ПРЕВИКУР ЭНЕРДЖИ, в.к. (530 г/л + 310 г/л) ТОО «Байер КАЗ» П-4 23.02.2034 г.	2,5	Огурцы, дыни открытого и защищенного грунта	Ложная мучнистая роса (пероноспороз)	Опрыскивание растений в период вегетации	1 (2)
	3 мл/м ²	Рассада огурцов, дынь, арбузов, томатов, баклажанов открытого и защищенного грунта	Корневые и прикорневые гнили	Полив после посева семян – 3 мл/2л рабочего раствора/м2, повторно полив через 7-10 дней – 3 мл/2л рабочего раствора/м2	-2
	3-6 мл/м ²	Рассада перцев открытого и защищенного грунта	Корневые и прикорневые гнили	Полив после посева семян – 3 мл/2л рабочего раствора/м2, повторно полив через 7-10 дней – 3-6 мл/2л рабочего раствора/м2	-2
	2-3	Огурцы, томаты, баклажаны, перцы открытого и защищенного грунта	Корневые и прикорневые гнили	Полив (капельный) после высадки рассады, с интервалом 14 дней	1 (4)
	2-3	Дыни, арбузы открытого грунта	Корневые и прикорневые гнили		1 (2)
	3 мл/м ²	Декоративные культуры (в том числе защищенного грунта)	Прикорневые гнили	Полив грунта после посева культуры – 3 мл/2л рабочего раствора/м2, повторно через 7-10 дней	-2
	3,0	Декоративные культуры (в том числе защищенного грунта)	Прикорневые гнили	Полив (капельный) по вегетации культуры	-2
	2,5	Декоративные культуры (в том числе защищенного грунта)	Ложная мучнистая роса	Опрыскивание растений в период вегетации	-2

Пропамакарб гидрохлорид + флуопиколид

<i>Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 625 г/л + 62,5 г/л</i>					
ПИКОКАРБ, к.с. (625 г/л + 62,5 г/л) «Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд», Китай П-3 01.08.2029 г.	1,2-1,6	Картофель	Фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации	7 (2-4)
Хадсон, к.с. (625 г/л + 62,5 г/л) ТОО «Байер КАЗ» П-3 05.09.2034 г.	1,4-1,6	Огурец открытого грунта	Переноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 7 –14 дней. Расход рабочей жидкости 400 л/га	7(3)
	1,4-1,6	Томат открытого грунта	Фитофтороз		20(2)
	1,6	Лук (кроме лука на перо)	Переноспороз		(3)
	1,2-1,6	Картофель	Фитофтороз		7(4)

Пропамакарб гидрохлорид + цимоксанил

Проксанил, 45%, к.с. (400 г/л + 50 г/л) Arysta LifeScience BeneluxSprl П-3 27.01.2035 г.	2,0-2,5	Томаты	фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков заболеваний	30(3)
	2,0-2,5	Картофель	Фитофтороз, макроспориоз		

Пропиконазол

Концентрация д.в. (+/- 5%)– 250 г/л					
АБРИС 25%, к.э. (250 г/л) ТОО «Агро Глобал» П-3 24.10.2026 г.	0,5	Пшеница яровая	Бурая и стеблевая ржавчина, септориоз, гельминтоспориозная пятнистость	Опрыскивание в период вегетации	30(1)
Бульдог, к.э. (250 г/л) ООО «Интер Групп» П-3 20.09.2034 г.	0,5	Пшеница яровая	Ржавчина бурая, стеблевая, желтая, септориоз, мучнистая роса, пиренофороз, гельминтоспориозная пятнистость	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200 л/га.	30(1)
	0,5	Ячмень яровой	Сетчатая пятнистость, мучнистая роса, карликовая ржавчина		
	0,5	Овес	Корончатая ржавчина, красно-бурая пятнистость		
ВЕРСУС 250, к.э. (250 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-3 20.05.2034 г.	0,5	Ячмень яровой	Желтая, стеблевая ржавчины, септориоз, гельминтоспориозные пятнистости, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации	30(2)
	0,5	Пшеница яровая	Бурая, желтая, стеблевая ржавчины, септориоз, гельминтоспориозные пятнистости, мучнистая роса		
ПРОПИКОН, к.э. (250 г/л) ТОО «Астана-Нан» П-3 02.10.2030 г.	0,5	Пшеница яровая	Ржавчина бурая и стеблевая, септориозно-гельминтоспориозная пятнистость, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации	30 (1)
	0,5	Яровой ячмень	Мучнистая роса, темно-бурая пятнистость, сетчатая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации	30 (1)
Прозол, к.э. (250 г/л) ШАНДОНГ ВЕЙФАНГ РЕЙНБОУ КЕМИКАЛ КО., ЛТД П-3 27.03.2036 г.	0,5-0,7	Яровая и озимая пшеница	Ржавчина стеблевая, желтая, септориоз, мучнистая роса, гельминтоспориозная пятнистость (в том числе темна-бурая пятнистости)	Опрыскивание в период вегетации	30 (1)
	0,5-0,7	Яровой ячмень	Ржавчина стеблевая, желтая, септориоз, мучнистая роса, гельминтоспориозная пятнистость (в том числе темна-бурая пятнистости)	Опрыскивание в период вегетации	30 (1)
ПРОПИШАНС, к.э. (250 г/л) ООО «Шанс» П-3 23.06.2031 г.	0,5	Ячмень яровой	Мучнистая роса, сетчатая пятнистость, темно- бурая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 300 л/га	40 (1)
	0,5	Пшеница яровая и озимая	Мучнистая роса, пиренофороз, ржавчина бурая, ржавчина желтая, септориоз листьев и колоса	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 300 л/га	40 (1)
ТИЛАД 250, к.э. (250 г/л) Моер Кемсайенс Ко. Лтд., Китай П-3 10.12.2028 г.	0,5	Пшеница яровая и озимая	Бурая, желтая и стеблевая ржавчина, септориоз, гельминтоспориоз,мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых симптомов заболевания	30 (1)
	0,5-0,7	Ячмень яровой	Бурая, желтая и стеблевая ржавчина, септориоз, гельминтоспориоз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых симптомов заболевания	30 (1)
ТИЛТ 250, к.э. (250 г/л) Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария П-3 16.11.2032 г.	0,5	Пшеница яровая и озимая	Ржавчина бурая, стеблевая, желтая, септориоз, мучнистая роса, гельминтоспориозная пятнистость	Опрыскивание в период вегетации	30 (1)
	0,5	Ячмень яровой и озимый	Сетчатая пятнистость		
	0,5	Рожь озимая	Ржавчина бурая, стеблевая, септориоз, мучнистая роса, ринхоспориоз, церкоспореллез		
	0,5	Овес	Корончатая ржавчина, красно- бурая пятнистость		
	0,5	Райграс пастбищный, кострец безостый, овсяница луговая (семенные посевы)	Гельминтоспориоз	Опрыскивание в фазе стеблевания 0,2% эмульсией препарата	30 (1)
	1,0	Клевер луговой 2-го года вегетации	Антракноз, аскохитоз, бурая пятнистость		
	1,5	Смородина черная (маточки)	Американская мучнистая роса, антракноз, септориоз		
	0,4-0,5	Смородина черная (маточки,питомники)	Американская мучнистая роса		
ТИНАЗОЛ, к.э. (250 г/л) ТОО «ФМРус» П-3 17.03.2035 г.	0,5	Рапс	Альтернариоз, фомоз.	Опрыскивание в период вегетации	30 (1)
	0,5	Пшеница и ячмень яровые	Септориоз, ржавчина	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200- 300 л/га	30(1)
ФАСТ 250, к.э. (250 г/л) ТОО «Бартонс Кемикал ГмбХ» П-3 17.02.2030 г.	0,5	Пшеница и ячмень яровые, пшеница озимая	Септориоз, бурая, желтая, стеблевая ржавчина, гельминтоспориозная пятнистость, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации	30 (1)
Концентрация д.в. (+/- 5%)– 390 г/л					
КОБАЛЪТ, к.м.э. (400 г/л) АО Фирма «АВГУСТ» П-3 14.03.2034 г.	0,25-0,35	Пшеница яровая	Бурая ржавчина, стеблевая ржавчина, мучнистая роса, септориоз, пиренофороз	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 300 л/га	40 (1-2)
	0,25-0,35	Ячмень яровой	Сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, мучнистая роса, стеблевая ржавчина, ринхоспориоз		40 (1)
	0,3-0,4	Горох	Аскохитоз, мучнистая роса, антракноз, ржавчина	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков одного из заболеваний, второе через 10-14 дней. Расход рабочей жидкости 300 л/га	40 (2)
ТИТУЛ 390, к.к.р, (390 г/л) АО «Щелково Агрохим» П-3 03.11.2035 г.	0,26-0,32	Пшеница яровая	Бурая, желтая и стеблевая ржавчина, септориоз,гельминтоспориозные пятнистости, мучнистая роса, фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации	30 (1)

Пропиконазол + азоксистробин + ципроконазол

ПРОТОКОЛ, к.э. (125 г/л + 100 г/л + 30 г/л) Жеджанг Жонгшан Кемикал ГрупСток Ко., Лтд, Китай П-3 04.02.2029 г.	0,8-1,0	Пшеница яровая	Бурая, стеблевая ржавчина, септориоз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации	40 (1)
--	---------	----------------	---	---------------------------------	--------

Пропиконазол + азоксистробин

БАЛИЙ, к.м.э. (180 г/л + 120 г/л) АО Фирма «Август» П-3 12.07.2033 г.	0,6-0,8	Подсолнечник	Фомоз, ржавчина, ложная мучнистая роса, мучнистая роса	Двукратное опрыскивание в период вегетации: первое при проявлении первых признаков одного из заболеваний, второе через 10-14 дней. Расход рабочей жидкости -300-400 л/га.	40 (2)
		Пшеница яровая	Мучнистая роса, бурая ржавчина, стеблевая ржавчина, септориоз листьев и колоса	Двукратное опрыскивание в период вегетации: первая обработка в фазу выхода в трубку, вторая выдвигание колоса. Расход рабочей жидкости -300 л/га.	40 (2)
		Соя	Септориоз, аскохитоз, антракноз, переноспороз	Двукратное опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое или при проявлении первых признаков одного из заболеваний, второе через 10-14 дней. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га.	40 (2)

Пропиконазол + бензовиндифлупир

ЭПЛАТУС ЭЙС 290 к.э. (250 г/л + 40 г/л) Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария П-3 22.12.2032 г.	0,4-0,5	Яровой ячмень	Стеблевая, желтая ржавчина, септориоз, гельминтоспориозные пятнистости	Опрыскивание в период вегетации	30 (1)
	0,4-0,5	Яровая пшеница	Бурая, стеблевая и желтая ржавчина, септориоз, мучнистая роса, пятнистость листьев		

Пропиконазол + тебуконазол

Концентрация д.в. (+/- 5%) – 200 г/л + 200 г/л					
Атлант, к.к.р. (200 г/л + 200 г/л) ТОО «Агро Глобал» П-3 31.12.2035 г.	0,15-0,25	Пшеница яровая	Бурая, желтая, стеблевая ржавчина, септориоз, гельминтоспориоз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации	30 (1)
	0,2-0,25	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса, альтернариоз, фомоз, ржавчина	Опрыскивание в период вегетации	30 (1)
	0,2-0,25	Горох, нут	Аскохитоз, фузариоз, антракноз, серая гниль, ржавчина, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации	30 (1-2)
	0,2-0,25	Соя	Аскохитоз, фузариоз, антракноз, ржавчина, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации	30 (1-2)
ДУАЛ ПРОТЕКТ, к.э. (200 г/л + 200 г/л) ТОО «Астана-Нан» П-3 09.12.2031 г.	0,15-0,25	Пшеница яровая	Бурая, желтая, стеблевая ржавчины, роса мучнистая, септориоз, гельминтоспориоз	Опрыскивание в период вегетации	30 (1)
	0,2-0,25	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса,		
	0,15-0,25	Пшеница озимая	Бурая, желтая, стеблевая ржавчины, септориоз,гельминтоспориоз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации	30 (1)
ЗЕБРА 400, к.э. (200 г/л + 200 г/л) Sinochem Agro CO, Ltd П-3 23.04.2028 г.	0,15-0,25	Пшеница яровая	Бурая, стеблевая ржавчина, септориоз, гельминтоспориоз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	30 (1)
	0,2-0,25	Свекла сахарная	Церкопророз, альтернариоз, мучнистая роса, фомоз		
САМУРЫК 400, к.к.р. (200 г/л + 200 г/л) Наньцзин Эссенс Файн- Кемикал Со., Лтд, Китай П-3 02.02.2034	0,15-0,25	Пшеница яровая и озимая	Бурая, стеблевая и желтая ржавчины, септориоз,гельминтоспориозн ая пятнистость, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации	30 (1)
СУНКАР 400, к.к.р. (200 г/л + 200 г/л) ТОО «Дегеш Агро ЛТД» П-3 26.02.2030 г.	0,15-0,25	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Бурая, стеблевая и желтая ржавчина, септориоз, гельминтоспориозная пятнистость, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	30 (1)
ТАНДЕМ PRO, к.к.р. (200г/л + 200 г/л) ТОО «QADAMGroup»(КАДАМГрупп) П-3 10.01.2033 г.	0,15-0,25	Пшеница яровая	Бурая, стеблевая и желтая ржавчина, септориоз,гельминтоспориоз, гелимнто спориозная и сетчатая пятнистост ти листьев, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации	30 (1)
	0,3-0,4	Яровой ячмень	Бурая, стеблевая и желтая ржавчина, септориоз, гельминтоспориоз		
ТИТАН ДУО, к.к.р. (200 г/л + 200 г/л) ТОО «Айбад-2015» П-3 16.06.2031 г.	0,15-0,25	Пшеница яровая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ржавчина желтая	Опрыскивание в период вегетации в фазах появление флагового листа – начало колосения; против фузариоза колоса – в фазе конец колосения – начало цветения. Расход рабочей жидкости 200- 400 л/га	30(1)
	0,25-0,32	Ячмень яровой	Темно-бурая пятнистость, сетчатая пятнистость, септориоз, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации в фазах появление флагового листа – выдвигание колоса. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	30(1)
	0,4-0,5	Рапс яровой	Альтернариоз, мучнистая роса, фомоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одной из болезней в фазы вытягивание стеблей – начало образования стручков в нижнем ярусе. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	30(1)

ТИТУЛ ДУО, к.к.р. (200 г/л + 200 г/л) АО «Щелково Агрохим», Россия П-3 21.02.2029 г.	0,15-0,25	Пшеница яровая	Бурая, желтая, стеблевая ржавчина, септориоз, гельминтоспориоз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации	30 (1)
	0,2-0,25	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса, альтернариоз, фомоз, ржавчина		
	0,2-0,25	Соя,горох, нут	Аскохитоз, фузариоз, антракноз, серая гниль, ржавчина, мучнистая роса		30(1-2)
	0,3 –0,4	Лен	Альтернариоз, антракноз, фомоз, пероноспороз, фузариозное увядание		30(1-2)
	0,2-0,3	Сафлор	Ржавчина, рамуляриоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одной из болезней, последующее – с интервалом 10-14 дней.	30(1-2)
	0,2-0,4	Чечевица	Аскохитоз, мучнистая роса, ржавчина, антракноз.		
	0,2-0,4	Подсолнечник	Белая гниль, серая гниль, мучнистая роса.	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одной из болезней, последующее с интервалом 10-14 дней, но не позднее фазы конец утонизации- начало цветения.	40(1-2)
	0,4-0,5	Рапс	Альтернариоз, мучнистая роса, фомоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одной из болезней в фазы вытягивания стеблей - начало образования стручков в нижнем ярусе	30(1-2)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 220 г/л + 220 г/л					
ТОТАЛ ИКС, к.к.р (220 г/л + 220 г/л) ТОО «GOOD JOB INDUSTRY KAZAKHSTAN» («ГУД ДЖОБ ИНДАСТРИ КАЗАХСТАН») П-3 08.11.2033 г.	0,25-0,32	Ячмень яровой и озимый	Темно-бурая пятнистость, сетчатая пятнистость, септориоз,ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации в фазах появления флагового листа – выдвижение колоса	40 (1)
	0,25-0,32	Пшеница яровая и озимая	Септориоз, пиренофороз, фузариоз колоса	В фазе – конец колошения – начало цветения	
	0,25	Пшеница яровая и озимая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ржавчина желтая	Опрыскивание в период вегетации в фазах появления флагового листа –начало колошения	
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 300 г/л + 200 г/л					
АНТИКЛЕС 50%, к.э. (300 г/л + 200 г/л) SHANDONG BINNONG TECHNOLOGY CO., LTD П-3 06.01.2036 г.	0,3-0,4	Пшеница яровая	Бурая, желтая и стеблевая ржавчина, септориоз, мучнистая роса, гельминтоспориоз ная пятнистость	Опрыскивание посевов в период вегетации	30 (1)
	0,3-0,4	Пшеница озимая	Бурая, желтая и стеблевая ржавчина, мучнистая роса, гельминтоспориоз ная пятнистость	Опрыскивание посевов в период вегетации	30 (1)
КОЛОСАЛЬ ПРО, к.м.э. (300 г/л + 200 г/л) АО Фирма «Август» П-3 18.10.2029 г.	0,3-0,4	Пшеница яровая и озимая	Бурая, желтая и стеблевая ржавчина, септориоз, гельминтоспориозная пятнистость	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 300 л/га	38 (1-2)
	0,3-0,4	Ячмень яровой	Стеблевая ржавчина, гельминтоспориозная пятнистость		
18.02.2030 г.	0,4-0,6	Горох, чечевица	Аскохитоз, мучнистая роса, антракноз, ржавчина	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200 -400 л/га	40(2)
29.01.2029 г.	0,4-0,6	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 300 л/га	30 (2)
	0,4-0,6	Соя	Аскохитоз		40 (1)
17.06.2031 г.	0,5-0,6	Рапс яровой	Альтернариоз, мучнистая роса, фомоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одной из болезней в фазы вытягивания стеблей – начало образования стручков в нижнем ярусе. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	40 (2)
	0,4-0,6	Подсолнечник	Мучнистая роса, фомоз, белая и серая гниль		
	0,4-0,6	Нут	Аскохитоз, мучнистая роса, антракноз, ржавчина, серая гниль	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	
	0,2-0,3	Виноград	Оидиум		
	0,3-0,4	Лен масличный	Антракноз, фузариоз, пасмо	Четырехкратное опрыскивание в период вегетации: до цветения после цветения, ягода размером в крупинку, Расход рабочей жидкости 800-1000 л/га	30 (4)
				Опрыскивание посевов при появлении первых признаков болезни начиная от фазы «елочки» до фазы бутонизации Расход рабочей жидкости 100- 300 л/га	40 (2)
04.07.2032	0,3-0,4	Рис	Пирикулярриоз	Опрыскивание в период вегетации в фазу выметывания метелки. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	40 (2)
КОМИССАР к.э. (300 г/л+ 200 г/л) ЛЕЙТОН АГРИО ЕВРОПА КФТ П-3 25.01.2033 г.	0,3-0,4	Ячмень яровой	Сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 300 л/га	38 (1-2)
	0,3-0,4	Пшеница яровая	Фузариоз колоса		40 (1)
	0,3-0,4	Пшеница яровая	Ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, септориоз		38 (1-2)
MAKS PLUS, к.э. (300 г/л + 200 г/л) ТОО «Farm Agrochemical Products» П-3 30.07.2034 г.	0,3-0,4	Ячмень яровой	Ржавчина стеблевая, ржавчина желтая, темно бурая пятнистость, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации	30(1)
	0,3-0,4	Пшеница яровая	Ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ржавчина желтая, септориоз листьев и колоса, темно бурая пятнистость, мучнистая роса		
ПРОПИШАНС УНИВЕРСАЛ, к.м.э. (300 г/л+ 200г/л) ООО «Шанс» П-3 14.02.2034 г.	0,4-0,6	Горох	Аскохитоз, антракноз, мучнистая роса, ржавчина	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 2 –3 недели. Расход рабочей жидкости – 200–400 л/га	40(2)
	0,4-0,6	Соя	Церкоспороз, септориоз, аскохитоз, альтернариоз, антракноз	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	40(2)
	0,5-0,6	Рапс яровой	Альтернариоз, мучнистая роса, фомоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одной из болезней в фазы вытягивание стеблей – начало образования стручков в нижнем ярусе . Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	40(1)

	0,4-0,6	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков одного из заболеваний, второе – через 10-14 дней (при необходимости). Расход рабочей жидкости 300 л/га	30(1-2)
	0,3-0,4	Ячмень яровой и озимый	Карликовая ржавчина, мучнистая роса, ринхоспориоз, сетчатая и темно-бурая пятнистости, септориоз	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 300 л/га	48 (1-2)
	0,3-0,4	Пшеница яровая и озимая	Ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ржавчина желтая, мучнистая роса, септориоз, пиренофороз		
ПроТэб, к.м.э. (300 г/л+ 200 г/л) ФОРВАРД П-3 02.02.2036 г.	0,3-0,4	Лен долгунец и масличный	Антракноз, фузариоз	Опрыскивание в период вегетации	40(2)
	0,4-0,6	Свекла сахарная	Фомоз, церкоспороз, мучнистая роса		30 (1-2)
	0,4-0,6	Чечевица	Аскохитоз, мучнистая роса, антракноз, ржавчина		40 (2)
	0,4-0,6	Горох	Аскохитоз, мучнистая роса, антракноз, ржавчина		40 (2)
	0,4-0,6	Нут	Аскохитоз		40 (2)
	0,4-0,6	Соя	Церкоспороз, септориоз, аскохитоз, альтернариоз, антракноз		40 (2)
	0,3-0,4	Рис	Пирикулярриоз		40 (2)
	0,5-0,6	Рапс яровой	Альтернариоз, мучнистая роса, фомоз		30 (1-2)
	0,3-0,4	Ячмень яровой и озимый	Темно-бурая пятнистость, сетчатая пятнистость, септориоз, ринхоспориоз		30 (1-2)
	0,3-0,4	Пшеница яровая и озимая	Бурая, желтая и стеблевая ржавчина, септориоз, гельминтоспориоз ная пятнистость, мучнистая роса; фузариоз колоса		30 (1-2)
Хелс 500, к.э. (300 г/л+ 200 г/л) ТОО «EcoSave» П-3 26.02.2036 г.	0,3-0,4	Пшеница яровая	Бурая, желтая и стеблевая ржавчина, септориоз, гельминтоспориозная пятнистость,	Опрыскивание в период вегетации	30 (1)

Пропиконазол + тебуконазол + ципроконазол

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 80 г/л + 160 г/л + 80 г/л					
ТИТУЛ ТРИО, к.к.р. (80 г/л + 160 г/л + 80 г/л) АО «Щелково Агрохим» П-3 14.04.2032 г.	0,3-0,5	Пшеница яровая, пшеница озимая	Мучнистая роса, бурая ржавчина, желтая ржавчина, стеблевая ржавчина, септориоз, пиренофороз, темно-бурая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации	20(1-2)
	0,4-0,5	Пшеница яровая, пшеница озимая	Фузариоз колоса, септориоз колоса	Опрыскивание в фазу конец колошения – начало цветения	20(1-2)
	0,3-0,5	Ячмень яровой (в том числе пивоваренный)	Мучнистая роса, карликовая ржавчина, темно- бурая пятнистость, сетчатая пятнистость, септориоз, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации	20(1-2)
	0,3-0,5	Соя, горох, нут	Антракноз, аскохитоз, мучнистая роса, ржавчина		
ТРИОН ТОП, к.к.р. (80 г/л+ 160 г/л+ 80 г/л) ТОО «Достык-Агро 2012» П-3 24.12.2034 г.	0,6	Пшеница яровая	Септориоз	Опрыскивание в период вегетации	-1
	0,6	Горох	Антракноз		
	0,6	Подсолнечник	Альтернариоз		
	0,6	Ячмень яровой	Мучнистая роса		

Пропиконазол + тебуконазол + эпиксиконазол

ТРИАДА, к.к.р. (140 г/л + 140 г/л + 72 г/л) АО «Щелково Агрохим» П-3 13.04.2031 г.	0,3-0,5	Пшеница яровая и озимая	Мучнистая роса, бурая ржавчина, стеблевая ржавчина, септориоз листьев и колоса, пиренофороз	Опрыскивание в период вегетации	30(1-2)
		Ячмень яровой, в.т.ч.т пивоваренный	Мучнистая роса, темно-бурая и сетчатая пятнистости, ринхоспориоз		

Пропиконазол + тиофанат-метил

ВЕРСУС ДУО к.с (250 г/л + 250 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ,Германия П-3 05.03.2034 г.	0,35 –0,45	Пшеница яровая	Бурая, желтая, стеблевая ржавчины , септориоз , гельминто спориозные пятнистости, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)
	0,35 –0,45	Ячмень яровой	Желтая, стеблевая ржавчины , септориоз, гельминтоспориозн ые пятнистости, мучнистая роса		
	0,4 –0,5	Соя	Фузариозное увядание, антракноз, ржавчина, аскохитоз, серая гниль, мучнистая роса		20 (2)

Пропиконазол + ципроконазол

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 250 г/л + 80 г/л					
АЛБАНИ СУПЕР 330, к.э. (250 г/л + 80 г/л) Моер Кемсайенс Ко, Китай П-3 26.11.2030 г.	0,4-0,5	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Бурая и желтая ржавчина септориоз, септориозно-гельминтоспориозные пятнистости, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации	30 (1)
АЛЬТО СУПЕР 330, к.э. (250 г/л + 80 г/л) Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария П-3 08.09.2030 г.	0,4-0,6	Горох	Ржавчина, мучнистая роса, аскохитоз, антракноз	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)

25.11.2032 г.	0,4 –0,5	Яровой рапс	Альтерналириоз	Опрыскивание в период вегетации (ВВСН 69-79)	30 (1)
	0,4-0,5	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Мучнистая роса, ржавчина бурая, стеблевая, гельминтоспориозная пятнистость, септориоз	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)
	0,4-0,5	Лен	Альтерналириоз, фомоз		
АРТЕА 330, к.э. (250 г/л + 80 г/л) Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария П-3 27.03.2028 г.	0,4-0,5	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Мучнистая роса, ржавчина бурая, стеблевая, гельминтоспориозная пятнистость, септориоз	Опрыскивание в период вегетации	30 (1)
АЛЬФА СУПЕР 33% к.э. (250 г/л + 80 г/л) ТОО «HARVEST Ltd (Харвест Ltd)» П-3 20.03.2034 г.	0,5	Горох, чечевица, соя	Ржавчина, аскохитоз, мучнистая роса, антракноз, пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков заболевания, второе через 10–14 дней (при необходимости)	30 (2)
	0,4 – 0,5	Подсолнечник	Белая гниль, серая гниль	Опрыскивание от 3–5 настоящих листьев культуры и в течение всей вегетации	30 (2)
	0,4 –0,5	Рапс	Фомоз, альтерналириоз, мучнистая роса, склеротиниоз	При проявлении признаков болезней	30 (2)
	0,4 –0,5	Лен	Антракноз, аскохитоз	Опрыскивание посевов в фазу 8–10 см культуры (елочка)	30 (2)
	0,4 –0,5	Яровой ячмень	Гельминтоспориозные пятнистости, мучнистая роса, ржавчина стеблевая, ринхоспориоз, фузариоз	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)
	0,5	Озимая пшеница	Мучнистая роса, ржавчина бурая, стеблевая, желтая, септориоз, пиренофороз, фузариоз, гельминтоспориозная пятнистость		
	0,4 –0,5	Яровая пшеница	Мучнистая роса, ржавчина бурая, стеблевая, желтая, септориоз, пиренофороз, фузариоз, гельминтоспориозная пятнистость		
Аваксс, к.э. (250 г/л + 80 г/л) ООО «Интер Групп» П-3 16.08.2034 г.	0,4-0,5	Овес	Ржавчина корончатая, красно-бурая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 300 л/га.	40(1)
	0,4-0,5	Ячмень яровой	Гельминтоспориозные пятнистости (темно-бурая, сетчатая, полосатая), мучнистая роса, ржавчина карликовая, ржавчина стеблевая, ринхоспориоз		
	0,4-0,5	Пшеница яровая	Ржавчина бурая, ржавчина желтая, ржавчина стеблевая, септориоз листьев и колоса, пиренофороз, мучнистая роса		
ПИНАЗОЛ ПЛЮС, к.э. (250 г/л + 80 г/л) ШАНДОНГ ВЕЙФАНГ РЕЙНБОУ КЕМИКАЛ КО., ЛТД П-3 08.07.2035 г.	0,4-0,5	Лен	Антракноз, фузариозное увядание, альтерналириоз, аскохитоз	Опрыскивание в период вегетации	40 (2)
	0,4-0,5	Пшеница озимая	Ржавчина желтая, септориоз листьев и колоса, пиренофороз, мучнистая роса		
	0,4-0,5	Пшеница яровая	Ржавчина желтая, ржавчина стеблевая, септориоз листьев и колоса, пиренофороз, мучнистая роса		
	0,5-0,75	Свекла сахарная	Церкоспороз, фомоз, мучнистая роса, альтерналириоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков заболевания, второе – через 10-14 дней (при необходимости)	40(2)
	0,4-0,5	Ячмень яровой	Гельминтоспориозные пятнистости (темно-бурая, сетчатая, полосатая), мучнистая роса, ржавчина карликовая, стеблевая, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации	40(2)
ПРОПИШАНС СУПЕР, к.э. (250 г/л + 80 г/л) ООО «Шанс» П-3 07.03.2029 г.	0,4-0,5	Пшеница яровая и озимая	Бурая, стеблевая, желтая ржавчина, мучнистая роса, септориоз листьев и колоса, пиренофороз	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 300 л/га	40(1-2)
	0,4-0,5	Ячмень яровой	Гельминтоспориозные пятнистости (темно-бурая, сетчатая, полосатая), мучнистая роса, стеблевая ржавчина, ринхоспориоз		
	0,4-0,5	Овес	Корончатая ржавчина, красно-бурая пятнистость		
	0,5-0,75	Свекла сахарная	Церкоспороз, фомоз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков заболевания, второе – через 10-14 дней (при необходимости). Расход рабочей жидкости – 300 л/га	45 (1-2)

Пропинеб

Концентрация д.в. (+/- 5%) – 700 г/кг					
АНТРАКОЛ 70%, в.д.г. (700 г/кг) Байер КропСайенс АГ П-3 22.07.2029 г.	1,5-2,0	Картофель	Фитофтороз, альтерналириоз	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 7-10 дней	30 (2)
	1,75-2,25	Яблоня	Парша, монилиоз	Опрыскивание растений в период вегетации: 1-е – в фазу «зеленый конус», две последующие – с интервалом 7-10 дней	50 (3)
	1,5-2,0	Рис	Пирикулярриоз, альтерналириоз, фузариоз	Опрыскивание при появлении первых признаков заболевания или профилактически	30 (2)
	1,5-2,0	Лук (кроме лука на перо)	Пероноспороз	Опрыскивание растений в период вегетации с интервалом 10-12 дней	50 (2)
	1,5-2,0	Томаты открытого и защищенного грунта	Альтерналириоз, фитофтороз	Опрыскивание растений в период вегетации с интервалом 10-14 дней	40 (2)
	1,5-2,0	Огурцы открытого и защищенного грунта	Пероноспороз, антракноз	Опрыскивание растений в период вегетации с интервалом 7-10 дней	40 (3)
	1,5-2,0	Картофель	Фитофтороз, альтерналириоз		30 (2)
МИКАДО, в.д.г. (700 г/кг) Моер Кемсайенс Ко, Китай П-3	1,5	Картофель, томаты	Фитофтороз, альтерналириоз	Опрыскивание в период вегетации	20 (2)
	1,5	Лук	Пероноспороз		
	1,0-1,5	Виноград	Милдью, оидиум		
	1,0-1,5	Яблоня	Парша, мучнистая роса		

26.11.2030 г.	1,5	Табак	Мучнистая роса		
---------------	-----	-------	----------------	--	--

Протиоконазол

Promino, к.э. (300 г/л) THAI HARVEST LIMITED П-3 30.07.2036 г.	0,33-0,65	Пшеница озимая и яровая	Ржавчины, септориоз, фузариоз	Опрыскивание посевов в период вегетации	35 (2)
---	-----------	----------------------------	-------------------------------	--	--------

Протиоконазол + тебуконазол

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 80 г/л + 160 г/л					
ПРОЗАРО КВАНТУМ, к.э. (80 г/л + 160 г/л) ООО «Байер КАЗ» П-3 19.03.2035 г.	0,5	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Виды ржавчины, септориозно- гельминтоспориозные пятнистости	Обработка в период вегетации	20 (2)
	0,5	Лен масличный	Фузариозное увядание	Обработка в фазу «елочки»	20 (2)
	0,5-0,7	Горох	Аскохитоз, ржавчина	Обработка в период вегетации	20 (2)
	0,5-0,7	Нут	Аскохитоз		
	0,5-0,7	Соя	Аскохитоз, пероноспороз		

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 125 г/л+125 г/л					
СИЗАРО, к.э. (125 г/л+125 г/л) «DVA Agro GmbH» П-3 15.03.2034	0,6-0,8	Пшеница яровая	Ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ржавчина желтая, септориоз листьев и колоса, пиренофороз, темно-бурая пятнистость, фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации в фазах появления флаг листа – начала колошения; против фузариоза колоса – конец колошения – начало цветения. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га.	30 (2)
	0,6-0,8	Ячмень яровой	Ржавчина стеблевая, ржавчина карликовая, мучнистая роса, гельминтоспориозные пятнистости листьев (сетчатая и темно- бурая), ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации в фазах появления флаг листа – начала колошения. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га..	30 (2)
Фея, к.э. (125 г/л+ 125 г/л) ООО «Шанс» П-3 24.02.2035 г.	0,6-0,8	Ячмень яровой и озимый	Ржавчина стеблевая, ржавчина карликовая мучнистая роса, гельминтоспориозные пятнистости листьев сетчатая и темно- бурая), ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации в фазах появления флаг - листа - начала колошения. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1-2)
	0,8-1,0	Пшеница яровая и озимая	Фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации в фазах появления флаг-листа - начала колошения против фузариоза колоса – конец колошения – начало цветения. Расход рабочей жидкости 200- 300 л/га	40(1-2)
	0,6-0,8	Пшеница яровая и озимая	Ржавчина бурая, ржавчин а стеблевая, ржавчина желтая, септориоз листьев и колоса, пиренофороз, темно-бурая пятнистость, мучнистая роса		
	1,0	Кукуруза	Плесневение початков	Опрыскивание в период вегетации: профилактическо е или при появлении первых признаков одного из заболеваний. Расход рабочей жидкости 200- 400 л/га	27(1)
	0,6-0,8	Рапс яровой и озимый	Альтернариоз, фомоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезней, последующие через 10-14 дней (вытягивание стеблей - начало образования стручков в нижнем ярусе). Озимые обрабатываются весной. Расход рабочей жидкости 200- 300 л/га	28(2)

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 210 г/л+210 г/л					
Bang Prothazole, к.с. (210 г/л+210 г/л) Jiangxi Huihe Chemical Co. Ltd П-3 29.11.2034 г.	0,25	Лен масличный	Фузариозное увядание	Обработка в фазу «елочки»	20 (2)
	0,2-0,5	Соя	Аскохитоз, пероноспороз	Обработка в период вегетации	20 (2)
	0,15-0,2	Пшеница яровая	Бурая, стеблевая ржавчина, септориоз, мучнистая роса, гельминтоспориозные пятнистости		
КОПРОТЕКТ, к.с. (210 г/л + 210 г/л) Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд, Китай П-3 27.07.2028 г.	0,15 -0,3	Пшеница яровая	Бурая, стеблевая ржавчина, септориоз, мучнистая роса, гельминтоспориозные пятнистости	Опрыскивание посевов в период вегетации	20 (2)
	0,15 -0,3	Пшеница озимая			
	0,15 -0,3	Ячмень яровой	Бурая, стеблевая, желтая ржавчина, септориоз, мучнистая роса, гельминтоспориозные пятнистости		

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 230 г/л+230 г/л					
ПИЛАРЗОРРО, к.с. (230 г/л+230 г/л) Пиларквим (Шанхай) Ко., Лтд. П-3 08.01.2036 г.	0,2-0,4	Яровая пшеница	Септориоз, мучнистая роса, фузариоз, виды ржавчины, гельминтоспориозные пятнистости	Опрыскивание в период вегетации	20 (2)

Протиоконазол+ трифлуксистробин

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 175 г/л+150 г/л					
Винки Тайгер, к.с. (175 г/л + 150 г/л) ЧЖЭЦЯН СИНЬАНЬХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ГРУППА П-3 04.11.2034 г.	0,4-0,6	Пшеница яровая	Мучнистая роса, септориоз, пиренофороз, фузариоз листьев	Опрыскивание в период от начала трубкования до начала колошения	30(1-2)
Promino Plus, с.к. (175 г/л + 150 г/л)	0,5–1,0	Пшеница яровая	Ржавчины, септориоз, мучнистая роса, пиренофороз	Опрыскивание в период вегетации	35(2)

THAI HARVEST LIMITED П-3 30.07.2036 г.	0,5–1,0	Соя	Церкоспороз, септориоз, антракноз, аскохитоз	Опрыскивание в период вегетации профилактическое или при появлении первых признаков одного из заболеваний, но не позднее фазы цветения. Расход рабочей жидкости – 200–400 л/га	35 (2)
--	---------	-----	--	--	--------

Протиоконазол + пираклостробин

Пиларвива к.с. (170 г/л + 170 г/л) Пиларквим (Шанхай) Ко., Лтд. П-4 23.01.2034 г.	0,3-0,5	Пшеница яровая и озимая, яровой ячмень	Бурая, стеблевая и желтая ржавчина, септориоз,гельминтоспориоз, гельминтоспориозная и сетчатая пятнистости листьев, мучнистая роса, повышение урожайности	Опрыскивание посевов в период вегетации	30 (2)
---	---------	--	---	---	--------

Пириметанил

Пирус, 40%, к.с. (400 г/л) Arysta LifeScience BeneluxSprl П-3 04.02.2034 г.	1,5-2,5	Виноград	Милдью	Опрыскивание растений: первое - в фазе конец цветения -опадения цветков, второе в фазе завязывания ягод, третье-в фазе начало созревания ягод	21(3)
	1,2-1,5	Яблоня	Монилиоз	Опрыскивание растений: первое - в фазе розовый бутон, второе -в фазе начало цветения(около 5 % распутившихся цветков), третье - после фазы цветения (около 70 % опавших лепестков)	30(3)
	0,8-1,2	Яблоня	Парша		
	1,5-2,0	Томаты открытого грунта	Фитофтороз, серая гниль	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых заболеваний	30 (2)

Тебуконазол

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 250 г/л					
БЕРКУТ, к.э. (250 г/л) Лейтон Агрио Европа Кфт., Венгрия П-3 12.04.2028 г.	0,5-0,7	Пшеница яровая	Бурая, желтая и стеблевая ржавчина, септориоз	Опрыскивание в период вегетации	30 (1)
	0,5-0,7	Ячмень яровой	Стеблевая, желтая ржавчина, септориоз		
Гранберг, к.э. (250 г/л) ООО «Интер Групп» П-3 04.11.2034 г.	0,5-1,0	Ячмень яровой	Ржавчина карликовая, стеблевая ржавчина, мучнистая роса, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых симптомов заболевания. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га.	30 (1)
	0,5-1,0	Пшеница яровая	Бурая, желтая и стеблевая ржавчина, септориоз, мучнистая роса, пиренофороз		
Грейсон, к.э. (250 г/л) ФОРВАРД П-3 11.02.2036 г.	0,5-1,0	Пшеница яровая и озимая	Ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ржавчина желтая, мучнистая роса, септориоз, фузариоз колоса, темно-бурая пятнистость, пиренофороз	Опрыскивание в период вегетации	30 (1)
	0,5-1,0	Ячмень яровой и озимый	Стеблевая ржавчина, мучнистая роса, ринхоспориоз, полосатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, сетчатая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации	30 (1)
	1,0	Овес	Ржавчина корончатая, красно-бурая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации	30 (1)
	0,75	Рис	Пирикулярриоз	Опрыскивание в период вегетации	40 (2)
	1,0	Рапс яровой, рапс озимый	Альтернариоз, склеротиниоз, фомоз	Опрыскивание в период вегетации	30 (1)
	0,4	Виноград	Оидиум	Опрыскивание в период вегетации	30 (4)
КОЛОСАЛЬ, к.э. (250 г/л) АО Фирма «Август» П-3 27.12.2032 г.	0,5-0,7	Пшеница яровая	Бурая, желтая и стеблевая ржавчина, септориоз, мучнистая роса, гельминтоспориозная пятнистость	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых симптомов заболевания. Расход рабочей жидкости 300 л/га	30 (1)
	0,5	Пшеница озимая	Бурая и желтая ржавчина, мучнистая роса, септориозно-гельминтоспориозная пятнистость		
	0,5-0,7	Ячмень яровой	Стеблевая ржавчина, мучнистая роса, гельминтоспориозная пятнистость		
21.12.2027 г.	0,75	Рис	Пирикулярриоз	Опрыскивание в период вегетации в фазу выметывания метелки. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	30 (2)
04.07.2032 г.	1,0	Пшеница яровая, ячмень яровой	Фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации в фазы конец колошения – начало цветения. Расход рабочей жидкости 100-300 л/га	30 (1)
МЭДЖИК, к.э. (250 г/л) ТОО «Астана-Нан» П-3 20.12.2031 г.	0,5-1,0	Соя	Аскохитоз	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)
	0,5	Виноградная лоза	Оидиум, милдью		
	0,5	Яблоня	Мучнистая роса		
	0,5	Рапс	Альтернариоз, фомоз		
	0,5-0,7	Пшеница и ячмень яровые	Бурая, желтая и стеблевая ржавчины, роса мучнистая, септориоз, гельминтоспориоз	Опрыскивание в период вегетации.	30 (2)
	0,5-1,0	Лук	Пероноспороз		
ТЕБУКОНАЗОЛ-СТАР, в.д.г. (800 г/кг) ООО«ХИМАГРОМАРКЕТИНГ.РУ», Россия П-3 22.05.2029 г.	0,125-0,3	Пшеница яровая	Бурая, стеблевая ржавчина, септориоз колоса, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации	30 (1)
ТЕНАЗОЛИН, к.э. (250 г/л) ТОО «Agro Mark Kaz» П-3 11.12.2033 г.	0,5-0,7	Пшеница яровая	Бурая, желтая, стеблевая ржавчина, септориоз, мучнистая роса, гельминтоспориозная пятнистость	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых симптомов заболевания. Расход рабочей жидкости 200- 300 л/га	30 (1)
	0,5	Пшеница озимая	Бурая и желтая ржавчина, мучнистая роса, септориозно-гельминтоспориозная пятнистость		
	0,5-0,7	Ячмень яровой	Стеблевая ржавчина, мучнистая роса, гельминтоспориозная пятнистость		
	0,75	Рис	Пирикулярриоз	Опрыскивание в период вегетации в фазу выметывания метелки	20 (1)

Триазол, к.э. (250 г/л) ТОО «ФМРус» П-3 27.01.2035 г.	0,5-1,0	Рапс яровой	Альтернариоз, склеротиниоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одного из заболеваний, последующее – с интервалом 14-16 дней. Расход рабочей жидкости 200- 300 л/га	40(2)
	0,5-1,0	Ячень яровой и озимый	Ржавчина стеблевая, ржавчина карликовая, ломкость стеблей , мучнистая роса, гелиминтоспориозные пятнистости листьев (сетчатая и темно- бурая), ринхоспориоз, фузариоз колоса, чернь колоса	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков заболевания, второе – через 10-14 дней (при необходимости). Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	40(1-2)
	0,5-1,0	Пшеница яровая и озимая	Ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ржавчина желтая, септориоз листьев и колоса, мучнистая роса, ломкость стеблей , пиренофороз, темно-бурая пятнистость, фузариоз колоса, чернь колоса		
ЦАРИЦА, э.м.в. (250 г/л) ТОО «Агро-Хим-Лидер» П-3 23.04.2028 г.	0,5	Пшеница яровая и озимая	Бурая, желтая,стеблевая ржавчина	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	30 (1)
	0,75-1,0	Пшеница яровая	Септориоз, мучнистая роса		
	0,75-1,0	Пшеница озимая	Мучнистая роса		
	1,0	Пшеница озимая	Септориозно- гелиминтоспориозные пятнистости		
	0,75-1,0	Ячень яровой	Стеблевая, ржавчина, мучнистая роса, пятнистости		
	0,5	Рапс	Альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 500 л/га	30 (2)
	0,5-1,0	Рис	Пирикулярриоз		
	0,5-1,0	Соя	Аскохитоз	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 300-350 л/га	30 (2)
	0,5-1,0	Яблоня	Парша, мучнистая роса		
	0,5-1,0	Виноград	Оидиум, мильдю		
ШАНСИЛ, к.э. (250 г/л) ООО «Шанс» П-3 23.06.2031 г	0,75-1,0	Пшеница яровая, озимая	Мучнистая роса, пиренофороз, ржавчина бурая, ржавчина желтая, септориоз листьев и колоса	Опрыскивание в период вегетации в фазе появления флаг-листа и (или) в фазы появления флаг- листа и начало колошения. Расход рабочей жидкости 300 л/га	30 (1-2)
	0,75-1,0	Ячень яровой	Мучнистая роса, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость	Опрыскивание в период. Расход рабочей жидкости 300 л/га	30(1)

Тебуконазол + карбендазим

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 500 г/л + 50 г/л					
ВАРРО, к.с. (500 г/л + 50 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-3 26.01.2027 г.	0,25	Пшеница яровая	Бурая ржавчина, септориоз	Опрыскивание в период вегетации	30 (1)
	0,25	Ячмень яровой	Стеблевая, желтая ржавчина, гельминтоспориозные пятнистости		
	0,25-0,3	Лен	Фузариозное увядание, антракноз, ржавчины		
	0,25-0,3	Чечевица, соя	Фузариозное увядание, антракноз, ржавчины, аскохитоз		
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 200 г/л + 300 г/л					
КОНСОРТ к.с. (200 г/л + 300 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-3 01.09.2033 г.	0,5- 0,6	Горох. соя	Аскохитоз, фузариоз, антракноз, серая гниль, ржавчина, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации	20(2)
	0,5- 0,6	Лён	Альтернариоз, фузариозное увядание, антракноз, фомоз, аскохитоз		40(1)
	0,4- 0,5	Ячмень яровой	Стеблевая, желтая ржавчина, септориоз, гельминтоспориозные пятнистости, мучнистая роса		30(2)
	0,4- 0,5	Пшеница яровая	Ржавчины (бурая, стеблевая, желтая), септориоз, гельминтоспориозные пятнистости, мучнистая роса		

Тебуконазол + метконазол

БАКЛЕР, к.м.э. (200 г/л + 50 г/л) АО Фирма «Август» П-3 04.07.2032 г.	0,8-1,2	Ячень яровой	Септориоз, бурая стеблевая и желтая ржавчина, темно-бурая и сетчатая пятнистости, гелиминтоспориоз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации.Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	-(2)
	0,6-0,8	Рапс яровой	Альтернариоз, фомоз		
	0,8-1,2	Пшеница яровая	Септориоз, бурая стеблевая и желтая ржавчина, темно-бурая и сетчатая пятнистости, гелиминтоспориоз, мучнистая роса		

Тебуконазол + пираклостробин + ципроконазол

БЕСКАР, к.с (317 г/л + 83 г/л + 97 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-3 23.06.2033 г.	0,25-0,35	Соя, чечевица	Фузариозное увядание, антракноз, ржавчина, аскохитоз, серая гниль, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации	30(1)
	0,25	Ячень яровой	Желтая, стеблевая ржавчины, септориоз, гелиминтоспориозные пятнистости, мучнистая роса		
	0,25	Пшеница яровая	Бурая, желтая, стеблевая ржавчины, септориоз, гелиминтоспориозные пятнистости, мучнистая роса		

Тебуконазол + тиаметоксам (инсекто-фунгицид)

ЛИРА к.с. (417 г/л + 83 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-1 01.03.2033 г.	0,3	Пшеница яровая	Желтая ржавчина, септориоз, гелиминтоспориозные пятнистости, блошки, пшеничный трипс, клоп вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации	30(2)
	0,3	Ячень яровой	Желтая ржавчина, септориоз, гелиминтоспориозные пятнистости, блошки, трипсы, пьявица		

Тебуконазол + альфа-циперметрин + тиаметоксам (инсекто-фунгицид)

Гарда к.с. (387 г/л + 47г/л + 67 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-3 06.02.2035 г.	0,3- 0,4	Горох	Аскохитоз, фузариоз, антракноз, ржавчина, мучнистая роса, клубеньковые долгоносики, гороховая и люцерновая тли, луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации культуры	30 (2)
	0,3- 0,4	Чечевица	Аскохитоз, фузариоз, антракноз, ржавчина, мучнистая роса, клубеньковые долгоносики, гороховая и люцерновая тли, луговой мотылек		
	0,25- 0,35	Ячмень яровой	Стеблевая, желтая ржавчина, септориоз, гельминтоспориозные пятнистости, мучнистая роса, хлебная пылевая, злаковые (шведская) мухи, хлебные блошки		30 (1)
	0,25- 0,35	Пшеница яровая	Ржавчины (бурая, стеблевая, желтая), септориоз, гельминтоспориозные пятнистости, мучнистая роса, злаковые (гессенская, шведская) мухи, пшеничный трипс, злаковая тля, хлебные блошки, клоп вредная черепашка, серая зерновая совка		

Тебуконазол + тиофанат-метил

НАБИОЛА, к.с. (187 г/л + 310 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-3 26.10.2032 г.	0,4-0,6	Соя	Фузариозное увядание, антракноз, ржавчина, аскохитоз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации	20 (1)
	0,4-0,6	Чечевица	Фузариозное увядание, антракноз, ржавчина, аскохитоз		
	0,4-0,5	Ячмень яровой	Желтая ржавчина, гельминтоспориозные пятнистости		30 (1)
	0,4-0,5	Пшеница яровая	Желтая ржавчина, септориоз, гельминтоспориозные пятнистости		

Тебуконазол + триадимефон

Концентрация д.в. (+/- 5%) – 125 г/л + 100 г/л					
ЗЕНОН АЭРО, к.э. (125 г/л + 100 г/л) ООО «Форвард», Россия П-3 16.01.2028 г.	0,75-1,0	Пшеница и ячмень яровой	Бурая и стеблевая ржавчина, септориоз, гельминтоспориозная пятнистость, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации	30 (1)
	0,5-0,7	Пшеница яровая	Бурая ржавчина, септориозно-гельминтоспориозные пятнистости	Опрыскивание растений в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	30 (1)
ЭНТОЛИКУР 22,5 %, к.э. (125 г/л + 100 г/л) IFODA AGRO KIMYO HIMOYA, Узбекистан П-3 16.07.2029 г.	0,4	Рис	Пирикулярриоз	Двукратное опрыскивание растений в фазе трубкования и повторно через 10-15 дней. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	30 (2)

Тебуконазол + триадибензол + пираклостробин

Капри, к.с. (350 г/л + 70 г/л + 80 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-3 10.02.2035 г.	0,25-0,35	Нут, горох, чечевица	Ржавчина, аскохитоз, антракноз, фузариоз, серая гниль, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 100- 200 л/га.	30(2)
	0,2-0,3	Ячмень яровой	Стеблевая, желтая ржавчина, септориоз, гельминтоспориозные пятнистости		
	0,2-0,3	Пшеница яровая	Бурая, желтая, стеблевая ржавчина, септориоз, гельминтоспориозные пятнистости		30(1)
	0,25-0,35	Подсолнечник	Мучнистая роса, ложная мучнистая роса, фомоз, фомосис, септориоз, альтернариоз, бурая пятнистость, склеротиниоз, белая гниль, серая гниль, аскохитоз		
	0,25- 0,35	Лён	Альтернариоз, фузариозное увядание, антракноз, фомоз, аскохитоз		

Тебуконазол + флутриафол

Концентрация д.в. (+/- 5%) – 225 г/л + 75 г/л					
АРЕНА, к.э. (225 г/л + 75 г/л) Юнайтед Агри-Кемикал Компани ГмбХ, Швейцария П-3 12.04.2031 г.	0,5-0,7	Пшеница и ячмень яровые	Бурая, желтая и стеблевая ржавчина, септориоз, гельминтоспориозная пятнистость, мучнистая роса, сетчатая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)
	0,5-0,7	Пшеница и ячмень яровой	Бурая, желтая и стеблевая ржавчина, септориоз, гельминтоспориозная пятнистость, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации	30 (1)
УДАР ФОРТЕ, к.с. (225 г/л + 75 г/л) Представительство ООО «Агро Эксперт Груп» в РК П-3 31.10.2035 г.	0,5-0,75	Пшеница яровая	Бурая и стеблевая ржавчина, септориоз, гельминтоспориозные пятнистости	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	-1
	0,5-0,75	Пшеница озимая	Бурая и желтая ржавчина, септориозно-гельминтоспориозные пятнистости, мучнистая роса		
	0,5-0,75	Ячмень яровой	Стеблевая, желтая ржавчина, пятнистости листьев		
	0,5-0,75	Рапс	Альтернариоз		
	0,4-0,5	Подсолнечник	Мучнистая роса, ложная мучнистая роса, фомоз, септориоз, альтернариоз (бурая пятнистость), склеротиниоз (белая гниль), серая гниль, аскохитоз	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	-1-2
	0,75-1,5	Горох, нут	Ржавчина, аскохитоз, антракноз, мучнистая роса, фузариоз, серая гниль		
	0,5-0,75	Соя	Антракноз, пероноспороз, аскохитоз, церкоспороз, фузариоз, септориоз, ржавчина, фомосис, мучнистая роса		
ФОКУС, к.с. (225 г/л + 75 г/л) Лейтон Агрио Кфт., Венгрия П-3 05.03.2029 г.	0,7-0,9	Пшеница яровая	Бурая, стеблевая, желтая ржавчина, септориоз, мучнистая роса, пиренофороз, фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации в фазах появления флагового листа – начала колошения, против фузариоза колоса – конец колошения – начало цветения	30 (2)
	0,7-0,9	Ячмень яровой	Мучнистая роса, карликовая ржавчина, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации в фазах появления флагового листа – выдвигания колоса	

	0,5-0,75	Рапс	Альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации в фазы вытягивания стеблей – начало образования стручков в нижнем ярусе	
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 381 г/л + 117 г/л					
САНСЭР, к.с. (381 г/л + 117 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-3 20.04.2028 г.	0,25	Пшеница яровая	Бурая, желтая, стеблевая ржавчина, септориоз, гельминтоспориозные пятнистости	Опрыскивание в период вегетации	30 (1)
	0,25	Ячмень яровой	Стеблевая, желтая ржавчина, септориоз, гельминтоспориозные пятнистости		

Тебуконазол + триадименол

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 170 г/л + 47 г/л					
РЕМИ 2.0, к.с. (170 г/л + 47 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-3 27.06.2033 г.	0,4 –0,6	Пшеница яровая	Ржавчины (бурая, стеблевая, желтая), септориоз, гельминтоспориозные пятнистости, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации	30 (1)
	0,4 –0,6	Ячмень яровой	Стеблевая желтая ржавчина, септориоз, гельминто спориозные пятнистости, мучнистая роса		
	0,4 –0,6	Чечевица	Аскохитоз, фузариоз, антракноз, серая гниль, ржавчина, мучнистая роса		
	0,4 –0,6	Лен	Альтернар иоз, фузариозное увядание, антракноз, фомоз, аскохитоз	40 (1)	
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 397 г/л + 97 г/л					
БАЙТАН, к.с. (397 г/л + 97 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-3 06.02.2035 г.	0,25 - 0,35	Горох, чечевица	Ржавчина, аскохитоз, антракноз, мучнистая роса, фузариоз, серая гниль	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 100-200 л/га.	30 (2)
	0,2 -0,25	Ячмень яровой	Стеблевая, желтая ржавчина, септориоз, гельминтоспориозные пятнистости		
	0,2 -0,25	Пшеница яровая	Бурая, желтая, стеблевая ржавчина, септориоз, гельминтоспориозные пятнистости		
	0,25 -0,35	Подсолнечник	Мучнистая роса, ложная мучнистая роса, фомоз, фомопсис, септориоз, альтернариоз, бурая пятнистость, склеротиниоз, белая гниль, серая гниль, аскохитоз	30 (1)	
	0,25 -0,35	Лён	Альтернариоз, фузариозное увядание, антракноз, фомоз, аскохитоз		

Тиофанат-метил

ТОПСИН-М 70 %, с.п. (700 г/кг) Филиал АО «Сумитомо Корпорэйшн» в Алматы П-3 08.04.2029 г.	0,6-0,8	Свекла сахарная	Мучнистая роса, церкоспороз	Опрыскивание в период вегетации	20 (3)
	0,8-1,0	Огурцы открытого грунта	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации 0,1% суспензией препарата	7 (4)
	1,0-2,0	Яблоня, груша	Мучнистая роса, парша, монилиоз		20 (5)
	1,0-1,5	Виноград	Оидиум, серая гниль		30 (5)
	2,9	Персик	Мучнистая роса, монилиоз	Опрыскивание в период вегетации 0,29% суспензией препарата	30 (1)

Тиофанат-метил + тебуконазол + триадименол

ТОРРЕС, к.с. (250 г/л + 167 г/л + 43 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-3 20.04.2028 г.	0,3-0,5	Пшеница яровая	Бурая, желтая, стеблевая ржавчина, септориоз, гельминтоспориозные пятнистости	Опрыскивание в период вегетации	30 (1)
	0,3-0,5	Ячмень яровой	Стеблевая, желтая ржавчина, септориоз, гельминтоспориозные пятнистости		

Тирам + дифеноконазол

ТИРАДА, с.к. (400 г/л + 30 г/л) АО Фирма «Август» П-3 14.06.2031 г.	1,5-2,0	Яблоня	Парша, монилиоз, мучнистая роса, гнили плодов при хранении	Четырехкратное опрыскивание в период вегетации: первое в фазу «зеленый конус», последующее – с интервалом 7-14 дней. Расход рабочей жидкости 1000 л/га.	20 (4)
	1,5-2,0	Груша			
	2,5-3,0	Виноград	Оидиум, серая гниль	Четырехкратное опрыскивание в период вегетации: первая обработка – весной, в фазе бутонизация-цветения вторая – до смыкания ягод в грозди, последующие – с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости 1000 л/га. Двукратное опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезни, второе через 10-14 дней. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га.	20 (2)
	3,0-4,0	Картофель	Альтернатива иоз		
	3,0-4,0	Морковь	Альтернатива иоз, мучнистая роса		
	2,0-,3,0	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса, альтернариоз		

Тиофанат-метил + эпоксиконазол

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 310 г/л + 187 г/л					
БАНЗАЙ, к.э. (310 г/л + 187 г/л) Юнайтед Агри-Кемикал Компани ГмбХ, Швейцария, П-3 12.04.2031 г.	0,3–0,5	Пшеница яровая и озимая	Ржавчина бурая, стеблевая, желтая, септориоз, гельминтоспориоз	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)
ВАЛЛИАНТ, к.э. (310 г/л + 187 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-3 30.07.2031 г.	0,3-0,5	Пшеница яровая	Ржавчина бурая, стеблевая, септориоз, гельминтоспориоз	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)
	0,3-0,5	Пшеница озимая	Ржавчина бурая, желтая, септориоз,гельминтоспориоз	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)
РЕКС ДУО 49,7%, к.с. (310 г/л + 187 г/л) БАСФ СЕ, Германия П-3 01.02.2027 г.	0,3	Пшеница яровая и озимая	Ржавчина бурая, стеблевая, желтая, септориоз, гельминтоспориоз	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)
30.03.2028 г.	0,3-0,4	Рис	Пирикулярриоз	Опрыскивание при проявлении первых признаков болезни	

ТИРАКС ДУО, к.с. (310 г/л + 187 г/л) ТОО «Астана-Нан» П-3 02.10.2030 г.	0,3	Пшеница яровая	Ржавчина бурая, стеблевая, желтая, септориоз, гельминтоспориоз	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)
	0,6-0,8	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса, альтернариоз, фомоз, ржавчина		
	0,3	Пшеница озимая	Бурая, желтая, стеблевая ржавчина, септориоз, гельминтоспориоз		
	0,3	Лен масличный	Альтернариоз, антракноз, фузариоз		
ЦЕРБЕР к.с. (310 г/л + 187 г/л) ARCUS INVEST HOLDING B.V. П-3 05.01.2033 г.	0,3-0,4	Пшеница яровая	Ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, септориоз, комплекс пятнистостей колоса (септориоз колоса), гельминтоспориозные пятнистости	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)
	0,3-0,4	Ячмень яровой	Ржавчина карликовая, ржавчина стеблевая, сетчатая пятнистость, септориоз, комплекс пятнистостей колоса (септориоз колоса), гельминтоспориозные пятнистости		

Фамоксадон + цимоксанил

ТАНОС, в.д.г. (250 г/кг + 250 г/кг) ТОО «Кортева Агрисаенс Казахстан» П-3 24.03.2027 г.	0,6	Подсолнечник	Белая гниль, серая гниль, фомоз	Опрыскивание растений в период вегетации в фазы: 4-6 настоящих листьев (профилактическое) и бутонизации. Расход рабочей жидкости 400 л/га	50 (2)
--	-----	--------------	---------------------------------	---	--------

Фенпропидин + пропиконазол

ТИЛТ ТУРБО 575 , к.э. (450 г/л+ 125 г/л) Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария П-3 30.01.2033 г.	0,5- 1,0	Пшеница яровая	Бурая, стеблевая и желтая ржавчина, мучнистая роса, септориоз, пятнистость листьев	Опрыскивание в период вегетации.	30 (2)
---	----------	----------------	--	----------------------------------	--------

Фолпет + мандипропамид

ПЕРГАДО Ф 450, в.д.г. (400 г/кг + 50 г/кг) Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария П-3 10.02.2036 г.	2,5	Лук	Пероноспороз, шейковая гниль	Опрыскивание в период вегетации	28 (3)
---	-----	-----	------------------------------	---------------------------------	--------

Фолпет + триадибензол

ШАВИТ Ф, в.г. (700 г/кг + 20 г/кг) Адама Агрикалчер Б.В.,Надерланды П-3 05.03.2031 г.	2,0-2,5	Виноградники	Оидиум, милдью, серая гниль	Опрыскивание в период вегетации	40 (1)
	1,8-2,0	Томаты, огурцы	Фитофтороз		
	1,8-2,0	Огурцы	Пероноспороз		

Флуазинам

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 500 г/л					
ПРЕГАРД, к.с. (500 г/л) «Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд», Китай П-3 01.08.2029 г.	0,3-0,4	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации	30 (1)
ЗУММЕР, к.с. (500 г/л) Кеминова А/С П-3 17.06.2031 г.	0,3-0,4	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое в фазе смыкания рядов, последующие – с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости 200-800 л/га	7 (4)
ШИРМА, к.с. (500 г/л) АО «Щелково Агрохим» П-3 14.04.2031 г.	0,5-0,75	Яблоня	Парша	Опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое в фазу «зеленый конус» или «розовый бутон», последующие с интервалом 7-10 дней	28 (3)
		Виноград	Милдью, черная пятнистость	Опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое, последующие с интервалом 10-14 дней	20 (3)
	0,3-0,4	Картофель	Фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации: Первое профилактическое в фазу смыкания рядков, последующие с интервалом 7-10 дней	7 (4)

Флуазинам + пропамокарб гидрохлорид

ФЛИНТ 2.0, к.с. (250 г/л + 250 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ,Германия П-3 04.05.2031 г.	0,6-0,8	Картофель	Альтернариоз, фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации: первое – в фазе смыкания рядков, последующие – с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	7 (4)
	0,6-0,8	Томаты открытого грунта	Альтернариоз, фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие с интервалом 7-14 дней.	

Флуазинам + циазофамид

ВИНТАГА, к.с. (300 г/л + 100 г/л) ШАНДОНГ ВЕЙФАНГ РЕЙНБОУ КЕМИКАЛ КО., ЛТД П-4 14.01.2036 г.	0,3-0,5	Томаты	Фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание – профилактическое, последующие с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании – 300-500 л/га	7 (3)
	0,3-0,5	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание – профилактическое в фазу смыкания рядков, последующие с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании – 300-500 л/га	

Флуоксастробин + тебуконазол

ЭВИТО Т, с.к. (180 г/л + 250 г/л) Ариста ЛайфСайенс С.А.С., Франция П-3 08.04.2029 г.	0,5-1,0	Пшеница яровая и озимая	Бурая ржавчина, септориоз, гельминтоспориозные пятнистости	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков заболеваний. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	30 (1)
	0,5-1,0	Ячмень яровой и озимый	Желтая, стеблевая ржавчина, гельминтоспориозные пятнистости		
	0,5-1,0	Рапс яровой	Альтернариоз		

Флуоксастробин + протиоконазол

Джаунт, к.э. (100 г/л + 100 г/л) ТОО «Байер КАЗ» П-3 25.11.2034 г.	1,0-1,25	Лук (кроме лука на перо)	Пероноспороз, стеблевой фитофтороз, фузариоз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое последующие - с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости 300-600 л/га	14 (3)
---	----------	--------------------------	--	--	--------

Флуопирам

Велум, к.с. (400 г/л) ТОО «Байер КАЗ» П-4 30.06.2035 г.	0,8-1,2	Картофель	Стеблевая нематода	Обработка почвы и клубней при посадке. Расход рабочей жидкости 60-100 л/га	60 (1)
	0,6 + 0,6	Картофель	Альтернариоз	Первая обработка почвы и клубней при посадке. Расход рабочей жидкости 60-100 л/га. Вторая обработка – внесение при поливе при высоте растений 20-30 см. Расход рабочей жидкости - 10000-20000 л/г	60 (2)

Флуопирам + пириметанил

ЛУНА ТРАНКВИЛИТИ, к.с. (125 г/л + 375 г/л) ТОО «Байер КАЗ» П-3 26.03.2035 г.	0,6-1,2	Яблоня, груша	Парша	Опрыскивание во время вегетации 3 обработки: по зеленому конусу, розовому бутону далее с интервалом 7 дней. Расход рабочей жидкости 800-1000 л/га	21 (3)
	0,4-0,6	Яблоня, груша	Мучнистая роса		
	0,6-1,2	Виноград	Оидиум, серая гниль	1-я обработка профилактически (ВВСН 71), последующие с интервалом 7-12 дней. Расход рабочей жидкости 800-1000 л/га	21 (4)
	0,6-1,0	Томат защищенного грунта	Серая гниль, альтернариоз, мучнистая роса	1-я обработка профилактически, вторая обработка ВВСН 71, последующие обработки с интервалом 7 дней. Расход рабочей жидкости 500-1500 л/га.	10 (4)
	0,6-1,0	Огурец защищенного грунта	Мучнистая роса	1-я обработка профилактически, последующие с интервалом 7 дней. Расход рабочей жидкости 500-1500 л/га	10 (4)
	0,8-1,2	Земляника	Серая гниль	1-я обработка профилактически, последующие с интервалом 7 дней. Расход рабочей жидкости 200-500 л/га	21 (4)
	0,4-0,8	Картофель	Альтернариоз, мучнистая роса, белая и серая гниль, фомоз	1-я обработка при появлении первых признаков заболевания, вторая с интервалом 7 дней. Расход рабочей жидкости 400 л/га	21 (2)
	0,6-1,0	Томат открытого грунта	Альтернариоз, мучнистая роса	1-я обработка профилактически, вторая обработка ВВСН 71, последующие обработки с интервалом 7 дней. Расход рабочей жидкости 400 л/га	21 (4)
	0,4-1,0	Дыня, арбуз (бахчевые культуры)	Мучнистая роса, альтернариоз	1-я обработка профилактически, последующие с интервалом 7 дней. Расход рабочей жидкости – 200-500 л/га	21 (4)

Флуопирам + протиоконазол

Пропульс, с.э. (75 г/л + 125 г/л) ТОО «Байер КАЗ» П-3 27.11.2034 г.	0,8-1,0	Подсолнечник	Альтернариоз, фомоз, белая гниль, серая гниль, септориоз, фомопсис	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одного из заболеваний, начиная с фазы бутонизации. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	21 (1)
--	---------	--------------	--	--	--------

Флуксапироксад + пираклостробин

ПРИАКСОР, к.э. (75 г/л + 150 г/л) БАСФ СЕ, Германия П-3 17.03.2030 г.	0,6-0,9	Чечевица	Антракноз, аскариоз, белая и серая гниль	Опрыскивание посевов до начала цветения культуры. Расход рабочей жидкости 50-200 л/га	21 (1)
	0,5-0,8	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Мильдю, септориоз, желтая, бурая, стеблевая ржавчина, сетчатая пятнистость листьев	Опрыскивание посевов до начала цветения культуры. Расход рабочей жидкости 50-200 л/га	40 (2)

Флуксапироксад + протиоконазол

ПИЛАРКАДИС, к.с. (200 г/л + 280 г/л) Пиларквим (Шанхай) Ко., Лтд. П-3 05.01.2036 г.	0,1-0,2	Пшеница яровая	Септориоз, мучнистая роса, фузариоз, виды ржавчины, гельминтоспориозные пятнистости	Опрыскивание в период вегетации	40 (2)
--	---------	----------------	---	---------------------------------	--------

Флудиоксонил

ГЕОКС 500, в.д.г. (500 г/кг) Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария П-3 26.04.2033 г.	0,4	Яблоня	Гнили при хранении: монилиальная, кладоспориозная, пенициллезная, горькая, серая, альтернариозная, фузариозная	Опрыскивание в период вегетации перед сбором плодов, 2 обработки	3(2)
---	-----	--------	--	--	------

Флутриафол

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 125 г/л					
ИМБАТТ 12,5%, с.к. (125 г/л) AGROBEST GRUP, Турция П-3 28.02.2030 г.	0,2-0,3	Яблоня	Парша, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых симптомов заболевания	30 (1)
	0,2	Виноградная лоза	Оидиум	Опрыскивание в период вегетации 0, 02% суспензий препарата	30 (2)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 250 г/л					
ИМПАКТ 25%, с.к. (250 г/л) Кеминова А/С, Дания П-3 17.02.2030 г.	0,5	Рапс	Альтернариоз, склеротиниоз	Опрыскивание в период вегетации (профилактически или по сигнализации). Норма расхода рабочей жидкости 200 л/га	30 (1)
	0,75-1,0	Рис	Пирикуляртиоз, альтернариоз, фузариоз		

14.12.2032 г.	0,5	Пшеница яровая	Ржавчина бурая, септориоз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации	30 (1)
	0,5	Ячмень яровой	Сетчатая пятнистость		
	0,1	Виноград	Оидиум, серая гниль	Опрыскивание в период вегетации 0, 01% суспензией препарата	20 (2-3)
	0,1-0,15	Яблоня	Мучнистая роса, парша	Опрыскивание в период вегетации	20 (2)
КЛЭРИТИ, к.э. (250 г/л) Юнайтед Агри-Кемикал Компани ГмбХ, Швейцария П-3 12.04.2031 г.	0,5	Пшеница и ячмень яровые	Бурая, желтая и стеблевая ржавчина, септориоз, гельминтоспориозная пятнистость, мучнистая роса, сетчатая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)
СКАЛЬПЕЛЬ 250, к.с. (250 г/л) Ариста ЛайфСайенс С.А.С., Франция П-3 15.03.2027 г.	0,5	Пшеница озимая	Бурая ржавчина, желтая ржавчина, септориозно-гельминтоспориозные пятнистости листьев	Опрыскивание посевов в фазе колошения. Норма расхода рабочей жидкости 300 л/га	30 (1)
	0,25	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса		
	0,5	Пшеница яровая	Бурая ржавчина, септориозно-гельминтоспориозные пятнистости листьев		
	0,5	Ячмень озимый	Желтая ржавчина, гельминтоспориозная пятнистость листьев		
	0,5	Ячмень яровой	Мучнистая роса, стеблевая ржавчина		
ТРИАФОЛ 25%, с.к. (250 г/л) ТОО «Агрохимия» П-3 21.02.2027 г.	0,5	Пшеница яровая и озимая	Бурая, стеблевая и желтая ржавчина, септориоз, мучнистая роса, гельминтоспориоз, пятнистость листьев	Опрыскивание в период вегетации	30 (1)
	0,1-0,15	Яблоня	Мучнистая роса, парша		20 (2)
	0,1	Виноград	Оидиум, серая гниль		20 (2-3)
УДАР, к.с. (250 г/л) ООО «Агро Эксперт Групп», Россия П-3 24.01.2027 г.	0,5	Пшеница яровая	Бурая, желтая и стеблевая ржавчина, септориозно-гельминтоспориозные пятнистости	Опрыскивание посевов в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	30 (1)
	0,5	Пшеница озимая	Желтая и бурая ржавчина, септориозно-гельминтоспориозные пятнистости, мучнистая роса		
	0,5	Ячмень яровой	Желтая и стеблевая ржавчина, гельминтоспориозные пятнистости		
ФОРИС, к.с. (250 г/л) Лейтон Агрио Европа Кфт., Венгрия П-3 14.03.2027 г.	0,5	Пшеница и ячмень яровые	Бурая, желтая и стеблевая ржавчина, септориоз, гельминтоспориозная пятнистость, мучнистая роса, сетчатая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 500 г/л					
ВЕРСУС, к.э. (500 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-3 05.01.2036 г.	0,25	Пшеница яровая	Бурая ржавчина, септориоз, гельминтоспориоз	Опрыскивание в период вегетации.	30 (1)
	0,25	Ячмень яровой	Стеблевая ржавчина, гельминтоспориоз		
	0,25	Рпс	Альтернариоз, склеротиниоз		
ЭФФЕКТО, к.с. (500 г/л) Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд, Китай П-3 19.09.2027 г.	0,25	Пшеница яровая	Бурая ржавчина, септориоз	Опрыскивание в период вегетации	30 (1)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 800 г/л					
АДВАНС, в.д.г. (800 г/кг) Представительство ООО «ЗЕМЛЯКОФФ КРОП ПРОТЕКШЕН» В РК П-3 27.09.2032 г.	0,15-0,2	Пшеница яровая и озимая	Мучнистой росы, ржавчины бурой, септориоза, пиренофороза	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 300 л/га	30(2)
	0,2	Ячмень яровой и озимый	Мучнистой росы, ржавчины карликовой, ржавчины бурой, ржавчины стеблевой, ринхоспориоза, сетчатой пятнистости, темно-бурой пятнистости		
	0,08	Свекла сахарная	Церкоспороза, мучнистой росы, фомоза	Опрыскивание в период вегетации: при появлении первых признаков одного из заболеваний, последующее в случае необходимости с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости – 300 л/га	

Флутриафол + тиофанат-метил

ПИКСЕЛЬ, к.с. (200 г/л + 300 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-3 26.01.2027 г.	0,3–0,5	Пшеница яровая	Бурая ржавчина, септориоз	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)
---	---------	----------------	---------------------------	---------------------------------	--------

Флутриафол + тиофанат-метил + металаксил

ЛАНТУС, к.с. (200 г/л + 200 г/л + 100 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-3 29.05.2030 г.	0,25-0,35	Пшеница яровая	Бурая, желтая, стеблевая ржавчина, септориоз, гельминтоспориозные пятнистости	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	30 (1)
	0,25-0,35	Ячмень яровой	Желтая, стеблевая ржавчина, септориоз, гельминтоспориозные пятнистости		
	0,3-0,4	Лен масличный	Фомоз, антракноз		
	0,3-0,4	Чечевица	Аскохитоз, антракноз		

Флутриафол + триадимефон

БАЙЗАФОН ЭКСТРА, к.с. (200 г/л + 200 г/л) ООО «ХИМАГРОМАРКЕТИНГ.РУ, Россия П-3 22.05.2029 г.	0,4-0,6	Пшеница яровая	Бурая, стеблевая ржавчина, септориоз	Опрыскивание в период вегетации	20 (1)
--	---------	----------------	--------------------------------------	---------------------------------	--------

Ципродинил

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 200 г/л					
КАНТОР, к.к.р. (200 г/л) АО «Щелково Агрохим» П-3 14.04.2031 г.	1,0-1,3	Виноград	Серая, белая, мягкая гнили, клadosпориоз	Опрыскивание в период вегетации в фазы: бутонизация – начало цветения, перед смыканием ягод в грозди, начало окрашивания ягод	20(3)
	0,5-0,75	Яблоня	Парша, монилиоз, альтернариоз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации в фазу «зеленый конус»-конец цветения с интервалом 7-10 дней	28(3)
	0,5-1,3	Черешня	Клястероспориоз, коккомикоз, монилиальная гниль	Двукратное опрыскивание: первое – при появлении первых признаков болезни; последующие – с интервалом 7-10 дней	28(2)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 500 г/кг					
ПЛАНТЕНОЛ Нео, в.д.г. (500 г/кг) АО ФИРМА «АВГУСТ» П-3 20.01.2036 г.	0,3	Семечковые культуры (яблоня)	Парша, альтернариоз, монилиоз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации в фазы: «зеленый конус» - конец цветения с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости – 1000 л/га	60(2)
	0,5	Косточковые культуры (вишня, черешня)	Плодовая гниль	Опрыскивание в период вегетации, первое – при появлении первых признаков заболевания, второе – за 14 дней до уборки урожая. Расход рабочей жидкости – 1000 л/га	5 (2)
	0,3-0,5	Косточковые культуры (вишня, черешня)	Монилиальный ожог	Опрыскивание в период вегетации, первое – до цветения, последующее – с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости – 1000 л/га	5 (2)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 750 г/л					
ХОРУС 750, в.д.г. (750 г/кг) Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария П-3 25.11.2035 г.	0,35	Абрикос	Плодовая гниль, монилиоз, кластероспороз	Опрыскивание в период вегетации	28 (2)
	0,2	Яблоня	Парша, монилиоз, альтернариоз	Опрыскивание в конце фазы зеленого конуса, последующие после цветения с интервалом 7-10 дней	28 (2)
Хорист, в.д.г. (750 г/кг) ООО «Шанс» П-3 25.02.2035 г.	0,2-0,35	Плодовые косточковые (персик, абрикос, слива, вишня, черешня)	Монилиальный ожог	Опрыскивание в период вегетации: первое - до цветения, последующее - с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости - 1000 л/га.	10(2)
	0,2	Яблоня	Парша, альтернариоз, монилиоз, мучнистая роса (частичное действие)	Опрыскивание в период вегетации в фазы: «зеленый конус» - конец цветения с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	39(2)
	0,2	Груша	Парша, альтернариоз, монилиоз, мучнистая роса		
	0,6-0,7	Виноград	Серая гниль, белая гниль, комплекс гнилей ягод: оливковая, плесневидная, черная аспергиллезная, водянистая ризопусная	Опрыскивание в период вегетации в фазы: бутонизация – начало цветения, перед смыканием ягод в грозди, начало окрашивания ягод. Расход рабочей жидкости – 1000 л/га	10(3)
	0,35	Плодовые косточковые (персик, абрикос, слива, вишня, черешня)	Кластероспориоз, коккомикоз	Опрыскивание в период вегетации: первое - при появлении первых признаков заболевания, последующее - с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	10(2)
	0,35	Плодовые косточковые (персик, абрикос, слива, вишня, черешня)	Плодовая гниль	Опрыскивание в период вегетации: первое - при появлении первых признаков заболевания, второе - за 14 дней до уборки урожая. Расход рабочей жидкости 1000 л/га	10(2)

Ципродинил+ флудиоксонил

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 150 г/л + 140 г/л					
Инсигния, м.д. (150 г/л + 140 г/л) АО «Щелково Агрохим» П-3 03.02.2036 г.	0,8-1,0	Яблоня	Гнили плодов при хранении: парша, монилиальная, клadosпориальная, пенициллезная, серая горькая, альтернариозная, фузариозная, "мух осед"	Опрыскивание в период вегетации: перед сбором плодов (двукратно)	10(2)

Ципроконазол

Фанфан, к.э. (250 г/л) ТОО «ФМРУС» П-3 03.02.2035 г.	0,2-0,4	Пшеница яровая и озимая	Виды ржавчины, мучнистая роса, септориоз, фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков заболевания. Расход рабочей жидкости 200- 300 л/га.	40(1)
	0,2-0,4	Соя	Церкоспороз, септориоз, антракноз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков заболевания. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га.	30(1)
	0,2-0,4	Рапс яровой	Альтернариоз, фомоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезней, последующее – через 10-14 дней (вытягивание стеблей - начало образования стручков в нижнем ярусе). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га.	20(2)
	0,2-0,4	Рапс яровой	Склеротиниоз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации в фазе 9 и более листьев - начало удлинения стебля и конец бутонизации - начало цветения. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га.	21(2)

Ципроконазол + тебуконазол

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 250 г/л + 80 г/л					
Рейнджер, к.с. (80 г/л + 250 г/л) Представительство ООО «Агро Эксперт Групп» в РК П-3 24.01.2033	0,5-0,7	Подсолнечник	Мучнистая роса, фомоз, септориоз, альтернариоз, серая гниль (склеротиниоз), ржавчина, аскохитоз	Опрыскивание посевов в период вегетации культуры. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га.	30(2)
		Соя	Мучнистая роса, серая гниль, ржавчина, септориоз, антракноз, фузариоз, церкоспороз, аскохитоз		
		Нут	Аскохитоз, ржавчина, фузариоз, антракноз		
		Горох	Аскохитоз, ржавчина, фузариоз, антракноз, серая гниль		
	0,5-0,8	Рапс яровой	Альтернариоз, фомоз, пероноспороз, склеротиниоз, серая гниль, мучнистая роса		
	0,4-0,5	Ячмень яровой	Гельминтоспориозные пятнистости (в т.ч. темнобурая и сетчатая пятнистости), стеблевая ржавчина, мучнистая роса		

	0,4-0,5	Пшеница яровая	Бурая, стеблевая и желтая ржавчина, септориоз, пиренофороз, гельминтоспориозные пятнистости, мучнистая роса		
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 300 г/л + 40 г/л					
ТЕНАЗОЛИН ГОЛД, к.э. (300 г/л + 40 г/л) ТОО «Защита-растений-К» П-3 21.04.2030 г.	0,2	Пшеница яровая, ячмень яровой	Мучнистая роса, виды ржавчины, сетчатая пятнистость, комплекс пятнистостей колоса, септориоз, фузариоз и корневые гнили	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	30 (2)
	0,25	Рапс	Альтернариоз, фомоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых симптомов заболевания, в фазе вытягивания стеблей – начало образования стручков в нижнем ярусе растений.Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	30 (2)
	0,25	Лен	Фомоз, антракноз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых симптомов заболевания. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	30 (2)
	0,25	Соя	Аскохитоз, серая гниль	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых симптомов заболевания. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	30 (2)
		Горох	Аскохитоз, серая гниль, ржавчина, фомоз, корневые гнили		
		Чечевица			
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 380 г/л + 20 г/л					
ФОРТУНА, 40% с.к. (380 г/л + 20 г/л) ТОО «Агрохимия» П-3 19.02.2031 г.	0,1-0,2	Пшеница яровая и озимая	Бурая, желтая, стеблевая ржавчина, септориоз, гельминтоспориозные пятнистости	Опрыскивание в период вегетации	30 (1)

Ципроканазол + триадименол + боскалид + пираклостробин

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 100 г/л + 253 г/л + 48 г/л + 97 г/л					
ЭЛИКСАР, к.с. (100 г/л + 253 г/л + 48 г/л + 97 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-3 27.03.2036 г.	0,15 - 0,25	Чечевица	Ржавчина, аскохитоз, антракноз, мучнистая роса, фузариоз, серая гниль	Опрыскивание посевов в период вегетации культуры. Расход рабочей жидкости 100-200 л/га.	30(2)
	0,15 - 0,25	Подсолнечник	Ржавчина, фомоз, альтернариоз, бурая пятнистость, склеротиниоз, аскохитоз		30(1)
	0,15 - 0,25	Лён	Альтернариоз, фузариозное увядание, антракноз, фомоз, аскохитоз		30(1)
	0,15 - 0,2	Ячмень яровой	Стеблевая и желтая ржавчина, гельминтоспориозные пятнистости		30(2)
	0,15 - 0,2	Пшеница яровая	Бурая, желтая и стеблевая ржавчина, септориоз, гельминтоспориозные пятнистости		30(2)

Ципроканазол + триадименол

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 150 г/л + 350 г/л					
НИБЕЛУНГ, к.с. (150 г/л + 350 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-3 27.03.2036 г.	0,15-0,25	Подсолнечник	Ржавчина, фомоз, альтернариоз, склеротиниоз	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 100-200 л/га.	30(1)
	0,15-0,25	Лён	Фузариозное увядание, антракноз		30(2)
	0,1-0,2	Ячмень яровой	Стеблевая и желтая ржавчина, септориоз, гельминтоспориозная пятнистость		
	0,1-0,2	Пшеница яровая	Бурая, желтая и стеблевая ржавчина, септориоз, гельминтоспориозная пятнистость		
	0,15-0,25	Чечевица	Ржавчина, аскохитоз, фузариоз		

Ципроканазол + триадименол + тебуконазол

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 165 г/л + 153 г/л + 200 г/л					
БОЛИВАР, к.с. (165 г/л + 153 г/л + 200 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-3 16.03.2036 г.	0,1-0,2 л/га	Пшеница яровая	Бурая, желтая и стеблевая ржавчина, септориоз, гельминтоспориозная пятнистость	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 100-200 л/га.	30(2)
	0,1-0,2 л/га	Ячмень яровой	Стеблевая и желтая ржавчина, гельминтоспориозная пятнистость		30(1)
	0,15-0,25 л/га	Чечевица	Ржавчина, аскохитоз, антракноз, мучнистая роса, фузариоз, серая гниль		
	0,15-0,25 л/га	Лён	Альтернариоз, фузариозное увядание, антракноз, фомоз, аскохитоз		
	0,15-0,25 л/га	Подсолнечник	Ржавчина, фомоз, фомопсис, альтернариоз, бурая пятнистость, склеротиниоз, аскохитоз		

ХОМ + цимоксанил

ОРДАН, с.п. (689 г/кг + 42 г/кг) АО Фирма «Август» П-4 10.02.2032 г.	2,0-2,5	Картофель	Фитофтороз, макроспориоз	Опрыскивание в период вегетации: первое- профилактическое до смыкания ботвы в рядах или не позднее 2 суток после инфицирования растений, последующие с интервалом 7-14 дней. Расход рабочей жидкости - 400 л/га	20 (3)
	2,5-3,0	Томаты	Фитофтороз, макроспориоз	Опрыскивание в период вегетации первое- профилактическое в стадии 4-6 настоящих листьев или не позднее 2 суток после Инфицирования растений, последующие с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости – 600 л/га.	5 (3)
	2,5-3,0	Огурцы	Мучнистая роса, пероноспороз		
	2,5-3,0	Лук	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации первое- профилактическое последующие с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га.	5 (3)
	2,5-3,0	Виноград	Милдью	Опрыскивание в период вегетации первое- профилактическое последующие с интервалом 7-14 дней. Расход рабочей жидкости - 1000 л/га.	20 (3)
	2,5-3	Яблоня	Парша		

Хлороталонил

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 500 г/л					
БРАВО 500, с.к. (500 г/л) Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария П-2	2,2-3,0	Пшеница яровая и озимая	Септориоз, ржавчина бурая, стеблевая, желтая при слабом и среднем уровне развития	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)
	2,2-3,0	Картофель	Фитофтороз		10 (3)
	2,4-4,8	Хмель	Пероноспороз		20 (4)

10.10.2032 г.	2,2-2,7	Огурцы открытого грунта	Пероноспороз		20 (3)
	3,0-6,0	Огурцы защищенного грунта	Пероноспороз		3 (3)
	3,0-3,3	Лук (семенники)	Пероноспороз		-3
	3,0-3,3	Томаты (семенные посевы)	Фитофтороз, бурая пятнистость		-3
ГИАЦИНТ, с.к. (500 г/л) АО Фирма «Август» П-3 22.04.2030 г.	2,2-3,0	Картофель	Фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое или при появлении первых признаков болезней, последующие – с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости – 400 л/га	20 (3)
	3,0-3,3	Лук (семенники)	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости – 300-400 л/га	-3
Концентрация д.в. (+/- 5%) – 720 г/л					
БАЛЕАР 72%, с.к. (720 г/л) Arysta LifeScience Benelux Sprl П-3 05.03.2031 г.	1,6-2,0	Картофель	Фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации	10 (3)
	1,6-1,9	Огурцы	Пероноспороз		3 (3)

Эпоксиконазол + пираклостробин + флуксапироксад

ЦЕРИАКС ПЛЮС, к.э. (41,6 г/л + 66,6 г/л + 41,6 г/л) БАСФ СЕ, Германия П-3 18.11.2029 г.	0,3-1,0	Пшеница яровая	Бурая ржавчина, стеблевая ржавчина, мучнистая роса, септориозно-гельминтоспориозная пятнистость	Опрыскивание в период вегетации	40(2)
		Пшеница озимая	Бурая ржавчина, желтая ржавчина, мучнистая роса, септориозно-гельминтоспориозная пятнистость		40(1)
		Ячмень яровой	Стеблевая ржавчина, мучнистая роса, септориозно-гельминтоспориозная пятнистость, ринхоспориоз		40(2)
	0,4-0,6	Чечевица	Ржавчина, альтернариоз, аскохитоз, белая и серая гниль	Опрыскивание посевов до начала цветения культуры. Норма расхода рабочей жидкости 200- 300 л/га.	30(1)
		Лен масличный	Альтернариоз, фомоз, антракноз, пасмо	Опрыскивание в период вегетации. Норма расхода рабочей жидкости 200-300 л/га.	30 (1)

Эпоксиконазол + метконазол

ОСИРИС 6,5%, к.э. (37,5 г/л + 27,5 г/л) БАСФ Агро Б.В., Швейцария П-3 17.02.2031 г.	1,0-1,5	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Септориоз, бурая, стеблевая и желтая ржавчина, темно- бурая и сетчатая пятнистости, гельминтоспориоз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)
--	---------	--	--	---------------------------------	--------

Эпоксиконазол + ципроконазол

РАКУРС, с.к. (240 г/л + 160 г/л) АО Фирма «Август» П-3 26.12.2032 г.	0,4-0,5	Горох	Аскохитоз, мучнистая роса, ржавчина, антракноз	Опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое или при проявлении первых признаков одного из заболеваний, второе через 10- 14 дней. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	20 (2)
	0,3-0,4	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз	Опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое или при проявлении первых признаков одного из заболеваний, второе через 15- 20 дней. Расход рабочей жидкости- 200-400 л/га.	20 (2)
	0,2-0,3	Пшеница яровая	Мучнистая роса, бурая, стеблевая и желтая ржавчина, септориоз, пиренофороз	Опрыскивание в период вегетации в фазы конец кущения – начало выхода в трубку. Расход рабочей жидкости – 200 л/га	20 (2)

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН

Торговое название, препаративная форма, действующее вещество, фирма-регент. Дата окончания срока регистрации(число, месяц, год)	Норма расхода препарата	Культура, обрабатываемый объект	Вредный организм, заболевание, объект	Способ, время обработки, ограничения
---	-------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

Ацетамиприд

ЯКУДЗА, в.д.г. (400 г/кг) Жеджанг Жонгшан Кемикал ГрупСтокКо., Лтд, Китай 08.10.2028 г.	0,05-0,07	Ячмень яровой	Хлебная жужелица, хлебная полосатая блошка, злаковые мухи	Предпосевная обработка семян (10 л на 1 т семян)
--	-----------	---------------	---	--

Ацибензолар-С-метил

РЕССИВИ 375, к.с. (375 г/л) Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария 10.05.2033 г.	0,8-1,2	Подсолнечник	Ложная мучнистая роса	Протравливание семян (расход рабочей жидкости 10-15 л/т семян)
---	---------	--------------	-----------------------	--

Бифентрин

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 200 г/л				
ВУЛКАН 200, т.пс. (200 г/л) АО «ФМРус», Россия 18.02.2029 г.	2,0	Подсолнечник	Проволочники и ложнопроволочники	Обработка семян Расход рабочей. жидкости – до 12 л/т
	2,0-2,5	Кукуруза	Проволочники и ложнопроволочники	Обработка семян за 14 и более дней до посева. Расход рабочей жидкости – до 12,5 л/т
Киллиан, т.пс. (200 г/л) ФОРВАРД 27.01.2036 г.	2,0	Подсолнечник	Проволочники и ложнопроволочники, подгрызающие совки	Обработка семян Расход рабочей. жидкости – до 12 л/т
	2,0-2,5	Кукуруза		Обработка семян. Расход рабочей жидкости – до 12,5 л/т

Бронопол

ЭМИССАР, в.р.к. (250 г/л) АО «Щелково Агрохим» 17.02.2030 г.	2,5-3,0	Хлопчатник	Гоммоз	Протравливание семян. Расход рабочей жидкости 25-30 л на 1 т опушенных и 15-20 л на 1 т механически оголенных семян
--	---------	------------	--------	---

Гимексазол

ТАЧИГАРЕН, 70% с.п. (700 г/кг) «Мицуи Кемикалс Агро, Инк.», Япония 10.06.2029 г.	6,0	Сахарная свекла	Корнед всходов	Протравливание семян суспензией препарата. Расход рабочей жидкости – 15 л/т семян
---	-----	-----------------	----------------	---

Дифеноконазол

Концентрация д.в. (+/- 5%)~30 г/л				
ДИВИДЕНД 030, к.с. (30 г/л) Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария 09.04.2028 г.	2,0	Пшеница яровая	Твердая и пыльная головня, корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян суспензией препарата. Расход рабочей жидкости 10 л воды на 1 т семян
Дизол, к.с. (30 г/л) ШАНДОНГ ВЕЙФАНГ РЕЙНБОУ КЕМИКАЛ КО., ЛТД 26.03.2036 г.	2,0	Твердая и мягкая яровая пшеница	Твердая и пыльная головня, корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян суспензией препарата. Расход рабочей жидкости 10 л воды на 1 т семян
	2,0	Ячмень	Каменная и пыльная головня, корневые гнили, плесневение семян	

Дифеноконазол + азоксистробин

ТУМЕН, т.к.с. (167 г/л + 67 г/л), Лейтон Агрио Европа, КФТ., Венгрия 17.03.2032 г.	0,3	Ячмень яровой	Каменная и пыльная головня, плесневение семян, фузариозные, гельминтоспориозные корневые гнили, альтернариоз	Предпосевная обработка семян суспензией препарата. Расход рабочей жидкости – 10 л/т
	0,3	Пшеница яровая	Твердая и пыльная головня, плесневение семян, фузариозные, гельминтоспориозные корневые гнили, альтернариоз, септориоз	

Дифеноконазол+ металаксил-м + тиаметоксам

ПРЕМЬЕР МИКС, к.с. (36,92 г/л + 3,08 г/л + 92,3 г/л) ШАНДОНГ ВЕЙФАНГ РЕЙНБОУ КЕМИКАЛ КО., ЛТД, 26.12.2034	1,5-2,0	Пшеница яровая	Хлебная жужелица, хлебные блошки злаковые мухи, цикадки, проволочники, твердая головня, пыльная головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян, в т.ч. альтернариозная семенная инфекция, септориоз, мучнистая роса (на ранних стадиях развития) , питиозная корневая гниль	Протравливание семян непосредственно перед посевом или заблаговременно (10 л воды на 1 т)
	1,7-2,5	Ячмень	Хлебная жужелица, хлебные блошки, злаковые мухи, цикадки, проволочники, ложнопроволочники, твердая головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян, в т.ч. альтернариозная семенная инфекция, септориоз, питиозная корневая гниль	Протравливание семян непосредственно перед посевом или заблаговременно (10 л воды на 1 т)

Дифеноконазол + мефеноксам

ДИВИДЕНД ЭКСТРИМ 115, т.к.с. (92 г/л + 23 г/л) Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария 22.01.2034	0,4	Пшеница яровая	Твердая и пыльная головня, корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян суспензией препарата (10-12 л воды на 1 т семян)
	0,4-0,5	Ячмень яровой	Каменная и пыльная головня, корневые гнили, плесневение семян	
	0,4-0,5	Пшеница озимая	Твердая и пыльная головня, корневые гнили, плесневение семян, снежная плесень	

Дифеноконазол + мочевиноформальдегидные соединения

Сункар-М, к.с. (30 г/л + 200 г/л) ТОО «Научно-производственное объединение АНА-ЖЕР» 08.07.2035 г.	1,0	Пшеница яровая, ячмень яровой	Твердая (каменная) и пыльная головня, корневые гнили, плесневение семян	Обработка семян перед посевом. Расход рабочей жидкости 10 л/т.
---	-----	-------------------------------	---	---

Дифеноконазол + тебуконазол + азоксистробин

ОПЛОТ ТРИО, в.с.к. (90 г/л + 45 г/л + 40 г/л) АО Фирма «Август» 31.01.2029 г.	0,4-0,6	Пшеница яровая	Пыльная, твердая головня, корневые гнили, септориоз, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом. Расход рабочей жидкости 10 л/т
04.07.2032 г.	0,5- 0,6	Лен масличный	Антракноз, фузариоз, крапчатость,	Протравливание семян. Расход рабочей жидкости – 5 л/т
	0,5 -0,6	Горох	Аскохитоз, фузариоз, плесневение семян	Протравливание семян. Расход рабочей жидкости – 8 л/т

Дифеноконазол + ципроконазол

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 30 г/л + 6,3 г/л				
ДИВИДЕНД СТАР 036, т.к.с. (30 г/л + 6,3 г/л) Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария 30.03.2028 г.	1,0-1,25	Пшеница яровая	Твердая и пыльная головня, корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян суспензией препарата. Расход рабочей жидкости 10 л воды на 1 т семян
ДВД ШАНС, к.с. (30 г/л + 6,3 г/л) ООО «Шанс» 23.08.2031	0,75-1	Пшеница яровая	Твердая головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, септориоз, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости 10 л/т
	1,0		Пыльная головня	
	1,0	Пшеница озимая	Пыльная головня, твердая головня, септориоз, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян	
	1,5	Ячмень яровой	Пыльная головня, ложная (черная) пыльная головня	
	1,0		Каменная головня, сетчатая пятнистость, плесневение семян	
	0,75-1		Фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили	
	1-1,5	Ячмень озимый	Пыльная головня, каменная головня, ложная (черная) пыльная головня, темнубурая и сетчатая пятнистости, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян	
	1,0	Овес	Пыльная головня, покрытая головня, красно-бурая пятнистость, плесневение семян	
	0,75	Овес	Гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили	
	1,0	Рожь озимая	Гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, стеблевая головня, плесневение семян	

Имазалил + металаксил + тебуконазол

БЕНЕФИС, м.э. (50 г/л + 40 г/л + 30 г/л) АО «Щелково Агрохим» 06.11.2035 г.	0,5-0,7	Пшеница яровая, ячмень яровой	Пыльная, твердая(каменная) головня, корневые гнили плесневение, семян	Протравливание семян. Расход рабочей жидкости 10 л/т
	0,5-0,7	Соя, горох, нут	Плесневение семян, аскохитоз, фузариоз, серая гниль	
17.03.2031 г.	0,5-0,7	Пшеница озимая	Твердая, пыльная головня, корневые гнили, мучнистая роса, снежная плесень, плесневение семян	

Прохлораз + имазалил + тебуконазол

ПАРФЕНОН, м.э. (100 г/л + 25 г/л + 15 г/л) АО «Щелково Агрохим» 28.02.2034 г.	1,0-1,2	Ячмень яровой, в т.ч. пивоваренный	Каменная головня, пыльная головня, ложная пыльная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, сетчатая пятнистость, плесневение семян, в т.ч. альтернариозная семенная инфекция	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно
	1,0-1,2	Пшеница яровая и озимая	Пыльная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, снежная плесень, плесневение семян, в т.ч. альтернариозная семенная инфекция, мучнистая роса (на ранних фазах развития)	

Имазалил + прохлораз + тритикоконазол

ТУРИОН, к.э. (66 г/л + 132 г/л + 56 г/л) ФОРВАРД 15.01.2036 г.	0,28-0,35	Пшеница яровая	Корневые гнили, пыльная головня, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости (10 л на 1 т семян)
	0,28-0,35	Ячмень яровой	Корневые гнили, твердая(каменная) головня, плесневение семян	

Имидаклоприд

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 200 г/л				
ЛУИДОР ПРО, к.с. (200 г/л) АО «Щелково Агрохим» 01.10.2030 г.	15-20	Рапс	Крестоцветные блошки	Протравливание семян заблаговременно или непосредственно перед посевом Расход рабочей жидкости до 30 л/т.
	0,4-0,6	Картофель	Проволочники, колорадский жук, тли	Обработка клубней перед посадкой (расход рабочей жидкости 10 л/т). Обработка клубней при посадке (расход рабочей жидкости до 25 л/т)
01.10.2031 г	2,0-2,5	Соя	Проволочники, ложнопроволочники подгрызающие совкиклубеньковые долгоносики.	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно
	0,6-1,0	Нут	Проволочники, ложнопроволочники, подгрызающие совки, клубеньковые долгоносики	
	0,75-1,25	Горох	Проволочники, ложно проволочники, подгрызающие совки, клубеньковые долгоносики,	
	15	Подсолнечник	Проволочники, долгоносики, щитоноска, тли, песчаный медляк	Протравливание семян заблаговременно или непосредственно перед посевом Расход рабочей жидкости до 25 л/т.
	15-20	Рапс	Крестоцветные блошки	Протравливание семян заблаговременно или непосредственно перед посевом Расход рабочей жидкости до 30 л/т.
	0,4-0,6	Картофель	Проволочники, колорадский жук, тли	Обработка клубней перед посадкой (расход рабочей жидкости 10 л/т). Обработка клубней при посадке (расход рабочей жидкости до 25 л/т)
	2,0-2,5	Лён	Блошки, трипсы	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно.
05.02.2034 г.	1,0-1,25	Пшеница яровая	Проволочники и другие почвообитающие вредители, злаковые мухи, тли	Протравливание семян суспензией препарата (8 – 10 л на 1 т семян)
	6,0-7,0	Кукуруза	Проволочники и другие почвообитающие вредители	
	15,0	Подсолнечник	Проволочники, долгоносики, щитоноска, тли, песчаный медляк	Протравливание семян заблаговременно или непосредственно перед посевом Расход рабочей жидкости до 25 л/т.
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 500 г/л				
АКИБА в.с.к. (500 г/л) ООО «Агро Эксперт Групп», Россия 09.02.2028 г.	0,4-0,5	Пшеница яровая	Злаковые мухи, хлебные блошки, проволочники	Протравливание семян суспензией препарата (8-10 л на 1 т семян)
	0,4-0,5	Ячмень яровой	Злаковые мухи, хлебные блошки	
	5,0-6,0	Кукуруза	Шведская муха, проволочники	
	6,0-7,0	Подсолнечник	Проволочники и др. почвообитающие вредители	Протравливание семян суспензией препарата (10 л на 1 т семян)
	6,0-8,0	Рапс	Комплекс почвенных вредителей, крестоцветные блошки, тли, капустная белянка, скрытнохоботник	
	0,08-0,1	Картофель	Проволочники, колорадский жук	Обработка клубней. Расход рабочей жидкости до 10 л/т клубней (перед осадкой), 25 л/т клубней (при посадке)
	0,8-1,0	Лен	Льняные блошки	Протравливание семян суспензией препарата (10 л на 1 т семян)
	0,8-1,0	Соя	Проволочники	
06.08.2029 г.	0,4-0,5	Озимая пшеница	Злаковые мухи, тли, хлебные блошки, трипсы, проволочники и другие почвообитающие вредители	Протравливание семян суспензией препарата (8-10 л на 1 т семян)
ТАБУ, в.с.к. (500 г/л) АО Фирма «Август» 31.01.2029 г.	0,8-1,0	Лен масличный	Крестоцветные блошки	Обработка семян. Расход рабочей жидкости – 11 л/т
01.10.2030 г.	0,4-0,5	Пшеница яровая	Злаковые мухи, хлебные блошки, проволочники	Протравливание семян суспензией препарата (10 л воды на 1 т семян)
10.02.2032 г.	0,4-0,5	Пшеница озимая	Злаковые мухи, хлебные блошки	Протравливание семян суспензией препарата (10 л воды на 1 т семян)
17.09.2034 г.	0,2-0,3	Картофель	Проволочники, колорадский жук	Протравливание клубней суспензией препарата (10 л воды на 1 т семян)
	6,0-7,0	Подсолнечник	Проволочники, ложнопроволочники	Протравливание семян суспензией препарата (10 л воды на 1 т семян)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 600 г/л, г/кг				
ИМИДАШАНС-С, к.с. (600 г/л) ООО «Шанс» 07.03.2029 г.	0,3-0,6	Пшеница, ячмень	Шведская и гессенская муха, хлебные блошки	Обработка семян. Расход рабочей жидкости 10 л/т
	3,0-6,0	Рапс	Крестоцветные блошки	Обработка семян. Расход рабочей жидкости 10-18 л/т
	5,0-9,0	Кукуруза	Проволочники и ложнопроволочники, шведская муха	Обработка семян. Расход рабочей жидкости 10- 16 л/т
	8,0-12,0	Подсолнечник	Проволочники и ложнопроволочники	Обработка семян. Расход рабочей жидкости 10-17 л/т
	0,08-0,1	Картофель	Проволочники, колорадский жук	Обработка клубней до посадки. Расход рабочей жидкости – 8–10 л/т.
30.12.2030 г.	0,6-0,75	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Обработка семян. Расход рабочей жидкости 10 л/т
КОНВОЙ, к.с. (600 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия 30.07.2031 г.	5,0-7,0	Рапс	Комплекс почвенных вредителей, тли, трипсы, крестоцветные блошки, капустная белянка, скрытнохоботник	Протравливание семян суспензией препарата (10 л воды на 1 т семян)
КОНТАДОР, в.р.п. (600 г/кг) Лейтон Агрио Европа КФТ Венгрия 15.04.2035 г.	10,0	Рапс	Почвообитающие вредители, вредители всходов	Протравливание семян суспензией препарата (10 л воды на 1 т семян)
	8,0-10,0	Кукуруза	Почвообитающие вредители	
ПИКУС, 60% к.с. (600 г/л)	5,5-6,5	Рапс	Крестоцветная блошка, рапсовый пилильщик, капустная моль	Обработка семян

Кеминова А/С, Дания 17.02.2030 г.	4,0-5,0	Кукуруза	Проволочники	
16.01.2033 г.	0,5-0,75	Пшеница яровая	Стеблевые блошки, гессенская муха	Обработка семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно суспензией препарата (10 л воды на 1 т. семян)
	6,0-8,0	Подсолнечник	Почвообитающие вредители (проволочник, ложнопроволочни к)	
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 700 г/кг				
БАТЫЙ, 70% с.п. (700 г/кг) ТОО «Agro Mark Kaz» 22.11.2033 г.	7,0	Кукуруза	Проволочники, шведская муха, луговой мотылек	Протравливание семян суспензией препарата (10 л воды на 1 т семян)
	10,5	Подсолнечник	Проволочники, долгоносики	
	5,0	Хлопчатник	Тли, трипсы	Протравливание семян суспензией препарата (23-30 л воды на 1 т семян опушенных и 15-20 л воды на 1 т семян оголенных)
	0,15-0,2	Картофель	Проволочники, колорадский жук	Протравливание клубней (10 л воды на 1 т клубней)
	10,0	Рапс	Почвообитающие вредители, вредители всходов	Протравливание семян суспензией препарата непосредственно перед посевом
ДРАЙВЕР, в.д.г. (700 г/кг) ARCUS INVEST HOLDING B.V 26.12.2032 г.	0,25-0,35	Пшеница яровая	Злаковые мухи, хлебные блошки, проволочники	Протравливание семян суспензией препарата (10 л на 1 т семян)
	0,25-0,35	Ячмень яровой	Злаковые мухи, хлебные блошки	
	0,5-0,7	Лен	Льняные блошки, проволочники	
	8,0-10,0	Кукуруза	Почвообитающие вредители	
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 750 г/кг				
ПУНТО ЭКСТРА, в.д.г. (750 г/кг) ШАНДОНГ ВЕЙФАНГ РЕЙНБОУ КЕМИКАЛ КО., ЛТД, П-1 08.07.2035 г.	5,0-9,0	Кукуруза	Проволочники, подгрызающие совки, почвообитающие вредители	Обработка семян. Расход рабочей жидкости 10-17 л/т
	8,0-12,0	Подсолнечник	Проволочники, подгрызающие совки, почвообитающие вредители	

Имидаклоприд + дифеноконазол + тебуконазол

ХЕТ-ТРИК с.к. (333 г/л + 67 г/л + 17 г/л) АО Фирма «Август» 20.06.2032 г.	1,0-1,5	Пшеница и ячмень яровые	Твердая головня, пыльная головня, корневые гнили, плесневение семян, хлебные блошки, злаковые мухи (шведская муха)	Протравливание семян суспензией препарата. Расход рабочей жидкости – 10л/т
	1,0-1,5	Пшеница озимая	Пыльная головня, корневые гнили, снежная плесень, плесневение семян	Протравливание семян суспензией препарата. Расход рабочей жидкости 10 л/т.

Имидаклоприд + клотианидин

ТАБУ НЕО, с.к. (400 г/л + 100 г/л) АО Фирма «Август» 11.02.2029 г.	5,0-7,0	Кукуруза	Проволочники	Обработка семян. Расход рабочей жидкости –15-18 л/т.
	6,0-8,0	Рапс	Крестоцветные блошки	
14.06.2031 г.	6-8	Подсолнечник	Проволочники	Протравливание семян, расход рабочей жидкости 18 л/т
	0,5-1,0	Яровой ячмень и пшеница	Злаковые мухи, хлебные блошки	Протравливание семян. Расход рабочей жидкости 11 л/т
	0,8-1,2	Соя, горох, нут, чечевица	Проволочники	
04.07.2032 г.	0,8-1,2	Горох, нут	Проволочники	

Имидаклоприд + тебуконазол

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 233 г/л + 13 г/л				
КЛОРИД ЭКСТРА, к.с. (233 г/л + 13 г/л) ТОО «Астана-Нан» 12.01.2032 г.	1,5-1,75	Пшеница яровая	Твердая, пыльная головня, плесневение семян, корневые гнили, блошки, злаковые мухи, пшеничный трипс	Протравливание семян суспензией препарата
ЮНТА, к.с. (233 г/л + 13 г/л) ТОО «Байер КАЗ» 29.01.2036 г.	1,5-1,75	Пшеница яровая	Твердая, пыльная головня, плесневение семян, корневые гнили, блошки, злаковые мухи, пшеничный трипс	Протравливание семян суспензией препарата (10 л воды на 1 т семян)
24.02.2036 г.	1,5-1,75	Рис	Рисовый комарик, тли, прибрежная муха, трипс, минеры, альтернариоз, фузариоз, бактериоз, пирикулярриоз.	
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 350 г/л + 25 г/л				
ТЕБУСИЛ ПРО, с.к. (350 г/л + 25 г/л) ТОО «Достык-Агро 2012» 20.01.2036 г.	1,0	Пшеница яровая	Твердая, пыльная головня, плесневение семян, корневые гнили, блошки, злаковые мухи, пшеничный трипс	Протравливание семян суспензией препарата (10 л воды на 1 тонну семян).

Имидаклоприд + фипронил

ТАБУ СУПЕР, с.к. (400 г/л + 100 г/л) АО Фирма «Август» 26.05.2030 г.	0,3-0,5	Картофель	Проволочники, колорадский жук	Обработка клубней до или во время посадки. Расход рабочей жидкости – 10 л/т
	1,0-1,5	Пшеница яровая	Хлебные блошки, злаковые мухи, проволочники	Обработка семян. Расход рабочей жидкости 11 л/т
	8,0	Подсолнечник	Проволочники, долгоносики	Обработка семян. Расход рабочей жидкости 18 л/т
	6,0-8,0	Кукуруза	Проволочники, луговой мотылек	

Ипконазол

РАНКОНА, 1,5% м.э. (15 г/л) Ариста Лайф Сайенс Грейт Британ Лтд., Великобритания.	0,67-1,0	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Каменная, твердая, пыльная головня, плесневение семян, корневые гнили	Протравливание семян суспензией препарата (8-10 л воды на 1 т семян)
--	----------	--	---	--

24.02.2030 г				
--------------	--	--	--	--

Ипконазол + тирам

Эклипс, т.к.с. (10 г/л + 225 г/л) Ариста Лайф Сайенс Грейт Британ Лтд., Великобритания 09.07.2035 г.	1,5–2,5	Хлопчатник	Корневая гниль, гоммоз	Протравливание семян суспензией препарата (16 литров воды на 1 тонну семян)
	0,8-1,5	Рис	Пирикулярриоз, корневые гнили, гельминтоспориоз, бактериоз	Протравливание семян суспензией препарата (10 литров воды на 1 тонну семян)
	1,0–2,0	Чечевица	Корневые гнили, аскохитоз, фузариоз	
	1,0–1,5	Ячмень яровой	Пыльная, каменная, корневые гнили, плесневение семян	
	0,7–1,5	Пшеница яровая	Пыльная и твердая головня, септориоз, плесневение семян, фузариозная и другие корневые гнили	Протравливание семян суспензией препарата (5–7 литров воды на 1 тонну семян)
	0,7–1,5	Лен	Антракноз, аскохитоз	

Ипродион + имidakлоприд + дифеноконазол

ИДИКУМ, с.к. (133 г/л + 100 г/л + 6,7 г/л) АО Фирма «Август» 13.07.2032 г.	3,0-4,5	Картофель	Колорадский жук, тли, проволочники, ризоктониоз	Обработка дна борозды и клубней во время посадки. Расход рабочей жидкости 50-150 л/га
20.06.2032 г.	4,0-4,5	Картофель	Колорадский жук, тли, проволочники, ризоктониоз	Обработка дна борозды и клубней во время посадки. Расход рабочей жидкости - 50-150 л/га

Карбендазим

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 500 г/л				
КАРДОН, к.с. (500 г/л) ООО «Форвард», Россия 27.05.2029 г.	1,0-1,5	Пшеница яровая	Пыльная головня, твердая головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян. Расход рабочей жидкости 10 л/т
КЕРБЕН 500, к.с. (500 г/л) ТОО «Agro Mark Kaz» 01.03.2033 г.	2,0-2,5	Соя	Плесневение семян, аскохитоз, фузариоз, антракноз, серая гниль	Протравливание семян суспензией препарата (5-10 л воды на 1 т семян)
	2,0-2,5	Рис	Фузариозная корневая гниль, пирикулярриоз	Протравливание семян суспензией препарата (5-8 л воды на 1 т семян)
	2,0-2,5	Рапс	Корневые гнили	
КРЕДО, с.к. (500 г/л) АО Фирма «Август» 26.05.2030 г.	2-2,5	Соя, горох, нут	Плесневение семян, аскохитоз, фузариоз, антракноз	Протравливание семян. Расход рабочей жидкости – до 10 л/т
	2-2,5	Чечевица	Аскохитоз, корневые гнили, плесневение семян, фузариоз, антракноз	
	2-2,5	Лен масличный	Антракноз, фузариоз, пасмо, плесневение семян	

Карбоксин + тирам

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 170 г/л + 170 г/л				
ВИКИНГ, в.с.к (170 г/л + 170 г/л) ЛейтонАгрио Европа Кфт., Венгрия 14.03.2027 г	2,0	Пшеница и ячмень яровые	Твердая, пыльная, каменная головня, плесневение семян, корневые гнили	Протравливание семян суспензией препарата (10 л на 1 т семян)
ВИТАКС, в.с.к. (170 г/л + 170 г/л) ТОО «Астана-Нан» 02.10.2030 г.	1,5-2,0	Пшеница яровая	Пыльная и твердая головня, корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян суспензией препарата перед посевом (10 л воды на 1 т семян)
	1,5-2,0	Ячмень яровой	Пыльная, каменная, черная головня, корневые гнили, плесневение семян	
	1,5-2,0	Лен-долгунец	Антракноз	
	4,0	Рапс	Корневые гнили	
КАРБОКС 340, в.с.к. (17% + 17%) ТОО «Agro Mark Kaz» 06.03.2033 г.	1,5-2,0	Пшеница яровая и озимая	Пыльная, твердая головня, корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян суспензией препарата (10 л воды на 1 т семян)
	1,5-2,0	Ячмень яровой	Пыльная, черная и каменная головня, корневые гнили, плесневение семян	
	2,0-3,0	Кукуруза	Пыльная, пузырчатая головня, корневые гнили, плесневение семян	
	2,5-3,0	Просо, овес	Головневые болезни, корневые гнили	
	1,5-2,0	Лен долгунец	Антракноз, крапчатость	Протравливание семян суспензией препарата (3-5 л воды на 1 т семян)
	4,0	Хлопчатник	Корневые гнили, гоммоз	Протравливание семян суспензией препарата (16 л воды на 1 т семян)
ВИТАВАКС 200 ФФ, 34%, в.с.к. (170 г/л+170 г/л) Arysta Life Science Great Britain Ltd 13.07.2033	1,5-2,3	Лен	Антракноз, крапчатность, аскохитоз	Протравливание семян суспензией препарата (5-7 л воды на 1т семян)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 198,6 г/л + 198,6 г/л				
ВИТАРОС, в.с.к. (198,6 г/л + 198,6 г/л)	2,0	Пшеница яровая	Пыльная и твердая головня, плесневение семян, корневые гнили	Протравливание семян суспензией препарата (10 л воды на 1 т семян)

АО Фирма «Август» 27.12.2032 г.	2,0-2,5	Пшеница озимая	Твердая, пыльная, карликовая головня, плесневение семян, корневые гнили	Протравливание семян заблаговременно или перед посевом суспензией препарата (8-10 л воды на 1 т семян)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 340 г/л + 340 г/л				
ВИТО ПАУЭР, в.с.к. (340 г/л + 340 г/л) “Траст Кроп Протекшн Технологи Ко, Лтд”, Китай 31.01.2030 г.	0,75-1,0	Пшеница яровая	Пыльная и твердая головня, корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян суспензией препарата (10 л воды на 1 т семян)
	0,75-1,0	Ячмень яровой	Пыльная, каменная, черная головня, корневые гнили, плесневение семян	
	0,75-1,0	Лен	Антракноз, крапчатость	Протравливание семян суспензией препарата (3-5 л воды на 1 т семян)
	1,0-1,25	Рапс	Корневые гнили, альтернариоз	Протравливание семян суспензией препарата (8-10 л воды на 1 т семян)

Клотианидин

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 600 г/л				
Борец, к.с. (600 г/л) ЛЕЙТОН АГРИО ЕВРОПА КФТ 15.07.2036 г.	0,2-0,25	Ячмень яровой	Хлебные блошки	Протравливание семян суспензией препарата. Расход рабочей жидкости – 10 л/т.
	0,2-0,25	Пшеница яровая	Пшеничный трипс, хлебные блошки	Протравливание семян суспензией препарата. Расход рабочей жидкости – 10 л/т.
ГАРД, к.с. (600 г/л) ТОО «EcoSave» 17.04.2036 г.	0,2	Пшеница яровая	Блошки, трипсы, комплекс почвенных вредителей, (проволочники, ложнопроволочники)	Обработка семян суспензией препарата. Расход рабочей жидкости: 10 литров воды на 1 тонну семян
КАЛИБР, к.с. (600 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия 01.03.2027 г	3,0-5,0	Рапс	Комплекс почвенных вредителей, крестоцветная блошка	Протравливание семян суспензией препарата (10 л воды на 1 т семян)
18.04.2029 г.	0,2-0,25	Пшеница яровая	Пшеничный трипс, хлебные блошки	Протравливание семян суспензией препарата. Расход рабочей жидкости – 10 л/т
	0,2-0,25	Ячмень яровой	Хлебные блошки	
	0,6-0,8	Лен масличный	Трипсы, блошки	
	0,3-0,35	Чечевица	Блошки, тли	
Люксор, к.с. (600 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия 03.02.2035 г.	3-5	Рапс	Крестоцветные блошки, капустная белянка, тли, скрытнохоботник, комплекс почвенных вредителей (проволочники, ложнопроволочники)	Протравливание семян суспензией препарата. Расход рабочей жидкости 10 л/т.
	0,2-0,25	Пшеница яровая	Пшеничный трипс, хлебные блошки, гессенская муха, почвенные вредители (проволочники, ложнопроволочники)	
	0,2-0,25	Ячмень яровой	Блошки, шведская муха, почвенные вредители (проволочники, ложнопроволочники)	
	0,6-0,8	Лён масличный	Льняной трипс, льняная блошка, комплекс почвенных вредителей (проволочники, ложнопроволочники)	
	3-5	Подсолнечник	Почвенные вредители (проволочники, ложнопроволочники), тли, трипсы	
ПОНЧО, к.с. (600 г/л) BASF CORPORATION, США, 13.04.2033 г.	4,5-6,0	Подсолнечник	Комплекс почвенных вредителей, тли	Протравливание семян
	3,0-3,5	Кукуруза	Комплекс почвенных вредителей, тли, трипсы	

Клотианидин + бета-цифлутрин

МОДЕСТО, 48%, к.с. (400 г/л + 80 г/л) Байер Кроп Сайенс АГ, Германия 18.02.2029 г	12,5	Рапс	Крестоцветные блошки, капустная белянка, скрытнохоботник	Протравливание семян суспензией препарата непосредственно перед посевом
---	------	------	--	---

Клотианидин + пенцикурон

Фердинанд 2,0, к.с. (73 г/л + 150 г/л) Синтезия Кеми Гмбх, Германия 29.07.2031 г.	0,7-1,0	Картофель	Проволочники, колорадский жук, тли-переносчики вирусов, ризоктониоз, парша обыкновенная	Обработка клубней до или во время посадки
---	---------	-----------	---	---

Клотианидин + тиабендазол + тебуконазол

НАГАЙНА, к.с. (390 г/л + 40 г/л + 30 г/л) Представительство ООО «Агро Эксперт Групп» в РК 27.12.2032 г.	0,8-1,0	Ячмень яровой	Пыльная головня, каменная головня, корневые гнили (в т.ч. гелиминтоспориозная и фузариозная), сетчатая пятнистость, плесневение семян (в т.ч. альтернариозная семенная инфекция), хлебные блошки, злаковые мухи	Протравливание семян заблаговременно или перед посевом. Расход рабочей жидкости – 10 л/т.
	0,8-1,0	Пшеница яровая	Пыльная головня, твердая головня, корневые гнили (в т.ч. гелиминтоспориозная и фузариозная), плесневение семян (в т.ч. альтернариозная семенная инфекция), септориоз, хлебные блошки, злаковые мухи	

Клотианидин + флуопиколоид + флуоксастробин

МОДЕСТО ПЛЮС, к.с. (300 г/л + 120 г/л + 90 г/л) ТОО «Байер КАЗ» 23.07.2029 г.	8,4-12,6	Подсолнечник	Альтернариоз, корневые гнили, фомоз, фомопсис, серая гниль, плесневение семян, почвообитающие вредители (долгоносики, проволочники, ложнопроволочники)	Протравливание(семян суспензией препарата (расход рабочей жидкости до 25 л/т семян (включая расход препарата)
---	----------	--------------	--	--

23.02.2034 г.	16,6	Рапс	Крестоцветные блошки, комплекс почвенных вредителей, плесневение семян, альтернариоз	Протравливание семян суспензией препарата
---------------	------	------	--	---

Клотианидин + флутриафол + флудиоксонил

ЭЛАТОС, к.с. (410 г/л + 50 г/л + 50 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия 12.04.2029 г.	1,0	Чечевица	Блошки, тли	Протравливание семян суспензией препарата. Расход рабочей жидкости – 10 л/т
	0,2 л/т	Картофель	Проволочники, колорадский жук, тли-переносчики вирусов, ризоктониоз, фитофтороз, виды парши	Обработка клубней до или во время посадки

Клотианидин + флутриафол + дифеноконазол

МИРАЖ, к.с. (433 г/л + 90 г/л + 27 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия 06.02.2036 г.	0,3 - 0,35	Горох	Аскохитоз, фузариоз, серая гниль, плесневение семян, клубеньковые долгоносики, почвенные вредители (проволочники, ложнопроволочники)	Протравливание семян суспензией препарата. Расход рабочей жидкости – 10 л/т.
	0,3 - 0,35	Чечевица	Аскохитоз, фузариоз, серая гниль, плесневение семян, клубеньковые долгоносики, почвенные вредители (проволочники, ложнопроволочники)	Протравливание семян суспензией препарата. Расход рабочей жидкости – 10 л/т.
	0,3 - 0,35	Лён масличный	Корневые гнили, фузариоз, антракноз, аскохитоз, трипсы, блошка, почвенные вредители (проволочники, ложнопроволочники)	Протравливание семян суспензией препарата. Расход рабочей жидкости – 10 л/т.
	0,3	Ячмень яровой	Пыльная, каменная головня, плесневение семян, корневые гнили, блошки, почвенные вредители (проволочники, ложнопроволочники)	Протравливание семян суспензией препарата. Расход рабочей жидкости – 10 л/т.
	0,3	Пшеница яровая	Твердая, пыльная головня, плесневение семян, корневые гнили, блошки, пшеничный	Протравливание семян суспензией препарата. Расход рабочей жидкости – 10 л/т.

Клотианидин + имидаклоприд + флутриафол + боскалид + ципроконазол

АРТЕМИС, к.с. (228 г/л + 114 г/л + 100 г/л + 48 г/л + 8,5 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия 02.02.2036 г.	0,4	Ячмень яровой	Каменная, пыльная головня, плесневение семян, корневые гнили, блошки, шведская муха, почвенные вредители (проволочники, ложнопроволочники)	Протравливание семян суспензией препарата (10 л воды на 1 тонну семян)
	0,4	Пшеница яровая	Твердая, пыльная головня, плесневение семян, корневые гнили, блошки, пшеничный трипс, почвенные вредители (проволочники, ложнопроволочники)	

Мефеноксам

АПРОН XL350, в.э. (350 г/л) Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария 22.09.2030 г.	3,0	Подсолнечник	Альтернариоз, корневые гнили	Протравливание семян. Расход рабочей жидкости 10-12 л/т
--	-----	--------------	------------------------------	---

Мефеноксам + тебуконазол

Концентрация д.в. (+/- 5%) ~ 20 г/л + 30 г/л				
СЕРТИКОР 050, к.с. (20 г/л + 30 г/л) Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария 07.02.2030 г.	0,75-1,0	Пшеница и ячмень яровые	Пыльная, твердая, каменная головня, плесневение семян, корневая гниль	Протравливание семян суспензией препарата (10 л воды на 1 т семян)
Концентрация д.в. (+/- 5%) ~ 60 г/л + 60 г/л				
ЭЛИРЕН к.с. (60 г/л + 60 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-3 03.07.2034 г.	0,4	Пшеница	Пыльная, твердая головня, плесневение семян, корневые гнили	Протравливание семян непосредственно перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости – 10 л/т
	0,4	Ячмень яровой	Пыльная, каменная головня, плесневение семян, корневые гнили	

Оксатиапипролин

Люмисена, т.к.с. (200 г/л) ТОО «Кортева Агрисаенс Казахстан» 07.08.2036 г.	0,65-1,25-1,75	Подсолнечник	Пероноспороз	Обработка семян (9,37-18,75 мкг дв/семя). Расход рабочей жидкости 10 л/т семян
--	----------------	--------------	--------------	--

Пенфлуфен + клотианидин

Концентрация д.в. (+/- 5%) ~ 66,5 г/л + 207 г/л				
Ньюкиллер, к.с. (66,5 г/л + 207 г/л) ТОО «Астана-Нан» 14.01.2035 г.	0,3-0,35	Картофель	Проволочники, колорадский жук, тли-переносчики вирусов, ризоктониоз, парша серебристая, обыкновенная	Обработка клубней до или во время посадки
ЭМЕСТО КВАНТУМ, к.с. (66,5 г/л + 207 г/л) ТОО «Байер КАЗ» 23.02.2034 г.	0,3-0,35	Картофель	Проволочники, колорадский жук, тли-переносчики вирусов, ризоктониоз, парша серебристая, обыкновенная	Обработка клубней до или во время посадки

Пенцикурон + имидаклоприд

АВТОРИТЕТ, к.с. (150 г/л + 140 г/л) ТОО «Астана-Нан» 14.12.2031 г	0,7-1,0	Подсолнечник, рапс	Проволочники, ризоктониоз, парша обыкновенная	Протравливание семян
	0,7-1,0	Картофель	Проволочники, колорадский жук, картофельная тля, ризоктониоз, парша обыкновенная	Обработка клубней до посадки

	0,1 л/кг	Лук репчатый (из семян)	Луковая муха, табачный трипс	Протравливание семян
--	----------	-------------------------	------------------------------	----------------------

Пираклостробин + металаксил + флутриафол

КРОНОС, к.с. (47 г/л + 93 г/л + 105 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия 29.05.2030 г.	0,2	Пшеница яровая	Твердая, пыльная головня, плесневение семян, корневые гнили	Протравливание семян суспензией препарата. Расход рабочей жидкости 10 л/т
	0,2	Ячмень яровой	Пыльная, каменная головня, плесневение семян, корневые гнили	
	0,25	Чечевица	Корневые гнили, антракноз, аскохитоз	
	0,25	Лен	Корневые гнили, фузариоз, антракноз	

Протиоконазол + тебуконазол

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 107 г/л+73 г/л				
ЭРИДА к.с. (107 г/л+73 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия 09.02.2034	0,3	Пшеница яровая, ячмень яровой	Пыльная, твердая, каменная головня, плесневение семян, корневые гнили	Протравливание семян непосредственно перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости – 5-10 л/т
	0,3–0,35	Лен масличный	Антракноз, фузариоз, плесневение семян	
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 150 г/л + 20 г/л				
РЕДИГО ПРО, к.с. (150 г/л + 20 г/л) ОО «Байер КАЗ» 25.07.2029 г.	0,35-0,55	Соя	Корневые гнили, аскохитоз, плесневение семян	Протравливание семян суспензией препарата (расход рабочей жидкости 3-5 л/тону семян)
	0,35-0,55	Кукуруза	Пыльная, пузырчатая головня, плесневение семян	
	0,35-0,55	Нут	Корневые гнили, аскохитоз, плесневение семян, фузариоз	
15.04.2031 г.	0,35-0,45	Пшеница яровая	Твердая, пыльная головня, корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян суспензией препарата (10 л на 1 т семян)
	0,35-0,45	Ячмень яровой	Пыльная, каменная головня, корневые гнили, плесневение семян	
23.02.2034	0,35-0,45	Пшеница озимая	Твердая, пыльная головня, корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян суспензией препарата (10 л на 1 т семян)
	0,35-0,45	Лен	Антракноз	
	0,35-0,45	Горох	Аскохитоз, фузариоз, серая гниль, плесневение семян	Протравливание семян суспензией препарата (5-10 л на 1 т семян)
Исадор, к.с. (150 г/л + 20 г/л) AGROBEST GRUP 25.12.2035 г.	0,35-0,45	Лен	Антракноз	Протравливание семян суспензией препарата (10 л на 1 т семян)
	0,35-0,45	Ячмень яровой	Каменная, пыльная головня, корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян суспензией препарата (10 л на 1 т семян)
	0,35 -0,45	Пшеница яровая Пшеница озимая	Твердая, пыльная головня, корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян суспензией препарата (10 л на 1 т семян)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 250 г/л + 150 г/л				
АТЛАС ПРО, к.с. (250 г/л + 150 г/л) ОО «QADAM Group (КАДАМ Групп)» 07.09.2032 г.	0,12-0,15	Лен	Антракноз	Протравливание семян суспензией препарата (10 л на 1 т)
	0,12-0,15	Пшеница и ячмень яровые	Твердая, пыльная, каменная головня, плесневения семян, корневая гниль	
ЛАМАДОР, к.с. (250 г/л + 150 г/л) ОО «Байер КАЗ» 22.02.2027 г.	0,12-0,15	Пшеница озимая	Твердая, пыльная, каменная головня, плесневение семян, снежная плесень	Протравливание семян суспензией препарата (10 л воды на 1 т семян)
23.02.2034 г.	0,12-0,15	Лен	Антракноз	
МАТАДОР, к.с. (250 г/л + 150 г/л) ОО «Айбад-2015» РК 11.06.2031 г.	0,12-0,15	Пшеница яровая	Твердая и пыльная головня, фузариозная, гельминтоспориозная и ризоктониозная корневые гнили, септориоз, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом. Расход рабочей жидкости 10 л/т.
	0,12-0,15	Ячмень яровой	Пыльная головня, каменная головня, ложная каменная головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, сетчатая пятнистость, плесневение семян	
	0,12-0,15	Лен	Антракноз	
ПРОТЕОР, к.с. (250 г/л + 150 г/л) SHANDONG BINNONG TECHNOLOGY CO., LTD. 06.01.2036 г.	0,12-0,15	Пшеница яровая	Твердая, пыльная головня, корневые гнили, септориоз, плесневение семян	Протравливание семян суспензией препарата перед посевом. Расход рабочей жидкости 10 л/т.
	0,12-0,15	Ячмень яровой	Пыльная, каменная головня, корневые гнили, сетчатая пятнистость, плесневение семян	

Протиоконазол + тебуконазол+ флуопирам

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 100г/л+60 г/л+20 г/л				
Ламадор Про, к.с. (100г/л+60 г/л+20 г/л) ОО «Байер КА3» 27.03.2036 г.	0,4-0,5	овес	Пыльная головня, покрытая головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян, альтернариоз, красно-бурая пятнистость	Протравление семян перед посевом. Расход рабочей жидкости: 10 л/т.
	0,4-0,5	ячмень яровой	Каменная головня, пыльная головня, ложная пыльная головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, ризоктониозная прикорневая гниль, плесневение семян, альтернариоз, сетчатая пятнистость	
	0,3-0,5	лен	Фузариоз, антракноз, плесневение семян	
	0,3-0,5	Пшеница яровая и озимая	Твердая головня, пыльная головня,	

			фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, ризиктониозная прикорневая гниль, плесневение семян, септориоз, альтернариоз	
--	--	--	--	--

Протиоконазол+ азоксистробин + флутриафол

АКСИОН к.с. (40 г/л + 40 г/л + 90 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия 23.06.2033 г.	0,4	Соя, чечевица, горох	Аскохитоз, фузариоз, серая гниль, плесневение семян	Протравливание семян суспензией препарата (10 л на 1 т семян)
	0,35	Ячмень яровой	Пыльная, каменная головня, плесневение семян, корневые гнили	
	0,35	Пшеница яровая	Твердая, пыльная головня, плесневение семян, корневые гнили	

Пираклостробин + тритиконазол

СПОРХАНТЕР, 12 % к.с. (40 г/л + 80 г/л) ТОО «А.С.К. Technik» (А.С.К.Техник) 12.03.2029 г.	0,3-0,4	Пшеница и ячмень яровые	Твердая, пыльная, каменная головня, плесневение семян, корневые гнили улучшение засухо- морозоустойчивости	Протравливание семян суспензией препарата (8-10 л воды на 1 т семян)
---	---------	-------------------------	---	--

Протиоконазол + тебуконазол

ТИАМАТ, к.с. (250 г/л + 150 г/л) Жэджянг Жонгшан Кемикал Индастри Групп Ко, Лтд, Китай 27.02.2030 г.	0,12-0,15	Пшеница и ячмень яровые	Твердая, пыльная головня, плесневение семян, корневая гниль	Протравливание семян суспензией препарата (10 л воды на 1 т семян)
--	-----------	-------------------------	---	--

Прохлораз + тиабендазол + ципроконазол

ВИАЛ ТРИО, в.с.к. (120 г/л + 30 г/л + 5 г/л) АО Фирма «Август» 22.04.2030 г.	0,8-1,2	Пшеница яровая	Твердая головня, пыльная головня, фузариозные и гельминтоспориозные корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян суспензией препарата. Расход рабочей жидкости-10 л/т
	0,8-1,2	Ячмень яровой	Каменная головня, пыльная головня, фузариозные и гельминтоспориозные корневые гнили, плесневение семян	

Прохлораз + тритиконазол

ХАЙП к.с. (60 г/л + 20 г/л) Представительство ООО «Агро Эксперт Групп» в РК 30.05.2032 г.	1,5-2,0	Ячмень яровой	Пыльная головня, каменная головня , корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян заблаговременно или перед посевом. Расход рабочей жидкости-10 л/т
	1,5-2,0	Пшеница яровая	Пыльная головня, твердая головня, корневые гнили, плесневение семян, септориоз	

Тебуконазол

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 60 г/л				
БАРЬЕР, 6% в.р.к. (60 г/л) ТОО «Агро Глобал» 24.10.2026 г.	0,4	Пшеница яровая	Твердая, пыльная, головня, плесневение семян, корневые гнили	Протравливание семян суспензией препарата (10 л воды на 1 т семян)
БУНКЕР, в.с.к. (60 г/л) АО Фирма «Август» 29.01.2029 г.	0,4-0,5	Лен масличный	Антракноз, крапчатость	Протравливание семян перед посевом. Расход рабочей жидкости 5-10 л/т
27.12.2032 г.	0,4	Пшеница яровая	Пыльная и твердая головня, корневые гнили, плесневение семян,	Протравливание семян суспензией препарата (10 л воды на 1 т семян)
	0,4	Ячмень яровой	Пыльная и каменная головня, корневые гнили, плесневение семян	
ГЕНСИЛ 060, в.р. (60 г/л) AGROBEST GRUP, Турция 17.02.2030 г.	0,4	Пшеница и ячмень яровые	Пыльная, твердая, каменная головня, плесневение семян, корневая гниль	Протравливание семян суспензией препарата (10 л воды на 1 т семян)
Маниту, к.с. (60 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия 21.01.2035 г.	0,4	Ячмень яровой	Пыльная, каменная головня , плесневение семян, корневые гнили	Протравливание семян непосредственно перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости 10 л/т.
	0,4	Пшеница яровая	Пыльная, твердая головня, плесневение семян, корневые гнили	
РАКСАЛ-АЛТ, к.с. (60 г/л) ООО Резерв, Россия 11.07.2027 г.	0,4-0,5	Пшеница и ячмень яровые	Твердая, пыльная, каменная головня, плесневение семян, корневые гнили	Протравливание семян суспензией препарата. Расход рабочей жидкости 10 л/т.
РАКСОН, к.с. (60 г/л) ООО «Агро Эксперт Групп», Россия 01.02.2028 г. 19.08.2029 г.	0,4	Пшеница яровая	Пыльная, твердая головня, корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян суспензией препарата (10 л воды на 1 т семян)
	0,4	Ячмень яровой	Пыльная, каменная головня, корневые гнили, плесневение семян	
	0,5	Лен	Крапчатость, антракноз	
	0,4	Озимая пшеница	Пыльная, твердая головня, корневые гнили, плесневение семян	
РЕКСОЛ, 6% к.с. (60 г/л) Лейтон Агрио Европа КФТ Венгрия 23.02.2036 г.	0,4	Пшеница и ячмень яровые	Твердая, пыльная, каменная головня, плесневение семян, корневые гнили	Протравливание семян суспензией препарата (10 л воды на 1 т семян)
САБАКТАС, 6% в.р.к. (60 г/л) Моер Кемсайенс Ко. Лтд., Китай 10.12.2028 г.	0,4	Пшеница и ячмень яровые, пшеница озимая	Пыльная, твердая, каменная головня, плесневение семян, корневая гниль	Протравливание семян суспензией препарата (10 л воды на 1 т семян)
ТЕБУ 60, м.э. (60 г/л) АО «Щелково Агрохим»	0,4	Пшеница яровая	Твердая, пыльная головня, плесневение семян, корневые гнили	Протравливание семян суспензией препарата (10 л воды на 1 т семян)

06.11.2035 г.	0,4	Лен	Антракноз, крапчатость	Протравливание семян. Расход рабочей жидкости 5 л/т
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 120 г/л				
Раназол Ультра, т.к.с. (120 г/л) Лейтон Агрио Европа КФТ Венгрия 31.01.2035 г.	0,2-0,25	Лён	Антракноз, крапчатость	Протравливание семян перед посевом. Расход рабочей жидкости 5-10 л/т
	0,2	Пшеница яровая, ячмень яровой	Корневые гнили, плесневение семян	
РАКСИЛ УЛЬТРА, к.с. (120 г/л) Байер КропСайенс АГ, Германия 22.02.2027 г.	0,2	Пшеница озимая	Твердая, пыльная, каменная головня, плесневение семян, снежная плесень	Протравливание семян суспензией препарата (10 л воды на 1 т семян)
СИЛА ПЛЮС, к.с. (120 г/л) ТОО «Агро-Хим- Лидер» 12.02.2029 г.	0,2	Пшеница и ячмень яровые	Виды головни, плесневение семян, корневые гнили	Протравливание семян суспензией препарата (10 л воды на 1 тонну семян)
ТЕБУСИЛ, к.с. (120 г/л) ТОО «Достык-Агро 2012» 04.05.2031 г.	0,2	Пшеница яровая	Твердая, пыльная головня, плесневение семян, корневые гнили	Протравление семян суспензией препарата (10 л воды на 1 т. Семян)
	0,2	Ячмень яровой	Твердая, пыльная, каменная головня, плесневение семян, корневые гнили	
ТЕНАЗОЛ УЛЬТРА, к.с. (120 г/л) ТОО «Аgro Mark Kaz» 06.01.2031 г.	0,2	Пшеница и ячмень яровые	Пыльная, твердая, каменная головня, корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян суспензией препарата
	0,2	Пшеница озимая	Твердая, пыльная головня, плесневение семян, гельминтоспориозная и фузариозная гнили, снежная плесень	
ШАНСИЛ УЛЬТРА, к.э (120 г/л) ООО «Шанс» 28.03.2029 г.	0,2-0,25	Пшеница яровая	Твердая головня, пыльная головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом. Расход рабочей жидкости 10 л/т
	0,2-0,25	Ячмень яровой	Каменная головня, пыльная головня, ложная пыльная головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, сетчатая пятнистость, плесневение семян	
	0,2-0,25	Овес	Пыльная головня, покрытая головня, плесневение семян, красно-бурая пятнистость	
30.12.2030 г.	0,2-0,25	Пшеница озимая	Твердая головня, пыльная головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян септориоз,	Протравливание семян перед посевом. Расход рабочей жидкости 10 л/т
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 150 г/л				
РЭКСИЛ ГОЛД ПЛЮС к.с (150 г/л) ТОО «GOOD JOB INDUSTRY KAZAKHSTAN» («ГУД ДЖОБ ИНДАСТРИ КАЗАХСТАН») П-3 07.11.2033 г.	0,13-0,18	Ячмень яровой	Пыльная головня, каменная головня, ложная пыльная головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, сетчатая пятнистость, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом. Расход рабочей жидкости 10 л/ т
		Пшеница яровая	Твердая и пыльная головня, фузариозная, гельминтоспориозная и ризоктониозная корневые гнили, септориоз, плесневение семян	
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 240 г/л				
Грейсон Про, т.к.с. (250 г/л) ФОРВАРД 23.01.2036 г.	0,1	Лен долгунец и масличный	Антракноз, крапчатость	Протравливание семян перед посевом. Расход рабочей жидкости - 10 л/т
	0,1	Овес	Пыльная головня, покрытая головня, красно-бурая пятнистость, плесневение семян	
	0,1	Ячмень яровой	Каменная (твердая) головня, пыльная головня, ложная пыльная головня, корневые и прикорневые гнили, сетчатая пятнистость, плесневение семян	
	0,1	Пшеница яровая	Пыльная головня, твердая (каменная) головня, корневые и прикорневые гнили, септориоз, плесневение семян	
РЕКСОЛ СУПЕР к.с. (240 г/л) ARCUS INVEST HOLDING B.V. 10.10.2032 г.	0,1	Ячмень яровой	Пыльная и каменная головня, плесневение семян, корневые гнили	Протравливание семян суспензией препарата (10 л на 1 т семян)
	0,1	Пшеница яровая	Пыльная, твердая, каменная головня, плесневение семян, корневые гнили	
СИТИЗЕН, 24% к.с. (240 г/л) Наньцзин Эссенс Файн- Кемикал Со., Лтд, Китай 08.01.2034 г.	0,1	Пшеница яровая и озимая	Пыльная головня, плесневение семян, корневые гнили	Протравливание семян суспензией препарата (10 л воды на 1 т семян)
	0,1	Ячмень яровой	Пыльная и каменная головня, корневые гнили, плесневение семян	
СИЗАМ, к.с. (250 г/л) ТОО «QADAM Group (КАДАМ Групп)» 05.01.2036 г.	0,1	Пшеница яровая и ячмень	Пыльная и твердая головня, плесневение семян, корневые гнили	Протравливание семян суспензией препарата (10 л воды на 1 т семян)
ROST SUPER к.с. (240 г/л) ТОО «Farm Agrochemical Products» 27.05.2034 г.	0,1	Ячмень яровой	Пыльная и каменная головня, плесневение семян, корневые гнили.	Протравливание семян суспензией препарата. (10л воды на 1 тонну семян)
	0,1	Пшеница яровая	Пыльная головня, плесневение семян, корневые гнили.	

Тебуконазол + имазалил

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 60 г/л + 100 г/л				
Вилем, к.э. (60 г/л + 100 г/л) ФОРВАРД 11.02.2036 г.	0,4	Нут	Корневые и прикорневые гнили, аскохитоз, фузариоз, плесневение семян	Протравливание семян. Расход рабочей жидкости 10 л/т
	0,4	Соя	Прикорневые гнили, аскохитоз, фузариоз, плесневение семян	Протравливание семян. Расход рабочей жидкости 10 л/т

	0,4	Просо	Корневые гнили, головня метелок, фузариозная семенная инфекция, плесневение семян	Протравливание семян. Расход рабочей жидкости 10 л/т
	0,4	Лен долгунец и масличный	Антракноз, крапчатость	Протравливание семян. Расход рабочей жидкости 5 -10 л/т
	0,3-0,4	Горох	Корневые гнили, фузариозное увядание, аскохитоз, плесневение семян	Протравливание семян. Расход рабочей жидкости 10 л/т
	0,4	Рапс яровой	Корневые гнили, пероноспороз, плесневение семян, альтернариоз	Протравливание семян. Расход рабочей жидкости 10 л/т
	0,4	Подсолнечник	Белая гниль (прикорневая форма), серая гниль (семенная инфекция), фузариозная корневая гниль, плесневение семян	Протравливание семян. Расход рабочей жидкости 10 л/т
	0,4	Кукуруза	Пузырчатая головня, пыльная головня, корневые гнили, фузариоз, плесневение семян и початков	Протравливание семян. Расход рабочей жидкости 10 л/т
	0,3-0,4	Овес	Твердая (покрытая) и пыльная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян, красно-бурая пятнистость	Протравливание семян. Расход рабочей жидкости 10 л/т
	0,3-0,4	Ячмень яровой	Пыльная головня, твердая (каменная) головня, корневые и прикорневые гнили, плесневение семян, сетчатая пятнистость	Протравливание семян. Расход рабочей жидкости 10 л/т
	0,3-0,4	Пшеница яровая	Пыльная головня, твердая (каменная) головня, корневые и прикорневые гнили, мучнистая роса, плесневение семян	Протравливание семян. Расход рабочей жидкости 10 л/т
СКАРЛЕТ, м.э. (60 г/л + 100 г/л) АО «Щелково Агрохим» 10.02.2027 г.	0,3-0,4	Пшеница яровая	Твердая, пыльная головня, плесневение семян, корневые гнили	Протравливание семян суспензией препарата (10 л воды на 1 т семян)
	0,4	Лен	Антракноз, крапчатость	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно
	0,4	Кукуруза	Пузырчатая головня, пыльная головня, фузариозные корневые и прикорневые гнили, фузариоз, плесневение семян и початков.	
	0,3-0,4	Ячмень	Пыльная головня, гнили, плесневение семян, сетчатая пятнистость.	
	0,3-0,4	Сафлор	Гнили, плесневение семян	
	0,3-0,4	Чечевица	Корневые гнили, аскохитоз, плесневение семян, антракноз.	
17.03.2031 г.	0,3-0,4	Пшеница озимая	Твердая, пыльная головня, корневые гнили, мучнистая роса, снежная плесень, плесневение семян	Протравливание семян. Расход рабочей жидкости 10 л/т

Тебуконазол + клотианидин

АРНЕЙС, к.с. (60 г/л + 150 г/л) Синтезия Кеми ГмБХ, Германия, 19.04.2032 г.	0,4	Пшеница яровая	Пыльная головня, плесневение семян, корневые гнили, блошки, пшеничный трипс, почвенные вредители(проволочники, ложнопроволочники)	Протравливание семян суспензией препарата. Расход рабочей жидкости 10 л/т
	0,4	Ячмень яровой	Пыльная головня, плесневение семян, корневые гнили, блошки, почвенные вредители (проволочники, ложнопроволочники)	

Тебуконазол + тиаметоксам + клотианидин,

КРОСС, к.с. (80 г/л + 187 г/л+187 г/л) Синтезия Кеми ГмБХ, Германия, 23.12.2034 г	0,3	Лен масличный	Корневые гнили, фузариоз, антракноз, аскохитоз, трипсы, блошка, почвенные вредители (проволочники, ложнопроволочники)	Протравливание семян суспензией препарата (10 л воды на 1 тонну семян)
	0,3	Ячмень яровой	Каменная, пыльная головня, плесневение семян, корневые гнили, блошки, шведская муха, почвенные вредители (проволочники, ложнопроволочники)	
	0,3	Пшеница озимая	Твердая, пыльная головня, плесневение семян, корневые гнили, блошки, гессенская муха, пшеничный трипс, почвенные вредители (проволочники, ложнопроволочники)	
	0,3	Пшеница яровая	Твердая, пыльная головня, плесневение семян, корневые гнили, блошки, гессенская муха, пшеничный трипс, почвенные вредители (проволочники, ложнопроволочники)	

Тебуконазол + прохлораз

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 15 г/л + 60 г/л				
ОРИУС УНИВЕРСАЛ ES, э.с. (15 г/л + 60 г/л) Адама Агрикалчер Б.В., Нидерланды 01.03.2031 г.	1,75-2.0	Пшеница яровая, ячмень яровой	Корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян суспензией препарата
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 50 г/л + 250 г/л				
ПРОТЕКТ, к.с. (50 г/л + 250 г/л) Синтезия Кеми ГмБХ, Германия 02.08.2031 г.	0,4	Пшеница яровая, ячмень яровой	Твердая, пыльная, каменная головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян суспензией препарата (10 л воды на 1 т семян)
ФЛАМИНГО, к.с. (50 г/л + 250 г/л) Юнайтед Агри-Кемикал Компани ГмБХ, Швейцария 12.04.2031 г.	0,4	Пшеница яровая, ячмень яровой	Твердая, пыльная, каменная головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян	

Тебуконазол + пираклостробин

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 60 г/л + 40 г/л				
ТЕНАЗОЛ СУПЕР, к.с. (60 г/л + 40 г/л) ТОО «Agro Mark Kaz» 17.02.2027 г	0,4-0,5	Пшеница яровая	Твердая, пыльная головня, корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян суспензией препарата. Расход рабочей жидкости-10 л/т
	0,4-0,5	Ячмень яровой	Пыльная головня, корневые гнили, плесневение семян	
	0,5	Лен	Антракноз	

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 60 г/л + 50 г/л				
ФЛАГМАН, к.с. (60 г/л + 50 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия 05.09.2033 г.	0,4	Ячмень яровой	Пыльная, каменная головня , плесневение семян, корневые гнили	Протравливание семян непосредственно перед посевом или заблаговременно(до 1 года). Расход рабочей жидкости –10 л/т
	0,4	Пшеница яровая	Пыльная, твердая головня, плесневение семян, корневые гнили	
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 80 г/л + 40 г/л				
РАПТОРА 12%, к.с. (80 г/л+40 г/л) Филиал "Hangzhou Ruijiang Crop Science Co.,Ltd., Казахстан" "Hangzhou Ruijiang Crop Science Co., Ltd.,Китай" в городе Алматы П-3 03.02.2035 г.	0,3-0,4	Пшеница и ячмень яровые	Твердая, пыльная головня, корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости 10 л/ т
	0,4	Лен масличный	Корневые гнили, антракноз	
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 120 г/л + 80 г/л				
Ситизен Про, к.с. (120 г/л+80 г/л) НАНЬЦЗИН ЭССЕНС ФАЙН-КЕМИКАЛ КО. ЛТД П-3 30.04.2036 г.	0,2-0,4	Пшеница яровая	Твердая головня, пыльная головня, плесневение семян, корневые гнили, улучшение засухоустойчивости	Протравливание семян суспензией препарата (8–10 л воды на 1 т семян)
	0,2-0,4	Ячмень яровой	Твердая головня, пыльная головня, каменная головня, плесневение семян, корневые гнили, улучшение засухоустойчивости	

Тебуконазол + триадименол

ФРАЗОЛ, к.с. (60 г/л + 60 г/л) ООО «Франдеса», Беларусь 05.04.2029 г.	0,4-0,5	Пшеница яровая	Твердая головня, пыльная головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян. Расход рабочей жидкости– 10 л/т
---	---------	----------------	---	---

Тебуконазол + тиофанат-метил

ТОЛЕДО, к.с. (120 г/л + 480 г/л) Синтезия Кеми ГмБХ, Германия 31.01.2035 г.	0,2	Пшеница яровая	Твердая, пыльная головня, корневые гнили, плесневение семян, стимулирование роста и развития	Протравливание семян суспензией препарата. Расход рабочей жидкости 10 л/т.
	0,2	Ячмень яровой	Каменная, пыльная головня, корневые гнили, плесневение семян, стимулирование роста и развития	
	0,2	Лен	Корневые гнили, фузариоз, антракноз	

Тиабендазол + тебуконазол

ВИАЛ ТРАСТ, в.с.к. (80 г/л + 60 г/л) АО Фирма «Август» 16.09.2034 г.	0,3-0,4	Пшеница и ячмень яровые	Пыльная головня, плесневение семян, корневые гнили	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно(до 1 года). Расход рабочей жидкости- 10 л/т
	0,3-0,4	Подсолнечник	Белая и серая гнили	

Тиабендазол + тебуконазол + имазалил

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 80 г/л + 60 г/л + 60 г/л				
Клад к.с. (80 г/л + 60 г/л + 60 г/л) Представительство ООО «Агро Эксперт Групп» в РК 28.06.2032 г.	0,4-0,5	Ячмень яровой	Каменная и пыльная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян суспензией препарата заблаговременно или перед посевом. Расход рабочей жидкости-10 л/т
	0,4-0,5	Пшеница яровая	Твердая и пыльная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян, септориоз (на ранних фазах)	
	0,4-0,6	Рапс	Корневые гнили (в том числе фузариозная корневая гниль), альтернариоз, плесневение семян	Протравливание семян суспензией препарата заблаговременно или перед посевом. Расход рабочей жидкости-10-15 л/т.
ОПТИМУС, к.с. (80 г/л + 80 г/л + 60 г/л) ТОО «Агро Глобал» 08.01.2029 г.	0,4-0,5	Пшеница яровая	Твердая головня, пыльная головня, фузариозная и гельминтоспориозные корневые гнили, мучнистая роса, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости – 10 л/т
	0,4-0,5	Ячмень яровой	Каменная головня, пыльная головня, пыльная ложная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили сетчатая пятнистость, плесневение семян,	
ШАНСИЛ ТРИО, в.э. (60 г/л + 60 г/л + 40 г/л) ООО «Шанс» 15.03.2029 г.	0,4	Пшеница яровая	Твердая головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, септориоз, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости 10 л/т
	0,4-0,5	Пшеница яровая	Пыльная головня	
	0,4-0,5	Ячмень яровой	Каменная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, сетчатая пятнистость, плесневение семян	
	0,5	Ячмень яровой	Пыльная головня, ложная пыльная головня	
30.12.2030 г.	0,4	Пшеница озимая	Твердая головня, пыльная головня, фузариозная и гельминтоспориозные корневые гнили, септориоз, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости 10 л/т

Тиабендазол + флудиоксонил + мефеноксам + азоксистробин

Максим Кватро 382,5, к.с. (300 г/л + 37,5 г/л +30 г/л + 15) SYNGENTA CROP PROTECTION AG 04.02.2035 г.	1,0	Кукуруза	Пузырчатая головня, фузариозная корневая и прикорневая гнили, плесневение семян	Обработка семян перед посевом
---	-----	----------	---	-------------------------------

Тиаметоксам

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 350 г/л				
ИНСТИВО 350, к.с. (350 г/л) SYNGENTA CROP PROTECTION AG 04.03.2034 г.	0,4-0,7	Яровая пшеница и яровой ячмень	Блошки	Протравливание семян суспензией препарата. Расход рабочей жидкости 10 л/т семян
	0,5-0,7	Лен масличный	Блошки	Протравливание семян суспензией препарата
КАЙЗЕР, к.с. (350 г/л.) Лейтон Агрио Европ, КФТ, Венгрия	8,0-10,0	Рапс	Комплекс почвенных вредителей и вредителей всходов	Протравливание семян суспензией препарата. Расход рабочей жидкости 10 л/т
	6,0-10,0	Подсолнечник	Комплекс почвенных вредителей	

17.03.2032 г	0,4-0,5	Яровая пшеница	Клоп вредная черепашка, проволочники, трипсы	
	6,0-8,0	Горчица	Крестоцветные блошки, рапсовый цветоед	Протравливание семян суспензией препарата. Расход рабочей жидкости – 10-20 л/т
КРУЙЗЕР 350, к.с. (350 г/л) Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария 04.02.2036 г.	6,0-9,0	Кукуруза	Комплекс почвенных вредителей, в т.ч. проволочники	Протравливание семян суспензией препарата. Расход рабочей жидкости 10 л на 1 т семян
17.03.2027 г.	6,0-10,0	Подсолнечник	Комплекс почвенных вредителей, тли, трипсы	Протравливание семян суспензией препарата
	4,0-6,0	Хлопчатник	Табачный трипс, тли, белокрылка	
22.09.2030 г.	0,2	Картофель	Проволочники, озимая совка, стимулирует рост и развитие растений	Обработка клубней перед посадкой суспензией препарата. Расход рабочей жидкости 2 л/т
РИЧ 350, к.с. (350 г/л) ТОО «Защита-Растений-К» 17.02.2027 г.	0,5-1,0	Рис	Прибрежная муха	Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости – 10 л/т
Рокот , к.с. (350 г/л) ШАНДОНГ ВЕЙФАНГ РЕЙНБОУ КЕМИКАЛ КО., ЛТД 26.03.2036 г.	0,4-0,5	Пшеница яровая Ячень	Комплекс почвенных вредителей, стимулирует рост и развитие растений	Протравливание семян суспензией препарата. Расход рабочей жидкости 10 л/т
	0,2	Картофель	Проволочники, озимая совка, стимулирует рост и развитие растений	Протравливание семян суспензией препарата. Расход рабочей жидкости 10 л/т
	6,0-10	Подсолнечник	Комплекс почвенных вредителей, тли, трипсы	Протравливание семян суспензией препарата. Расход рабочей жидкости 10 л/т
	0,5-1,5	Лен масличный	Комплекс почвенных вредителей, льняной трипс, стимулирует рост и развитие растений	Протравливание семян суспензией препарата. Расход рабочей жидкости 10 л/т
	8,0-10,0	Рапс	Комплекс почвенных вредителей, стимулирует рост и развитие растений	Протравливание семян суспензией препарата. Расход рабочей жидкости 10 л/т
ТИМАТЕРР, к.с. (350 г/л) ФОРВАРД 16.05.2034 г.	0,5-1,0	Яровая пшеница	Злаковые мухи (гессенская и шведская), блошки	Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости 10 л/т
	0,2	Картофель	Проволочники	Протравливание клубней непосредственно перед посадкой. Расход рабочей жидкости 10 л/т
	8-10	Подсолнечник	Комплекс вредителей всходов (почвообитающие и наземные вредители)	Обработка семян подсолнечника, перед посевом. Расход рабочей жидкости – 10 л/т
	8-10	Рапс	Крестоцветные блошки	Обработка семян перед посевом. Расход рабочей жидкости – 10 л/т
	4,0-6,0	Хлопчатник	Табачный трипс, тли, белокрылка	Протравливание семян суспензией препарата. Расход рабочей жидкости – 10 л/т
	10,0-14,0	Сахарная свекла	Вредители всходов (фракция семян 3,5-4,5 мм)	Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаговременно (1 год), для фракции 3,5- 4,5 мм и дражированных
	8,0-12,0	Сахарная свекла	Вредители всходов (фракция семян 4,5-5,5 мм)	Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаговременно (1год), для фракции 4,5- 5,5 мм
	0,2-0,22	Картофель	Колорадский жук , проволочники и ложнопроволоч ики, тля	Обработка клубней перед посадкой суспензией препарата. Расход рабочей жидкости 10 л/т
	6,0-9,0	Кукуруза	Проволочники, ложнопроволоч ики, внутрстеблевые мухи, блошки	Протравливание семян суспензией препарата. Расход рабочей жидкости – 10 л/т
	6,0-8,0	Горчица	Крестоцветные блошки, рапсовый цветоед	Протравливание семян суспензией препарата. Расход рабочей жидкости – 10-20 л/т
	0,5-1,0	Рис	Прибрежная муха	Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости – 10 л/ т
	8,0-10,0	Рапс	Комплекс почвенных вредителей и вредителей всходов	Протравливание семян суспензией препарата. Расход рабочей жидкости – 10 л/т
	0,5-0,6	Пшеница, ячень, овес	Хлебная жужелица, внутрстеблевые мухи, цикадки, хлебные блошки, трипсы	Протравливание семян суспензией препарата. Расход рабочей жидкости – 10 л/т
	6,0-10,0	Подсолнечник	Комплекс почвенных вредителей, тли, трипсы	Протравливание семян суспензией препарата. Расход рабочей жидкости – 10 л/т
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 600 г/л				
КРУГОЗОР, к.с. (600 г/л) ООО «Шанс» 07.07.2031	5,3	Кукуруза	Проволочники	Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости – до 15,3 л/т
	5,8	Подсолнечник	Проволочники	Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости – до 15,8 л/т

	0,3-0,6	Пшеница озимая, яровая, ячмень	Хлебная жужелица, блошки, злаковые мухи	Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости до 10 л/т
	0,12-0,13	Картофель	Колорадский жук, проволочник	Предпосадочная обработка клубней. Расход рабочей жидкости – 2-10 л/т
	5,8	Рапс, горчица	Крестоцветные блошки	Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости до 20 л/т
	0,3-0,6	Горох, нут, чечевица	Клубеньковый долгоносик	Предпосевная обработка семян заблаговременно или непосредственно перед посевом. Расход рабочей жидкости – 10 л/т.
	0,3-0,6	Соя	Клубеньковый долгоносик	Предпосевная обработка семян заблаговременно или непосредственно перед посевом. Расход рабочей жидкости 6-8 л/т.
	0,3-0,6	Лен масличный	Льняная блошка	Предпосевная обработка семян заблаговременно или непосредственно перед посевом. Расход рабочей жидкости 5- 6 л/т
Люксор Форте, к.с. (600 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия 21.01.2035 г.	3 - 5	Подсолнечник	Почвенные вредители (проволочники, ложнопроволочники), тли, трипсы	Протравливание семян суспензией препарата. Расход рабочей жидкости - 10 л/т.
	0,6 - 0,8	Лён масличный	Льняной трипс, льняная блошка, комплекс почвенных вредителей (проволочники, ложнопроволочники)	
	0,2 - 0,25	Ячмень яровой	Блошки, шведская муха, почвенные вредители (проволочники, ложнопроволочники)	
	0,2 - 0,25	Пшеница яровая	Пшеничный трипс, хлебные блошки, гессенская муха, почвенные вредители (проволочники, ложнопроволочники)	
	3-5	Рапс	Крестоцветные блошки, капустная белянка, тли, скрытнохоботник , комплекс почвенных вредителей (проволочники, ложнопроволочники)	
ХАРИТА, к.с. (600 г/л) АО «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ» 17.04.2035 г.	3,5-4,6	Горчица	Крестоцветные блошки	Обработка семян
	0,3-0,4	Чечевица	крестоцветные блошки	
	3,5-5,8	Подсолнечник	Проволочники	
	0,2-0,3	Пшеница и ячмень яровые	Листовые хлебные блошки, злаковые мухи	
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 800 г/л				
Эссфейт, в.д.г. (800 г/кг) НАНЬЦЗИН ЭССЕНС ФАЙН-КЕМИКАЛ КО. ЛТД 09.07.2036 г.	0,3–0,7	Ячмень яровой	Комплекс почвенных вредителей, в том числе тли, трипсы, проволочники	Протравливание семян. Расход рабочей жидкости 10 л на 1 т семян
	0,3–0,7	Пшеница яровая	Комплекс почвенных вредителей, в том числе тли, трипсы, проволочники	
	3,0–5,0	Рапс	Крестоцветные блошки	
	3,0–5,0	Кукуруза	Комплекс почвенных вредителей, в том числе тли, трипсы, проволочники	
	3,0–5,0	Подсолнечник	Комплекс почвенных вредителей, в том числе тли. трипсы. проволочники	

Тебуконазол + тиаметоксам

Арнейс Про к.с. (60 г/л + 300 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-1 06.02.2035 г.	0,4	Лен масличный	Корневые гнили, фузариоз, антракноз, аскохитоз, трипсы, блошка, почвенные вредители(проволочники, ложнопроволочники)	Протравливание семян суспензией препарата (10 л воды на 1 тонну семян)
	0,4	Ячмень яровой	Каменная,пыльная головня, плесневение семян, корневые гнили, блошки, шведская муха, почвенные вредители (проволочники, ложнопроволочники)	
	0,4	Пшеница озимая	Твердая, пыльная головня, плесневение семян, корневые гнили, блошки, пшеничный трипс, почвенные вредители(проволочники, ложнопроволочники)	
	0,4	Пшеница яровая	Твердая и пыльная головня, фузариозная корневая гниль, альтернариозная семенная инфекция, плесневение семян	

Тебуконазол + флудиоксонил + имidakлоприд

ДОМБИРА, к.с. (30 г/л + 50 г/л + 400 г/л) ТОО "QADAM Group (КАДАМ Групп)" П-2 10.02.2035 г.	0,75-1,0	Ячмень	Твердая и пыльная головня септориоз, корневые гнили,, тля, пьявицы, хлебные блошки, хлебная жужелица, злаковые мухи	Протравливание семян суспензией препарата
	0,75-1,0	Пшеница	Твердая и пыльная головня, фузариозная корневая гниль, септориоз, хлеба жужелица,злаковые мухи,хлебные блошки,трипсы цикадки, тля, пьявицы,	

Тиаметоксам + дифеноконазол + мефеноксам

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 92,3 г/л + 36,92 г/л + 3,08 г/л				
ДИВИДЕНД СУПРИМ 132, 3 с.к. (92,3 г/л + 36,92 г/л + 3,08 г/л) Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария 05.07.2027 г.	1,5-2,0	Пшеница яровая	Блошки, злаковые мухи; пыльная головня, корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян. Расход рабочей жидкости 10 л воды на 1 т семян
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 262,5 г/л + 25 г/л + 25 г/л				
ШАНСОМЕТОКС ТРИО, к.с. (262,5 г/л + 25 г/л + 25 г/л) ООО «Шанс» 14.02.2034 г.	0,4	Картофель	Проволочники, колорадский жук	Обработка клубней. Расход рабочей жидкости – до 10 л/т клубней (перед посадкой), 25 л/т клубней (при посадке)
	0,4	Картофель	Ризоктониоз, серебристая парша, антракноз, фузариоз	Предпосадочная обработка клубней. Расход рабочей жидкости – до 10 л/т
	1,2-1,5	Ячмень яровой	Каменная головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, альтернариозная семенная инфекция, плесневение семян	Протравливание семян непосредственно перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости – до 10 л/т
	1,2-1,5	Пшеница яровая и озимая	Твердая головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, корневая	

			гниль, альтернариозная семенная инфекция, плесневение семян	
--	--	--	---	--

Тиаметоксам + дифеноконазол + флудиоксонил

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 262,5 г/л + 25 г/л + 25 г/л				
СЕЛЕСТ ТОП 312,5, к.с. (262,5 г/л + 25 г/л + 25 г/л) Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария 07.02.2030 г.	1,0-1,8	Пшеница яровая	Блошки, трипсы, злаковые мухи, пыльная, твердая головня, плесневение семян, корневые гнили	Протравливание семян суспензией препарата (10 л воды на 1 т семян)
	1,0-1,8	Рис	Рисовый комарик, тли, прибрежная муха, трипс, минеры, альтернариоз, фузариоз и бактериоз	
22.09.2030 г.	1,0-1,8	Пшеница озимая	Хлебная жужелица, пыльная, твердая головня, корневые гнили, плесневение семян, стимулирование роста растений	
	1,0-1,8	Ячмень яровой	Проволочники, пыльная, каменная головня, корневые гнили, плесневение семян, стимулирование роста растений	
13.04.2033 г.	1,0-2,0	Лен	Стимулирует рост и развитие растения	
21.02.2034 г.	1,0-2,0	Лен	Блошки, антракноз, фузариоз	Протравливание семян суспензией препарата (10 л воды на 1 т семян)
	0,3-0,4	Картофель	Стимулятор роста, колорадский жук, проволочники, ризоктониоз, корневые гнили	Протравливание клубней суспензией препарата (10 л воды на 1 т)
Синфу 120 т.к. (114 г/л+3 г/л+3 г/л) Shaanxi Sunger Road Bio-Science CO., Ltd., Китай 29.09.2035 г.	6,4 - 10,0	Пшеница яровая	Блошки, тли, трипсы, злаковые мухи; пыльная и твердая головня, корневая гниль, плесневение семян.	Протравливание семян суспензией препарата (6,4 л препарата на 10 л воды, 10,8 л препарата на 6 л воды на 1 т семян)
	6,4 - 10, 8	Пшеница озимая	Хлебная жужелица, блошки, тли, трипсы, злаковые мухи; пыльная и твердая головня, корневая гниль, плесневение семян.	Протравливание семян суспензией препарата (6,4 л препарата на 10 л воды, 10,8 л препарата на 6 л воды на 1 т семян).
	6,4 - 10	Ячмень яровой	Блошки, тли, трипсы, злаковые мухи; пыльная и каменная головня, корневая гниль, плесневение семян.	Протравливание семян суспензией препарата (6,4 л препарата на 10 л воды, 10,8 л препарата на 6 л воды на 1 т семян).
ФЛОКСИ МИКС, к.с. (262,5 г/л + 25 г/л + 25 г/л) ШАНДОНГ ВЕЙФАНГ РЕЙНБОУ КЕМИКАЛ КО., ЛТД, 27.12.2034 г.	0,3-0,4	Картофель	Стимулятор роста, колорадский жук, проволочники, тли, серебристая парша, антракноз, фузариоз, ризоктониоз, корневые гнили	Протравление клубней суспензией препарата (10 л воды на 1 т)
	1,0-2,0	Лен	Стимулирует рост и развитие растения, блошки, антракноз, фузариоз	Протравливание семян перед посевом суспензией препарата (10 л воды на 1 т)
	1,0-1,8	Пшеница	Хлебная жужелица, пыльная, твердая головня, корневые гнили, плесневение семян, стимулирование роста растений	
	12,5-15	Рапс	Корневые гнили, плесневение семян, альтернариоз. Крестоцветные блошки, рапсовый пилильщик, стеблевой капустный скрытнохоботник	Обработка семян перед посевом или заблаговременно (15-20 л на 1 т семян)
	1,0-1,8	Рис	Корневые гнили, пирикулярриоз, плесневение семян, рисовый комарик, злаковые тли	Обработка семян перед посевом или заблаговременно (10 л воды на 1 т)
	1,0-1,8	Ячмень	Проволочники, пыльная, каменная головня, корневые гнили, плесневение семян, стимулирование роста растений	Протравливание семян суспензией препарата (10 л воды на 1 т семян)
Цитадель к.с. (262,5 г/л + 25 г/л + 25 г/л) ТОО «Астана-Нан» 07.03.2034	1,0-1,8	Пшеница яровая	Блошки, трипсы, злаковые мухи, твердая, пыльная головня, плесневение семян, корневые гнили	Протравливание семян суспензией препарата
	1,0-1,8	Рис	Рисовый комарик, тли, прибрежная муха, трипс, минеры, альтернариоз, фузариоз и бактериоз	
	1,0-2,0	Лен	Стимулирует рост и развитие растения, блошки, антракноз, фузариоз	
	0,3-0,4	Картофель	Стимулятор роста, колорадский жук, проволочники, ризоктониоз, корневые гнили	Протравливание клубней суспензией препарата

Тиаметоксам + имидаклоприд + фипронил

БОМБАРДА к.с. (130г/л + 90 г/л + 60 г/л) АО «Щелково Агрохим» 27.02.2033 г.	0,8-1,0	Пшеница яровая	Проволочники	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно
	0,8-1,0	Пшеница и ячмень яровые	Листовые хлебные блошки, злаковые мухи	
	0,3-0,5	Картофель	Проволочники, колорадский жук	Обработка клубней.

Тиаметоксам + мефеноксам + флудиоксонил

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 280 г/л + 33,3 г/л + 8 г/л				
Андорал, с.к. (280 г/л + 33,3 г/л + 8 г/л) ТОО «Астана-Нан» 02.06.2035 г.	12,0	Рапс	Крестоцветные блошки, корневые гнили	Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаговременно (до 1 года).
	195 мл/100 кг семян	Соя	Почвообитающие вредители и болезни всходов	Протравливание семян суспензией препарата непосредственно перед посевом. Расход рабочей жидкости 10 л/т.
	117-195 мл/100 кг семян	Горох	Почвообитающие вредители и болезни всходов	
КРУЙЗЕР OSR 322, с.к. (280 г/л + 33,3 г/л + 8 г/л) Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария 29.01.2036 г.	12,0	Рапс	Крестоцветные блошки	Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаговременно (до 1 года)
04.01.2029 г.	12,0	Рапс	Плесневение семян, корневые гнили	

Тиаметоксам + тефлутрин

ФОРС ЗЕА 280, к.с. (200 г/л + 80 г/л) Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария 05.07.2027 г.	5,0-6,0	Кукуруза	Проволочники	Протравливание семян. Расход рабочей жидкости до 20 л воды на 1 т семян.
---	---------	----------	--------------	--

Тиаметоксам + флутриафол + металаксил

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 350 г/л + 87 г/л + 43 г/л				
Гор, к.с. (350 г/л + 87 г/л + 43 г/л) ТОО «Агро Глобал» 31.12.2035 г.	0,3	Пшеница яровая	Твердая, пыльная головня, плесневение семян, корневые гнили, тли, трипсы, блошки	Протравливание семян суспензией препарата. Расход рабочей жидкости 10 л/т
	0,3	Ячмень яровой	Каменная, пыльная головня, плесневение семян, корневые гнили, тли, трипсы, блошки	
	0,4	Чечевица	Корневые гнили, антракноз, аскохитоз, тля, блошки	
	0,35	Лен	Корневые гнили, антракноз, трипсы, блошки.	
ПИЛИГРИМ, к.с. (350 г/л + 87 г/л + 43 г/л) Синтезия Кеми Гмбх, Германия 29.05.2030 г.	0,3	Пшеница яровая	Твердая, пыльная головня, плесневение семян, корневые гнили, тли, трипсы, блошки	Протравливание семян суспензией препарата. Расход рабочей жидкости 10 л/т
	0,3	Ячмень яровой	Каменная, пыльная головня, плесневение семян, корневые гнили, тли, трипсы, блошки	
	0,4	Чечевица	Корневые гнили, антракноз, аскохитоз, тля, блошка	
	0,35	Лен	Корневые гнили, аскохитоз, антракноз, трипсы, блошки.	
ТРИСТАР, к.с. (350 г/л+87 г/л+ 43 г/л) ТОО «АЙБАД-2015» 07.04.2035 г.	0,3	Пшеница и ячмень яровые	Твердая, пыльная головня, корневые гнили, плесневение семян, тли, трипсы, блошки, проволочники	Протравливание семян суспензией препарата
	0,4	Чечевица	Корневые гнили, фузариоз, антракноз, аскохитоз, тля, клубеньковые долгоносики, проволочники	
	0,35	Лен масличный	Корневые гнили, фузариоз, антракноз, аскохитоз, трипсы, проволочники	

Тиаметоксам + флудиоксонил + тебуконазол

СЕЛЕСТ МАКС 165, к.с. (125 г/л + 25 г/л + 15 г/л) SYNGENTA CROP PROTECTION AG 22.01.2034	1,6-1,8	Пшеница и ячмень яровые	Стимулятор роста, блошки, злаковые мухи, твердая, пыльная и черная головня, корневые гнили, плесневение семян, септориоз	Протравливание семян суспензией препарата (8-10 л воды на 1 т семян)
--	---------	-------------------------	--	--

Тиаметоксам + флудиоксонил + седаксан

Вайбранс Топ 312,5, к.с. (262,5 г/л + 25 г/л + 25 г/л) SYNGENTA CROP PROTECTION AG 22.01.2034	0,4-0,7	Картофель	Стимулятор роста. Колорадский жук, проволочники, ризиктониоз, фузариоз, гелиминтоспориоз, корневые гнили	Обработка клубней суспензией препарата)
---	---------	-----------	--	---

Тиаметоксам + протиоконазол + азоксистробин

Дефендер, к.с. (375 г/л + 60 г/л + 60 г/л) ТОО «Terra Prime» 16.04.2036 г	0,4–0,5 л/т	Пшеница яровая	Стимулятор роста, блошки, злаковые мухи, долгоносики, почвенные вредители (проволочники, ложнопроволочники), твердая головня, пыльная головня, корневые гнили, плесневение семян, септориоз	Протравливание семян непосредственно перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости 8–10 л/т
	0,4–0,5 л/т	Ячмень яровой	Стимулятор роста, блошки, злаковые мухи, долгоносики, почвенные вредители (проволочники, ложнопроволочники), пыльная и черная головня, корневые гнили, плесневение семян, септориоз	

Тирам

ТМТД, в.с.к. (400 г/л) АО Фирма «Август» 27.12.2032 г.	3,0-4,0	Пшеница озимая	Твердая головня, плесневение семян, корневые гнили	Протравливание семян заблаговременно или перед посевом суспензией препарата (8-10 л воды на 1 т семян)
	3,0	Пшеница яровая	Твердая головня, корневые гнили плесневение семян,	Протравливание семян суспензией препарата (10 л воды на 1 т семян)
	3,0-4,0	Кукуруза	Пузырчатая головня, корневые и стеблевые гнили, фузариоз, бактериоз, плесневение семян	
11.09.2034 г.	7,0-8,0	Рапс	Черная ножка, фомоз	Протравливание семян суспензией препарата. Расход рабочей жидкости 10 л/т
	8,0	Соя	Аскохитоз, фузариоз, бактериоз, плесневение семян	
	6,0-8,0	Горох	Аскохитоз, фузариоз, антракноз, бактериоз, плесневение семян	
	8,0	Горох	Серая гниль	
	6,0-8,0	Нут	Фузариоз, антракноз, бактериоз, плесневение семян	
	8,0	Нут	Аскохитоз	
	4,0-5,0	Картофель	Фитофтороз, парша (виды), мокрая гниль	Протравливание клубней суспензией препарата. Расход рабочей жидкости 20 л/т

Тирам + дифеноконазол

ТИРАДА, с.к. (400 г/л + 30 г/л) АО Фирма «Август» 14.06.2031 г.	1,5-2,0	Соя	Аскохитоз, фузариоз, плесневение семян, бактериоз	Протравливание семян. Расход рабочей жидкости 8-10 л/т.
		Горох	Серая гниль, аскохитоз, фузариоз, антракноз, плесневение семян, бактериоз	
		Нут	Аскохитоз, фузариоз, антракноз, плесневение семян, бактериоз	
		Чечевица	Корневые гнили, аскохитоз, фузариоз, серая гниль, антракноз, плесневение семян, бактериоз	
		Лен масличный	Аскохитоз, фузариоз, крапчатость, пасмо, плесневение семян	Протравливание семян. Расход рабочей жидкости 10-12 л/т.
	2,0-3,0	Подсолнечник	Белая и серая гниль, плесневение семян, переноспороз, бактериоз	

Тирам + тебуконазол + азоксистробин

ГЕРАКЛИОН, к.с. (400 г/л + 25 г/л + 15 г/л) АО «Щелково Агрохим» 07.04.2032 г.	0,6-1,0	Ячмень яровой	Пыльная, твердая (каменная) головня, корневые гнили, плесневение семян, снежная плесень, сетчатая пятнистость	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно
	0,6-1,0	Пшеница яровая	Пыльная, твердая (каменная) головня, корневые гнили, плесневение семян, снежная плесень, сетчатая пятнистость	
	0,6-1,0	Горох	Корневые гнили, аскохитоз, серая гниль, антракноз, плесневение семян, фузариоз, бактериоз	
	0,6-0,1	Соя	Корневые гнили, аскохитоз, антракноз, плесневение семян, церкоспороз, бактериоз	
	0,6-1,0	Пшеница озимая	Пыльная, твердая (каменная) головня, корневые гнили, плесневение семян, снежная плесень.	

Тритиконазол

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 200 г/л				
ПРЕМИС ДВЕСТИ, 20% к.с. (200 г/л) БАСФ Агро Б.В., Швейцария 20.03.2035 г.	0,125-0,2	Пшеница и ячмень яровые	Твердая, пыльная, каменная головня, плесневение семян, корневые гнили	Протравливание семян суспензией препарата (8-10 л воды на 1 т семян)
	0,15	Пшеница озимая	Твердая, пыльная головня, плесневение семян, корневые гнили	

Тритиконазол + пираклостробин

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 80 г/л + 40 г/л				
ЕССЕНШУР, 12% к.с. (80 г/л + 40 г/л) НАНЬЦЗИН ЭССЕНС ФАЙН-КЕМИКАЛ КО. ЛТД 26.05.2036 г.	0,3-0,4	Пшеница яровая и озимая	Твердая, пыльная головня, плесневение семян, корневые гнили улучшение засухо - морозоустойчивости	Протравливание семян суспензией препарата (8-10 л воды на 1 т семян)
	0,3-0,4	Ячмень яровой	Пыльная, каменная головня, плесневение семян, корневые гнили улучшение засухо - морозоустойчивости	Протравливание семян суспензией препарата (8-10 л воды на 1 т семян)
ИНШУР ПЕРФОРМ, 12% к.с. (80 г/л + 40 г/л) БАСФ СЕ, Германия 17.02.2030 г.	0,3-0,4	Пшеница и ячмень яровые	Твердая, пыльная, каменная головня, плесневение семян, корневые гнили улучшение засухо - морозоустойчивости	Протравливание семян суспензией препарата (8-10 л воды на 1 т семян)
	0,3-0,4	Пшеница озимая	Твердая, пыльная головня, плесневение семян, корневые гнили	
ПРОТЕКТОР, к.с (80 г/л+40 г/л) ARCUS INVEST HOLDING B.V. 20.01.2033 г.	0,3-0,5	Пшеница яровая	Твердая, пыльная головня, плесневение семян, корневые гнили.	Протравливание семян суспензией препарата (10 л на 1 т семян)
	0,3-0,5	Ячмень яровой	Пыльная, каменная головня, плесневение семян, корневые гнили.	
	0,5	Лен	Фузариоз, антракноз, аскохитоз, крапчатость семядоли льна, фомоз	
ТРИТОПИР, к.с. (80 г/л + 40 г/л) ТОО «Астана-Нан» 13.12.2031 г.	0,3-0,4	Пшеница и ячмень яровые	Твердая, пыльная, каменная головня, плесневение семян, корневые гнили, улучшение засухо - морозоустойчивости	Протравливание семян суспензией препарата.
Тринити, к.с. (80 г/л + 40 г/л) ШАНДОНГ ВЕЙФАНГ РЕЙНБОУ КЕМИКАЛ КО., ЛТД 30.03.2036 г.	0,3-0,4	Яровой ячмень	Пыльная, каменная головня, плесневение семян, корневые гнили.	Протравливание семян суспензией препарата (10 л на 1 т семян)
	0,3-0,4	Пшеница яровая	Твердая, пыльная головня, плесневение семян, корневые гнили	

Тритиконазол + прохлораз

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 20 г/л + 60 г/л				
Дуопротек, к.с. (20 г/л + 60 г/л) ТОО «QADAM Group (КАДАМ Групп)» 23.12.2034 г.	1,5-2,0	Пшеница и ячмень яровые	Твердая, пыльная, каменная головня, плесневение семян, корневые гнили, септориоз	Протравливание семян суспензией препарата (8-10 л воды на 1 т семян)
КИНГ ДУО, 8% к.с. (20 г/л + 60 г/л) ТОО «Астана-Нан» 13.02.2035 г.	1,5-2,0	Пшеница и ячмень яровые	Плесневение семян, корневые гнили	Протравливание семян суспензией препарата перед посевом (8-10 л воды на 1 т семян)

Тритиконазол + флутриафол + пираклостробин

ОДИССЕЙ 2.0, к.с. (20 г/л + 125 г/л + 60 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ», Германия 29.05.2030 г.	0,2-0,3	Пшеница яровая	Пыльная, твердая головня, корневые гнили, плесневение семян.	Протравливание семян суспензией препарата. Расход рабочей жидкости 10 л/т
	0,2-0,3	Ячмень яровой	Пыльная, каменная головня, корневые гнили, плесневение семян.	

Флудиоксонил

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 25 г/л				
МАКСИМ 025, с.к. (25 г/л) Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария 17.03.2027 г.	0,3-0,7	Картофель	Фитофтороз, ризоктониоз, виды парши	Протравливание клубней суспензией препарата
МАКСУС, к.с. (25 г/л) ТОО «ФМРУС» П-3 21.12.2033	1,5-2,0	Соя	Фузариозная корневая гниль, аскохитоз, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом.
	1,5-2,0	Пшеница яровая	Твердая головня, гелиминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян непосредственно перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости – до 10 л/т

	1,5-2,0	Ячмень яровой	Каменная головня, гелиминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян непосредственно перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости – до 10 л/т
	1,5-2,0	Горох	Фузариозная корневая гниль, аскохитоз	Протравливание семян перед посевом. Расход рабочей жидкости – 6-8 л/т
	1,5-2,0	Хлопчатник	Корневые гнили, гоммоз	Протравливание семян перед посевом. Расход рабочей жидкости – 6-8 л/т
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 75 г/л				
СИНКЛЕР, с.к. (75 г/л) АО Фирма «Август» 22.04.2030 г.	0,2-0,3	Картофель	Ризоктониоз, фузариоз, виды парши	Обработка клубней до или во время посадки. Расход рабочей жидкости 10 л/т
	0,6	Соя	Плесневение семян, аскохитоз, фузариоз	Протравливание семян. Расход рабочей жидкости 8 л/т
	0,4-0,6	Горох, нут	Фузариозная корневая гниль, аскохитоз, плесневение семян	
	1,6	Подсолнечник	Альтернариоз, корневые гнили	Протравливание семян. Расход рабочей жидкости – 15 л/т
	0,6	Чечевица	Корневые гнили, аскохитоз	Протравливание семян. Расход рабочей жидкости – 10 л/т
	0,4-0,6	Пшеница	Твердая головня, фузариозные и гелиминтоспориозные корневые гнили, плесневение семян	Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости – 10 л/т

Флудиоксонил + имазалил + металаксил

ДЕПОЗИТ, м.э. (40 г/л + 40 г/л + 30 г/л) АО «Щелково Агрохим» 14.04.2031 г.	0,6-0,8	Соя	Аскохитоз, фузариоз, фузариозная корневая гниль, церкоспороз, плесневение семян	Протравливание семян заблаговременно или перед посевом. Расход рабочей жидкости 6-8 л/т
		Чечевица	Аскохитоз, корневые гнили	
	0,6-0,8	Горох, нут	Аскохитоз, корневые гнили, плесневение семян	

Флудиоксонил + мефеноксам

МАКСИМ XL 035, с.к. (25 г/л + 10 г/л) Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария 02.02.2036 г.	1,0	Кукуруза	Пыльная, пузырчатая головня, плесневение семян, корневые гнили	Протравливание семян суспензией препарата (2-8 л воды на 1 т семян)
17.03.2027 г.	1,0-1,5	Хлопчатник	Корневые гнили, гоммоз	Протравливание семян суспензией препарата
27.10.2030 г.	5,0	Подсолнечник	Альтернариоз, корневые гнили	Протравливание семян. Расход рабочей жидкости 10-12 л/т.
09.03.2033 г.	1,0	Горох, нут	Корневые гнили, аскохитоз, плесневение семян	Протравливание семян. Расход рабочей жидкости 3-5 л/т

Флудиоксонил + ципроконазол

МАКСИМ СТАР 25,3 к.с. (19 г/л + 6,3 г/л) Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария 16.06.2027 г.	1,0-1,5	Пшеница яровая	Пыльная головня, корневые гнили	Протравливание семян. Расход рабочей жидкости 10 л воды на 1 т семян
---	---------	----------------	---------------------------------	--

Флудиоксонил + азоксистробин+тебуконазол

Рекорд Форте к.с. (25 г/л+10 г/л+15 г/л) «DVA Agro GmbH» 15.03.2034 г.	1,0-1,5	Пшеница яровая, ячмень яровой	Корневые гнили, спорынья, твердая, пыльная головня, септориоз, сетчатая пятнистость	Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости 10 л/т.
--	---------	-------------------------------	---	---

Флутриафол

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 100 г/л				
СИЛЬВЕРАДО ЛАЙТ, к.с., (100 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия 15.09.2033	0,3	Пшеница яровая	Твердая, пыльная головня, корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян непосредственно перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости 10 л/т
	0,3	Ячмень яровой	Пыльная, каменная головня, корневые гнили, плесневение семян	
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 200 г/л				
СИЛЬВЕРАДО, к.с. (200 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия 26.01.2027 г.	0,12-0,15	Пшеница и ячмень яровые	Пыльная головня, корневые гнили	Протравливание семян суспензией препарата (10 л воды на 1 т семян)
18.04.2029 г.	0,12-0,15	Пшеница яровая	Твердая головня, плесневение семян	Протравливание семян суспензией препарата. Расход рабочей жидкости—10 л/т
	0,12-0,15	Ячмень яровой	Каменная головня, плесневение семян	

Флутриафол + бета-цифлутрин + клотианидин

ФАРАДЕЙ, к.с. (75 г/л + 150 г/л + 250 г/л) «Синтезия Кеми ГмбХ», Германия 12.04.2029 г.	0,3-0,4	Пшеница яровая	Пыльная головня, корневые гнили, плесневение семян, пшеничный трипс, хлебные блошки	Протравливание семян суспензией препарата. Расход рабочей жидкости – 10 л/т
	0,3-0,4	Ячмень яровой	Каменная головня, корневые гнили, плесневение семян	

Флутриафол + пираклостробин

СПЕКТР ФОРТЕ, к.с. (160 г/л + 40 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия 02.03.2028 г.	0,15-0,2	Пшеница и ячмень яровые	Твердая, пыльная, каменная головня, корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян суспензией препарата (10 л воды на 1 тонну семян)
--	----------	-------------------------	---	--

Флутриафол + флуоксастробин+ пираклостробин

СПЕКТР УЛЬТРА, к.с. (170 г/л + 43 г/л + 54 г/л)	0,2	Пшеница яровая	Твердая, пыльная головня, плесневение семян, корневые гнили	
---	-----	----------------	---	--

Синтезия Кеми ГмбХ, Германия 05.02.2036 г.	0,2	Ячмень яровой	Пыльная, каменная головня, плесневение семян, корневые гнили	Протравливание семян суспензией препарата (10 л воды на 1 т семян)
	0,25-0,3	Чечевица	Аскохитоз, фузариоз, серая гниль, плесневение семян	
	0,25-0,3	Горох	Корневые гнили, аскохитоз	
	0,25-0,3	Лен масличный	Корневые гнили, фузариоз, антракноз	

Флутриафол + флуоксастробин+ протиоконазол

АКСИОН ПРО, к.с. (150 г/л + 87 г/л + 87 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия 04.02.2036 г.	0,2	Пшеница яровая	Твердая, пыльная головня, плесневение семян, корневые гнили	Протравливание семян суспензией препарата (10 л воды на 1 т семян)
	0,2	Ячмень яровой	Пыльная, каменная головня, плесневение семян, корневые гнили	
	0,25-0,3	Чечевица	Аскохитоз, фузариоз, серая гниль, плесневение семян	
	0,25-0,3	Горох	Корневые гнили, антракноз, аскохитоз	
	0,25-0,3	Лен масличный	Корневые гнили, фузариоз, антракноз	

Флутриафол + боскалид+ протиоконазол

БАЛИСТА, к.с. (167 г/л + 50 г/л + 75 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия 06.02.2036 г.	0,15	Пшеница яровая	Твердая, пыльная головня, плесневение семян, корневые гнили	Протравливание семян суспензией препарата (10 л воды на 1 т семян)
	0,15	Ячмень яровой	Пыльная, каменная головня, плесневение семян, корневые гнили	
	0,2 - 0,25	Чечевица	Аскохитоз, фузариоз, серая гниль, плесневение семян	
	0,2 - 0,25	Горох	Корневые гнили, аскохитоз	
	0,2 - 0,25	Лен масличный	Корневые гнили, фузариоз, антракноз	

Флутриафол + боскалид+флуоксастробин+ципроконазол

РИВАС, к.с. (107 г/л + 69 г/л + 67 г/л + 14 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия 04.02.2036 г.	0,25	Пшеница яровая	Твердая, пыльная головня, плесневение семян, корневые гнили	Протравливание семян суспензией препарата (10 л воды на 1 т семян)
	0,25	Ячмень яровой	Пыльная, каменная головня, плесневение семян, корневые гнили	

Флутриафол + пираклостробин + имазалил

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 120 г/л + 70 г/л + 60 г/л				
ОЛИМП ГРАНД, к.с. (120 г/л + 70 г/л + 60 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия 02.03.2028 г.	0,2-0,25	Пшеница и ячмень яровые	Твердая, пыльная, каменная головня, корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян суспензией препарата (10 л воды на 1 тонну семян)
	0,25	Чечевица	Фузариоз, антракноз, аскохитоз, плесневение семян, ростостимулирующее действие	
	0,25	Лен масличный	Антракноз, фузариоз	Протравливание семян суспензией
Триатлон, к.с. (125 г/л + 70 г/л + 60 г/л) ООО «EcoSave» 20.04.2036 г.	0,25	Ячмень яровой	Пыльная, каменная головня, плесневение семян, корневые гнили	Обработка семян суспензией препарата. Расход рабочей жидкости: 10 литров воды на 1 тонну семян.
	0,25	Пшеница яровая	Твердая, пыльная головня, плесневение семян, корневые гнили	Обработка семян суспензией препарата. Расход рабочей жидкости: 10 литров воды на 1 тонну семян.
ФБЮЖН, к.с. ARCUS INVEST HOLDING B.V (120 г/л + 70 г/л + 60 г/л) 12.10.2032 г.	0,2-0,25	Рапс масличный	Альтернариоз, плесневение семян, корневые гнили	Обработка семян до посева
	0,2-0,25	Лен масличный	Фузариоз, антракноз, плесневение семян, ростостимулирующее действие	
	0,2-0,25	Ячмень яровой	Каменная, пыльная головня, корневые гнили, плесневение семян	
	0,2-0,25	Яровая пшеница	Твердая, пыльная головня, корневые гнили, плесневение семян	

Флутриафол + ципроконазол + мефеноксам + тиаметоксам, + клотианидин

ЭНИГМА, к.с. (87 г/л + 7 г/л + 28 г/л + 134 г/л + 207 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия 22.01.2036 г.	0,35	Пшеница яровая	Твердая, пыльная головня, плесневение семян, корневые гнили, блошки, пшеничный трипс, почвенные вредители (проволочники, ложнопроволочники)	Протравливание семян суспензией препарата (10 л воды на 1 т семян)
	0,35	Ячмень яровой	Каменная, пыльная головня, плесневение семян, корневые гнили, блошки, шведская муха, почвенные вредители (проволочники, ложнопроволочники)	

Флутриафол + тиаметоксам

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 87 г/л + 250 г/л				
КАЛИСТО, к.с. (87 г/л + 250 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия 13.04.2032	0,4	Горох, чечевица, соя	Аскохитоз, фузариоз, серая гниль, плесневение семян, клубеньковые долгоносики, почвенные вредители (проволочники, ложнопроволочники)	Протравливание семян суспензией препарата. Расход рабочей жидкости 10 л/т
	0,3-0,4	Ячмень яровой	Каменная, пыльная головня, плесневение семян, корневые гнили, блошки, шведская муха, почвенные вредители (проволочники, ложнопроволочники)	
	0,3-0,4	Пшеница яровая	Твердая, пыльная головня, плесневение семян, корневые гнили, блошки, гессенская муха, пшеничный трипс, почвенные вредители (проволочники, ложнопроволочники)	
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 95 г/л + 350 г/л				

Поинт, к.с. (95 г/л + 350 г/л) ТОО «EcoSave» 30.03.2036 г.	0,3	Пшеница и ячмень яровые	Твердая, пыльная, каменная головня, плесневение семян, корневые гнили, блошки, трипс, комплекс почвенных вредителей, (проволочники, ложнопроволочники)	Протравливание семян суспензией препарата (10 л воды на 1 т семян)
--	-----	-------------------------	--	--

Флутриафол + прохлораз

СПЕКТР, к.с. (50 г/л + 200 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия 30.07.2031 г.	0,5	Пшеница яровая, ячмень яровой	Твердая, пыльная, каменная головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян суспензией препарата (10 л воды на 1 т семян)
--	-----	-------------------------------	---	--

Флутриафол + тебуконазол

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 62,5 г/л + 30 г/л				
СИЛЬВЕРАДО ПЛЮС, к.с. (62,5 г/л + 30 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия 14.05.2031 г.	0,35-0,4	Пшеница яровая	Твердая, пыльная головня, корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян суспензией препарата (10 литров воды на 1 тонну семян)
	0,35-0,4	Ячмень яровой	Каменная, пыльная головня, корневые гнили, плесневение семян	
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 137 г/л + 107 г/л				
Активо, к.с. (137 г/л + 107 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия 31.01.2035 г.	0,15	Пшеница яровая	Твердая, пыльная головня, корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян суспензией препарата. Расход рабочей жидкости 10 л/т.
	0,15	Ячмень яровой	Каменная, пыльная головня, корневые гнили, плесневение семян	
	0,15	Лен	Корневые гнили, фузариоз, антракноз	

Флутриафол + тебуконазол+ пираклостробин

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 62,5 г/л + 30 г/л+ 60 г/л				
СИЛЬВЕРАДО Про, к.с. (62,5 г/л + 30 г/л+ 60 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия 10.01.2035 г.	0,35 – 0,4	Соя, горох	Корневые гнили, аскохитоз, фузариоз, плесневение семян	Протравливание семян суспензией препарата (расход рабочей жидкости 3-5 л/т семян)
	0,35 – 0,4	Лен масличный	Корневые гнили, фузариоз, антракноз, аскохитоз	Протравливание семян суспензией препарата (10 л воды на 1 тонну семян)
	0,35	Ячмень яровой	Каменная, пыльная головня, плесневение семян, корневые гнили	
	0,35	Пшеница яровая	Твердая, пыльная головня, плесневение семян, корневые гнили	
	0,35	Пшеница озимая	Твердая, пыльная головня, корневые гнили, плесневение семян	

Флутриафол + тебуконазол+ пираклостробин+ тиаметоксам

Мистраль, к.с. (67 г/л + 50 г/л + 60 г/л + 337 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия 03.02.2035 г.	0,4	Лен масличный	Корневые гнили, аскохитоз, трипсы, блошка, почвенные вредители (проволочники, ложнопроволочники)	Протравливание семян суспензией препарата. Расход рабочей жидкости 10 л/т.
	0,3	Ячмень яровой	Каменная, пыльная головня, плесневение семян, корневые гнили, блошки, шведская муха, почвенные вредители (проволочники, ложнопроволочники)	
	0,3	Пшеница яровая	Твердая, пыльная головня, плесневение семян, корневые гнили, блошки, гессенская муха, пшеничный трипс, почвенные вредители (проволочники, ложнопроволочники)	

Флутриафол + тиабендазол

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 25 г/л + 25 г/л				
ВИННЕР, к.с. (25 г/л + 25 г/л) Представительство ООО "Агро Эксперт Групп" в РК 31.10.2035 г.	1,5 – 2,0	Пшеница яровая	Пыльная головня, корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости -10 л/т
	1,5 – 2,0	Ячмень яровой	Пыльная и твердая (каменная) головня, корневые гнили, плесневение семян	
	2	Подсолнечник	Белая гниль (прикорневая форма), плесневение семян, фузариозная прикорневая гниль, серая гниль	
	1,5-2,0	Пшеница озимая	Пыльная и твердая головня, корневые гнили, плесневение семян	
	1,5-2,0	Ячмень озимый	Твердая (каменная) и пыльная головня, корневые гнили, плесневение семян	
ВИНЦИТ, 5% к.с. (25 г/л + 25 г/л) Кеминова А/С, Дания 14.12.2032 г.	1,5	Пшеница яровая	Пыльная головня, корневые гнили, плесневение семян	Предпосевная обработка семян (10 л воды на 1 т семян)
	1,5	Пшеница озимая	Твердая головня, корневые гнили, плесневение семян	
	1,5	Ячмень яровой (товарные посевы)	Каменная, пыльная головня, корневые гнили, плесневение семян	
ВИТАЦИТ, к.с. (25 г/л + 25 г/л) ООО "Форвард", Россия 28.01.2029 г.	1,5-2,0	Пшеница и ячмень яровые	Твердая, пыльная, каменная головня, плесневение семян, корневые гнили	Протравливание семян суспензией препарата (10 л воды на 1 т семян)
	2,0	Подсолнечник	Серая гниль, плесневение семян	
	2,0	Кукуруза	Пузырчатая и пыльная головня, плесневение семян	

Флутриафол + тиабендазол + азоксистробин

КРОНОС УЛЬТРА, к.с. (120 г/л + 80 г/л + 80 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия 14.05.2031 г.	0,25	Пшеница яровая	Твердая, пыльная головня, корневые гнили, плесневение семян, стимулирование роста и развития	Протравливание семян суспензией препарата (10 литров воды на 1 тонну семян)
	0,25	Ячмень яровой	Каменная, пыльная головня, корневые гнили, плесневение семян, стимулирование роста и развития	
	0,3	Чечевица	Аскохитоз, фузариоз, серая гниль, плесневение семян, стимулирование роста и развития	

Флутриафол + тиабендазол + имазалил

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 37,5 г/л+ 25 г/л + 15 г/л				
ВИНЦИТ ФОРТЕ, к.с. (37,5 г/л+ 25 г/л + 15 г/л) Кеминова А/С, Дания 18.01.2028 г.	1,0-1,2	Пшеница яровая	Твердая, пыльная, головня, плесневение семян, корневые гнили	Протравливание семян суспензией препарата (10 л воды на 1 т семян)
	1,1-1,25	Ячмень яровой	Пыльная, каменная головня, плесневение семян, корневые гнили	
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 75 г/л + 50 г/л + 15 г/л				
ОЛИМП, к.с. (75 г/л + 50 г/л + 15 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия	0,5-0,6	Пшеница яровая	Твердая, пыльная, головня, плесневение семян, корневые гнили	Протравливание семян суспензией препарата
	0,6	Ячмень яровой	Твердая, каменная, головня, плесневение семян, корневые гнили	
	0,5-0,6	Лен масличный	Антракноз, фузариоз	

30.07.2031 г.	0,5-0,6	Горох, чечевица	Корневые гнили, аскохитоз	(10 л воды на 1 т семян)
---------------	---------	-----------------	---------------------------	--------------------------

Флутриафол + флудиоксонил

ПРОТЕКТ ФОРТЕ, в.с.к. (40 г/л + 30 г/л) ООО «Агро Эксперт Групп», Россия 01.02.2028 г.	1,0-1,25	Пшеница яровая	Пыльная, твердая головня, корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян суспензией препарата (10 л воды на 1 т семян)
	1,0-1,25	Ячмень яровой	Пыльная, каменная головня, корневые гнили, плесневение семян	
30.01.2029 г.	0,8-1,0	Кукуруза	Пыльная, пузырчатая головня, плесневение семян, фузариоз, корневые и стеблевые гнили	
	5,0	Подсолнечник	Альтерналиоз, прикорневые гнили (виды), белая гниль, фузариозная прикорневая гниль, серая гниль, плесневение семян	
	0,8-1,0	Горох	Корневые гнили, серая гниль, антракноз, аскохитоз, фузариоз, плесневение семян	
	1,0-1,25	Пшеница озимая	Пыльная головня, твердая головня, корневые гнили, плесневение семян	

Флуаксапироксад

СИСТИВА, к.э. (333 г/л) BASF SE, Германия 01.11.2029 г.	0,5-1,0	Ячмень яровой	Каменная головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян	Протравливание семян суспензией препарата (10 л воды на 1 т. Семян)
---	---------	---------------	---	---

Хлорантранилипрол

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 625 г/л				
Люмивия, т.с. (625 г/л) ТОО «Кортева Агрисаенс Казахстан» П-3 20.03.2036 г.	2,7-4,0-5,4	Кукуруза	Полосатая хлебная блошка, подгрызающие совки, проволочники	Обработка семян. Расход рабочей жидкости 13-14-15 л/т семян
	11,4-15,0-17,8	Рапс	Крестоцветные блошки, рапсовый пилильщик, капустная моль, капустная тля	Обработка семян. Расход рабочей жидкости 22-25-28 л/т семян.

ГЕРБИЦИДЫ

Торговое название, препаративная форма, фирма-регистрант. Дата окончания срока регистрации (число, месяц, год)	Норма расхода препарата (л/га, кг/га)	Культура, обрабатываемый объект	Вредный объект	Способ, время обработки, ограничения	Срок последней обработки и, в днях до сбора урожая, в () максимальная кратность обработок
--	---------------------------------------	---------------------------------	----------------	--------------------------------------	---

2,4-Д (смесь аминных солей)

АЙКОН ФОРТЕ, в.к. (550 г/л) ООО «Агро Эксперт Групп», Россия П-3 21.02.2027 г.	0,5-1,0	Пшеница яровая	Однолетние и некоторые многолетние двудольные, в том числе бодяк полевой	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости 150-200 л/га	-1
	0,5-1,0	Ячмень яровой			-1
	0,5-1,0	Пшеница озимая		Опрыскивание посевов рано весной в фазе кущения культуры. Расход рабочей жидкости 150-200 л/га	-1

2,4-Д (диметиламинная соль)

Концентрация д.в. (+/- 5%) – 720 г/л					
2,4-Д БЕРЕЖЕ 72%, в.р. (720 г/л) Моер Кемсайенс Ко., Лтд., Китай П-4 10.12.2028 г.	0,8-1,0	Пшеница и ячмень яровые, пшеница озимая	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры	-1
АМИНСПРЕЙ, в.р. (720 г/л) ШАНДОНГ ВЕЙФАНГ РЕЙНБОУ КЕМИКАЛ КО., ЛТД, П-4 12.06.2027 г.	0,8-1,0	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры – выхода в трубку	-1
ВАЛСАМИН 72%, в.р. (720 г/л) Стоктон Кемикал Корпорейшн, США П-4 12.02.2030 г.	1,0-1,4	Пшеница яровая	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры	-1
ГЕКСИЛ ЭКСТРА, в.р. (720 г/л) ТОО «Агро-Хим-Лидер» П-4 13.04.2032 г.	1,0-1,5	Кукуруза	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов культуры в фазы 3-5 настоящих листьев	-1
	1,0-1,25	Пшеница яровая, озимая и ячмень яровой	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры.	-1
ГРЕЙН ЭКСТРА 2,4-Д в.р. (720 г/л) ТОО «Аgro Mark Kaz» П-4 07.06.2033 г.	1,0-1,25	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку	-1
ДИКАМИН Д, 72% в.р. (720 г/л) Лейтон Агрио Европа Кфт., Венгрия П-4 24.02.2036 г.	1,0-1,25	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку	60(1)
КОРСО 72%, в.р. (722 г/л) ТОО «Бартонс Кемикал ГмбХ» П-3 17.02.2030 г.	1,0	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры	-1
НАНКИНА, в.р. (720 г/л) Nanjing Rinchen International Trading Co.LTD П-3 12.08.2032 г.	1,0 – 1,2	Пшеница яровая, пшеница озимая, кукуруза	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода трубку. Опрыскивание кукурузы фазе 3 -5 листьев культуры	(1)
ПИЛАР 2,4-Д, 72% в.р. (720 г/л) Пиларквим (Шанхай) Ко., Лтд., Китай П-4 24.02.2027 г.	1,0	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры	-1
ПРОГРЕС 720, в.р. (720 г/л) Синтезия Кемп ГмбХ, Германия П-3 06.03.2033 г.	0,35- 0,5	Пары	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков	-(1)
	0,35- 0,5	Поля, предназначенные под посев зерновых культур	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или осенью. Применяется в качестве добавки к глифосатам	-(1)
	0,7 – 1,0	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры до выхода в трубку	-(1)
СТРИГ 72%, в.р. (720 г/л) ТОО «Агро Глобал» П-4 24.10.2026 г.	0,8-1,2	Пшеница яровая	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры	-1
СУПЕРМЕН, в.р. (720 г/л) SHANDONG BINNONG TECHNOLOGY CO., LTD П-3 31.07.2033 г.	1,0-1,2	Кукуруза	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры	-1
	1,0-1,2	Кукуруза	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку	-1

ФАНАТ, в.р. (720 г/л) Лейтон Агрио Европа Кфт. Венгрия, П-3 05.03.2029 г.	0,7-1,0	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кушения культуры до выхода в трубку	-1
	0,7-1,0	Овес	Однолетние двудольные сорняки		
	0,8-1,0	Просо	Однолетние двудольные сорняки		
	0,8-1,0	Сорго	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры	
	0,9-1,3	Кукуруза	Однолетние двудольные сорняки		
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 860 г/л					
ПРОГРЕСС 860, в.р. (860 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-3 26.01.2027 г.	0,7-0,8	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу кушения культуры	-1
РИГРЭКС, в.р. (860 г/л) Цзянсу Хуейфен Био Агрикалче Ко., Лтд, Китай П-3 04.02.2029 г.	0,75-1,0	Пшеница яровая и озимая	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу кушения культуры	-1
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 960 г/л					
КЛИНСПРЕЙ ЭКСТРА, в.г. (960 г/кг) ШАНДОНГ ВЕЙФАНГ РЕЙНБОУ КЕМИКАЛ КО., ЛТД, П-3 29.06.2027 г.	0,6-0,75	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу кушения культуры до выхода в трубку	-1

2,4-Д кислота (2-этилгексильный эфир)

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 500 г/л					
ЗЕРНОМАКС, к.э. (500 г/л) АО Фирма «Август» П-3 02.04.2036 г.	0,5-0,7	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры. Озимая пшеница обрабатывается весной. Расход рабочей жидкости 50 -300 л/га.	55 (1)
	0,7-0,9	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Многолетние двудольные сорняки		
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 564 г/л					
ШАНС 24, к.э. (564 г/л) ООО «Шанс» П-3 05.01.2033 г.	0,6-0,8	Пшеница, ячмень яровые	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га.	60(1)
	0,8	Пшеница озимая	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки		
ЭНДИМИОН, к.э. (564 г/л) АО «ФМРУС» П-3 18.02.2029 г.	0,6-0,8	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние и некоторые многолетние (бодяк полевой) двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	60 (1)
	0,6-0,8	Пшеница озимая	Однолетние и некоторые многолетние (бодяк полевой) двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры весной. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	60 (1)
ЭЛАНТ, к.э. (564 г/л) ФОРВАРД П-3 16.01.2028 г.	0,6-0,8	Пшеница яровая	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков	-1
	0,7-0,8	Ячмень яровой	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков	-1
	0,8-1,2	Кукуруза	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-4 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков	-1
	0,2-0,5	Поля, предназначенные под посев различных сельскохозяйственных культур	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки Применяется в качестве добавки (баковая смесь) к глифосатосодержащим гербицидам.	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или осенью до посева или до всходов культуры. Расход рабочей жидкости 200- 300 л/га - (1)	- (1)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 600 г/л					
ДРОТИК, к.к.р. (600 г/л) АО «Щелково Агрохим» П-3 08.04.2032 г.	0,45-0,65	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание в период вегетации	-1
	0,8-1,0	Пшеница яровая, ячмень яровой	Многолетние двудольные сорняки, в т.ч. выюнок полевой, бодяк полевой, молочай лозный, молокан татарский и др. злостные сорняки		
ИНТЕЛ СЭФИР, к.э. (600 г/л) ТОО «А.С.К. Казахстан» П-2 28.02.2032 г.	0,4-0,6	Пшеница яровая	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки (осоты)	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков	-1
	0,4-0,6	Ячмень яровой		Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков	-1
	0,4-0,6	Пшеница озимая		Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев культуры	-1
	0,5-0,7	Кукуруза		Опрыскивание посевов в фазе 3-4 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков	-1
ЭСТЕТ, к.э. (600 г/л) Нуфарм, Австрия П-3 29.10.2028 г.	0,4-0,6	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки (осоты)	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков	-1

27.03.2029 г.	0,3-0,4	Поля, предназначе нные под посев пшеницы яровой и озимой, ячменя ярового и кукурузы	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или осенью до посева культуры	-1
	0,5-0,7	Кукуруза	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-4 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков	-1
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 720 г/л					
Д-АРМОН-Эфир 72%, к.э. (720 г/л) ДВА Агро ГмбХ, Германия П-4 13.01.2031 г.	0,6-0,8	Пшеница и ячмень яровые, пшеница озимая	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание в период вегетации	-1
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 850 г/л					
ТАУЭРСПРЕЙ 85%, к.э. (850 г/л) ШАНДОНГ ВЕЙФАНГ РЕЙНБОУ КЕМИКАЛ КО., ЛТД, П-3 11.04.2027 г.	0,6-0,8	Пшеница яровая	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу кущения до выхода в трубку	-1
19.04.2029 г.	0,6-0,8	Ячмень яровой	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры	-1
ЭФИОН, к.э. (850 г/л) Лейтон Агрио Европа КФТ Венгрия П-3 14.03.2027 г.	0,6-0,8	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры	-1
21.02.2030 г.	0,3-0,8	Поля предназначе нные под посев с/х культур	Однолетние двудольные и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной в качестве добавки к глифосат-содержащим гербицидам	-1
Эфикор, э.к. (850 г/л) ТОО «Бартонс Кемикал ГмбХ» П-3 19.12.2035 г.	0,4-0,8	Пшеница яровая	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры до выхода а трубку	-1
ЭФИР КОРСО, э.к. (850 г/л) ТОО «Бартонс Кемикал Гмбх» П-3 17.02.2030 г.	0,4-0,8	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу кущения до выхода в трубку	-1
ЭФФЕКТ, к.э. (850 г/л) ТОО «QADAM Group» (Кадам Групп) П-3 10.07.2036 г..	0,4-0,6	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков	-1
	0,6-0,8	Пшеница и ячмень яровые	Многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку	-1
	0,8	Кукуруза	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков.	-1
	0,8	Кукуруза	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или осенью до посева культуры	-(1)
	0,6-0,8	Пшеница и ячмень яровые	Многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или осенью до посева культуры	-(1)
	0,4-0,6	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или осенью до посева культуры	-(1)
ЭФЕРОН-ГОЛД к.э. (875 г/л) ТОО «GOOD JOB INDUSTRYKAZAKHSTAN» («ГУД ДЖОБ ИНДАСТРИКАЗАХСТАН») П-3 03.05.2032 г.	0,4-0,6	Пшеница и ячмень яровые, пшеница озимая	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	От фазы кущения до фазы первого междоузлия у культуры. Расход рабочей жидкости 250-400 л/га.	-(1)
	0,8-1,0	Кукуруза	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости 250 -400 л/га	-(1)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 905 г/л					
ГЕКСИЛ 905, к.э. (905 г/л) ТОО «Explanta» П-3 27.02.2028 г.	0,4-0,6	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки (осоты)	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	-1
	0,6-0,8	Кукуруза	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки (осоты)	Опрыскивание посевов в фазе 3-4 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	-1
Гексилен 905, к.э. (905 г/л) ТОО «Агро-Хим-Лидер» П-3 24.12.2034 г.	0,4-0,6	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки (осоты)	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры до выхода в трубку. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	-1
	0,6-0,8	Кукуруза	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки (осоты)	Опрыскивание посевов в фазе 3-4 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	-1
ГРЕЙН ЭФИР, к.э. (905 г/л), ТОО «Agro Mark Kaz» П-4 10.01.2032 г.	0,4-0,6	Пшеница яровая, ячмень яровой кукуруза	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки (осоты)	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры до выхода в трубку	-1
	0,6-0,8			Опрыскивание посевов в фазе 3-4 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков	
НИОФИР СУПЕР, к.э. (905 г/л)	0,4-0,6	Пшеница и ячмень яровые, пшеница озимая	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры до выхода в трубку	-1

ЛЕЙТОН АГРИО ЕВРОПА КФТ ВЕНГРИЯ П-4 28.03.2032 г.	0,2-0,7	Поля, предназначе нные под посев с/х культур	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной	-1
ПРОГРЕСС, к.э. (905 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-3 02.08.2031 г.	0,4-0,6	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры до выхода в трубку	-1
	0,3-0,4	Поля, предназначенные под посев зерновых культур	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или осенью. Применяется в качестве добавки к глифосатам	-(1)
	0,3-0,4	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Применяется в качестве добавки к сульфонилмочевинам при опрыскивании посевов в фазе кущения культуры	-(1)
РОБУСТО СУПЕР, к.э. (905 г/л) Юнайтед Агри-Кемикал Компани ГмбХ, Швейцария П-3 12.04.2031 г.	0,4-0,6	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки (осоты)	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры до выхода в трубку	-1
СВАРОГ КЛАССИК, к.э. (904 г/л) ООО «Франдеса», Беларусь П-3 04.07.2029 г.	0,4-0,6	Пшеница яровая и ячмень яровой	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку	-1
	0,6-0,8	Пшеница яровая и ячмень яровой	Многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку	-
ЭКСПЕРТ (905 г/л) ТОО «Айбад-2015» П-3 11.06.2031 г.	0,4-0,6	Пшеница и ячмень яровые	Комплекс однолетних и многолетних двудольных сорняков	Опрыскивание проводить в момент активного роста сорняков в фазу 2-10 листьев у однолетних и 10-15 см (розетка) у многолетних двудольных сорняков	-(3)
Ультра Голд, к.э. (905 г/л) ТОО «Golden Agro Plant» П-3 16.04.2036 г.	0,4-0,6	Пшеница яровая	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки (осоты)	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры до выхода в трубку	-(1)
	0,4-0,6	Ячмень яровой	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки (осоты)	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры до выхода в трубку	-(1)
FORTEK, к.э. (905 г/л) ТОО «Farm Agrochemical Products» П-3 08.04.2034 г.	0,4-0,6	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры до выхода в трубку.	54 (1)
ЭСТЕР СУПЕР, к.э. (905 г/л) ARCUS INVEST HOLDING B.V. П-3 04.03.2030 г.	0,4-0,6	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры до выхода в трубку	60 (1)
	0,1-0,2	Поля, предназначе нные под посев зерновых и других сельскохозяйстве нных культур	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Применяется в качестве добавки (баковая смесь) к глифосатсодержащим гербицидам (ТРИУМФ Мастер, в.р., ТРИУМФ Супер, в.д.г.). Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или осенью до посева или до всходов культуры. Расход рабочей жидкости 200л /га.	-(1)
ЭФИОН СУПЕР, к.э. (905 г/л) Лейтон Агрио Европа КФТ Венгрия П-3 21.02.2030 г.	0,4-0,6	Пшеница и ячмень яровые, пшеница озимая	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры до выхода в трубку	-1
	0,2-0,7	Поля предназначе нные под посев с/х культур	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной	-1
ЭФИР ЭКСТРА 905 к.э. (905 г/л) ТОО «Астана-Нан» П-4 27.06.2033 г.	0,6-0,8	Кукуруза	Однолетние и некоторые многолетние двудольные злаковые сорняки (осоты)	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков	(1)
	0,4-0,6	Озимая пшеница	Однолетние и некоторые многолетние двудольные злаковые сорняки (осоты)	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков	(1)
	0,4-0,6	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние и некоторые многолетние двудольные злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков	(1)
	0,4-0,6	Поля, предназначе нные под посев с/х культур	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или осенью до посева культуры	(1)
ЭФИРАКС, к.э. (905 г/л) ТОО «Агро Глобал» П-3 08.01.2029 г.	0,4-0,6	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки (осоты)	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков	-1
Экстратим 905, к.э. (905 г/л) ТОО «EcoSave» П-3 20.03.2036 г.	0,4-0,8	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние и многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе Кущения культуры до выхода в трубку	-1
ЭСТОР 905, к.э (905 г/л) SHANDONG BINNONG TECHNOLOGY CO., LTD. П-3 01.04.2036 г.	0,4-0,6	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние и многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	-(1)
	0,3-0,4	Поля, предназначенные под посев зерновых и других сельскохозяйстве нных культур	Однолетние и многолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения	Применяется в качестве добавки (баковая смесь) к глифосатсодержащим гербицидам. Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или осенью до посева или до всходов культуры	-(1)
Enfester, к.э (905 г/л)	0,4-0,8	Ячмень яровой	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры до выхода в трубку	-1

THAI HARVEST LIMITED П-3 09.04.2036 г.	0,4-0,8	Пшеница яровая	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры до выхода в трубку	-1
	0,4-0,8	Пшеница озимая	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры до выхода в трубку	-1
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 950 г/л					
ЗЕНИТ, к.к.р. (950 г/л) АО «Щелково Агрохим» П-3 12.02.2031 г.	0,3-0,4	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры	-1
	0,55-0,65	Пшеница и ячмень яровые	Многолетние двудольные сорняки, в т.ч. выюнок полевой, бодяк полевой, молочай лозный, молокан татарский и другие злостные сорняки		-1
	0,3-0,5	Кукуруза	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу 2-6 листьев культуры	-1
	0,1-0,2	Поля, предназначе нные под посев зерновых и других сельскохозяйс твенных культур	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Применяется в качестве добавки (баковая смесь) к глифосатсодержащим гербицидам (Спрут, Спрут Экстра). Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или осенью до посева или до всходов культуры. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	-1
	0,2-0,4	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние и многолетние (в т.ч. виды бодяка и осота, молочай лозный, выюнок полевой и др.) двудольные сорняки	Применяется в качестве добавки (баковая смесь) к сульфенилмочевинам (Зингер, Гранат). Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	-1
	0,3-0,4	Пшеница озимая	Однолетние и некоторые многолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры до выхода в трубку	-(1)
	0,55-0,65	Пшеница озимая	Многолетние двудольные, в т.ч. выюнок полевой, бодяк полевой, молочай лозный, молокан татарский, и другие злостные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры до выхода в трубку	-(1)
КЛИАРАП, к.э. (950 г/л) Цзянсу Хуейфен Био Агрикалче Ко., Лтд, Китай П-3 04.02.2029 г.	0,55-0,65	Пшеница яровая и озимая	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры	-1
ЭФИРОМАКС 950 к.э. (950 г/л) ТОО «Достык-Агро 2012» П-3 09.02.2034	0,3-0,4	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры	-1
	0,55-0,65		Многолетние двудольные сорняки в т.ч. выюнок полевой, бодяк полевой, молочай лозный, молокан татарский и другие злостные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры	
	0,1-0,2	Поля, предназначенные под посев различных с/х культур	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Применяется в качестве добавки (баковая смесь) к глифосатсодержащим гербицидам. Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или осенью до посева или до всходов культуры	
	0,3-0,5	Кукуруза	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры	
ЭФИР 960, к.э. (960 г/л) Hangzhou Ruijiang Crop Science Co., Ltd., Китай П-3 08.02.2029 г.	0,3-0,5	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры до выхода в трубку	-1
	0,5-0,6	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Многолетние двудольные сорняки		-1
	0,4-0,6	Кукуруза	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу 2-3 листьев культуры	-1
	0,2-0,3	Поля, предназначе нные под посев зерновых сельскохозяйс твенных культур	Однолетние и многолетние (в т. ч. Виды бодяка и осота, молочай лозный, выюнок полевой и др.) двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной до посева культуры. Применяется в качестве добавки к глифосатсодержащим гербицидам, дикамбе и гербицидам группы сульфенилмочевины	-(1)
Эфир Терра, к.э. (950 г/л) ТОО «Terra Prime» П-3 16.04.2036 г.	0,3-0,4	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры	60 (1)
	0,2-0,7	Поля, предназначенные под посев сельскохозяйс твенных культур	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной	-1
	0,4-0,7	Пары	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки (осоты)	Опрыскивание вегетирующих сорняков	-1

2,4-Д кислота (2 этилгексильовый эфир + диметилалкил-аминная соль)

ОКТАПОН СУПЕР, к.э. (630 г/л (470 г/л + 160 г/л) ООО «АХК-АГРО», Россия П-3 25.06.2029 г.	0,4-0,6	Пшеница яровая и озимая	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки (осоты)	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры до выхода в трубку	-1
	1,5-2,0	Пары	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки (осоты)	Опрыскивание вегетирующих сорняков	-1

2,4-Д кислота (малолетучие эфиры)

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 500 г/л					
ЭФИРАМ, к.э. (500 г/л)	0,6-0,8	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры	58 (1)

ООО «Резерв», Россия П-3 11.07.2027 г.	0,8-0,9	Кукуруза	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры	60 (1)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 550 г/л					
АЙКОН, к.э. (С7-С9) (550 г/л) ООО «Агро Эксперт Групп», Россия П-3 14.04.2031 г.	0,6-0,8	Пшеница яровая	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры	-1
	0,6-0,8	Ячмень яровой			-1
	0,6-0,9	Кукуруза		Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры	-1
Торес, к.э. (550 г/л) Представительство ООО «ЗЕМЛЯКОФФ КРОП ПРОТЕКШЕН» в РК П-3 16.06.2035 г.	0,5-0,7	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры. Расход рабочей жидкости 150-200 л/га	58 (1)
	0,7-0,9	Кукуруза	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры. Расход рабочей жидкости 150- 200 л/га	60 (1)

2,4-Д кислоты (2-этилгексильный эфир) + бромексинил

ПРОГРЕСС ФОРТЕ, к.э. (500 г/л + 100 г/л) Синтезия Хеми ГмбХ, Германия П-3 13.03.2028 г.	0,3-0,5	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры	-1
---	---------	-------------------------	---	--	----

2,4-Д кислота (диметиламинная соль) + дикамба (натриевая соль)

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 344 г/л + 120 г/л					
ДАБСПРЕЙ, в.р. (357 г/л + 124 г/л) ШАНДОНГ ВЕЙФАНГ РЕЙНБОУ КЕМИКАЛ КО., ЛТД, П-3 29.12.2027 г.	0,5-0,7	Пшеница яровая	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры	-1
	1,25-1,5	Кукуруза	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры	-1
ДИКОПУР ТОП, в.р. (344 г/л + 120 г/л) Нуфарм, Австрия П-4 14.12.2028 г.	0,5-0,7	Пшеница и ячмень яровые, овес	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков	-1
	0,4-0,6	Пшеница озимая	Однолетние и многолетние двудольные сорняки		-1
	1,0-1,5	Кукуруза	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-4 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков	-1
ВИДМАСТЕР 480, в.р. (357 г/л + 124 г/л) Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария П-4 06.03.2033 г.	1,25-1,5	Кукуруза	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание в фазе 3-5 листьев культуры	-1
	0,5-0,7	Яровая пшеница	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание в фазе кущения культуры	-1
17.05.2027 г.	0,5-0,7	Озимая пшеница	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание в период вегетации	-1
	0,5-0,7	Ячмень яровой			
САНШАЙН, в.р. (356 г/л + 124 г/л) SHANDONG BINNONG TECHNOLOGY CO., LTD. П-3 31.07.2033 г.	0,5-0,7	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры	-1
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 447 г/л + 156 г/л					
Биолан Супер, в.р. (447 г/л + 156 г/л) АО Фирма «Август» П-3 11.02.2035 г.	0,3-0,5	Пшеница яровая озимая, ячмень яровой	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4- Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку. Расход рабочей жидкости 50-300 л/га	60 (1)
	0,75-1,15	Кукуруза	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4- Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание в фазе 3-5 листьев культуры. Расход рабочей жидкости 50- 300 л/га	60 (1)

2,4-Д кислоты (диметиламинная соль) + дикамба (диметиламинная соль)

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 344 г/л + 120 г/л					
АНТАЛ, в.р. (357 г/л + 124 г/л) Лейтон Агрио Европа КФТ Венгрия П-3 22.02.2029 г.	0,5-0,7	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры	-1
ДИАЛЕН СУПЕР 480, в.р. (357 г/л + 124 г/л) Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария П-3 02.12.2032 г.	0,5-0,7	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние и многолетние двудольные	Опрыскивание в фазе кущения культуры	-1
	1,25-1,5	Кукуруза	Однолетние и многолетние двудольные	Опрыскивание в фазе 3-5 листьев культуры	-1
ДИАМАКС, в.р. (344 г/л + 120 г/л) ООО «Агро Эксперт Групп», Россия П-3 13.12.2034 г.	0,5-0,7	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние и некоторые многолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4- Д и 2М-4Х, а также виды осота (бодяк и другие)	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га.	-1

	1,25-1,5	Кукуруза	Однолетние и некоторые многолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4- Д и 2М-4Х, а также виды осота (бодяк и другие)	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га.	-1
СТРИГ ЭКСТРА 480, в.р. (357 г/л + 124 г/л) ТОО «Агро Глобал» П-4 20.08.2029 г.	0,5-0,7	Пшеница яровая	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание в фазе кущения культуры	-1
	1,25-1,5	Кукуруза	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры	-1

2,4-Д кислоты (2-этилгексильный эфир) + дикамба (2-этилгексильный эфир)

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 552 г/л + 60 г/л					
БРЭМБО, к.э. (552 г/л + 60 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-3 18.03.2029 г.	0,3-0,5	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры. Расход рабочей жидкости – 150-200 л/га	-1
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 420 г/л + 60 г/л					
ЭЛАНТ ПРЕМИУМ, к.э. (420 г/л + 60 г/л) ООО "Форвард", Россия П-4 16.01.2028 г.	0,6-0,8	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные (вьюнок)	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков	-1
	0,8-0,9	Кукуруза		Опрыскивание посевов в фазе 3-4 листьев культуры	

2,4-Д кислоты (2-этилгексильный эфир) + метсульфурон-метил

ЭЛАМЕТ, заводская бинарная упаковка (564 г/л + 600 г/кг) ООО "Форвард", Россия П-4 16.01.2028 г.	0,4-0,5	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х и некоторые многолетние двудольные в т.ч. корнеотпрысковые	Опрыскивание посевов весной в фазе от начала до конца кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Применять на почвах с pH не выше 7, 5. При необходимости пересева высевать только озимую и яровую пшеницу	-1
---	---------	-------------------------	--	--	----

2,4-Д кислоты (сложный 2-этилгексильный эфир) + флуороксибир + флорасулам

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 285 г/л + 30,5 г/л + 11,5 г/л					
ПРИШАНС СУПЕР, с.э. (285 г/л + 30,5 г/л + 11,5 г/л) ООО «Шанс» П-3 07.03.2029	0,4–0,6	Пшеница яровая и озимая	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные -«-	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Озимые обрабатываются весной. Расход рабочей жидкости – 200-200 л/га	61(1)
	0,8-0,9	Ячмень яровой и озимый			
Концентрация д.в. (+/- 5%)~410 г/л + 50 г/л + 5 г/л					
ДИСКАТОР ФОРТЕ, к.э. (410 г/л + 50 г/л + 5 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ», Германия П-3 13.03.2028 г.	0,3-0,4	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры	-1

2,4-Д кислота (сложный 2-этилгексильный эфир) + пиклорам + флорасулам

БАЛЕРИНА ФОРТЕ, с.э. (300 г/л + 37,5 г/л + 10 г/л) АО Фирма «Август» П-3 20.06.2032 г.	0,5-0,75	Кукуруза	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4- Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости 50-300 л/га	-(1)
	0,5-0,75	Пшеница яровая	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2, 4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в период кущения - выход в трубку (1-2 междоузлия) культуры. Расход рабочей жидкости - 50- 300 л/га	-(1)
	0,5-0,75	Ячмень яровой	Некоторые многолетние двудольные и однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в период кущения – выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры. Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	57 (1)

2,4-Д кислота (сложный 2-этилгексильный эфир) + аминопиралид+ флорасулам

ФОРТИССИМО, м.д. (300 г/л + 10 г/л + 5 г/л) АО «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ» Россия П-3 12.06.2035 г.	0,4-0,7	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние и многолетние двудольные сорняки, включая подмаренник цепкий, виды осота, бодяка, горчак ползучий, падалица подсолнечника	Опрыскивание посевов от фазы кущения до фазы второго междоузлия культуры (включительно)	46(1)
---	---------	-------------------------	--	---	-------

2,4-Д кислота (сложный 2-этилгексильный эфир) + триасульфурон

БИАТЛОН, заводская бинарная упаковка (564 г/л + 750 г/кг) ООО "Форвард", Россия П-4 16.01.2028 г.	0,4-0,5	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние и некоторые многолетние двудольные (бодяк, осот, вьюнок), в т.ч. устойчивые к 2,4- Д и 2М-4Х	Опрыскивание посевов весной в фазе от начала до конца кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Применять на почвах с pH не выше 7,5. При необходимости пересева высевать только озимую и яровую пшеницу	-1
--	---------	-------------------------	---	---	----

2,4-Д кислоты (сложный 2-этилгексильный эфир) + флорасулам

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 300 г/л + 3,7 г/л					
--	--	--	--	--	--

ПРИМАДОННА, с.э. (300 г/л + 3,7 г/л) АО «Щелково Агрохим» П-4 17.03.2031 г.	0,4-0,9	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу начала кущения – выход в трубку (до появления второго междоузлия).	-1
	0,4-0,9	Кукуруза	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазу 3-7 листьев культуры	-1
	0,4-0,9	Пшеница озимая, ячмень озимый	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазу начала кущения – выход в трубку культуры и ранние фазы роста сорняков	-1
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 300 г/л + 5,35 г/л					
АССОЛЮТА, м.к. (300 г/л + 5,35 г/л) ООО «Агро Эксперт Групп», Россия П-3 21.02.2027 г.	0,4-0,6	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Озимые обрабатывают весной. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га.	-1
	0,6	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков. Озимые обрабатывают весной. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га.	-1
	0,4-0,6	Кукуруза	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га.	-1
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 300 г/л + 6,25 г/л					
АЛТАИР, с.э. (300 г/л + 6,25 г/л) ООО «Интер Групп» П-1 27.12.2034 г.	0,4-0,6	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2 М-4Х и некоторые многолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га.	56 (1)
	0,6	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2 М-4Х и некоторые многолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков (с учетом чувствительности сортов) в случае преобладания подмаренника цепкого; если погодные условия не позволили произвести обработку раньше этого срока. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га.	56 (1)
	0,4-0,6	Кукуруза	Однолетние сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4- Д и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га.	60 (1)
	0,5-0,6	Кукуруза	Однолетние сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4- Д и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 5-7 листьев культуры в случае преобладания подмаренника цепкого; если погодные условия не позволили произвести обработку раньше этого срока. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га.	60 (1)
ЛАМБАДА, с.э. (300 г/л + 6,25 г/л) Лейтон Агрио Кфт., Венгрия П-3 05.03.2029 г.	0,4-0,9	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку	-1
	0,4-0,6	Кукуруза	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу 3-5 листьев культуры	-1
ОКТАСУЛАМ, с.э. (300 г/л + 6,25 г/л) ООО «Ахк-агро» П-3 12.08.2032 г.	0,4-0,6	Кукуруза	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2, 4-Д и 2М-4Х и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 и 5-7 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков-1	-1
	0,4-0,6	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2, 4-Д и 2М-4Х и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения-выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры	-1
ПРИШАНС, с.э. (300 г/л + 6,25 г/л) ООО «Шанс» П-3 28.03.2029 г.	0,4-0,6	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Озимые обрабатываются весной. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	56 (1)
	0,6	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4- Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков (с учетом чувствительности сортов) в случае преобладания подмаренника цепкого; если погодные условия не позволили произвести обработку раньше срока. Озимые обрабатываются весной. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	56 (1)
	0,4-0,6	Кукуруза	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	60 (1)

	0,5-0,6	Кукуруза	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 5-7 листьев культуры двудольные сорняки в случае преобладания подмаренника цепкого; если погодные условия не позволили произвести обработку раньше срока. Озимые обрабатываются весной. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60 (1)
Концентрация д.в. (+/- 5%)– 350 г/л + 7,4 г/л					
ФЕНОМЕН, с.э. (350 г/л + 7,4 г/л) ТОО «QADAMGroup (КАДАМГрупп)» Казахстан П-3 25.09.2029 г.	0,3-0,5	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в период от начала кущения культуры до появления второго междоузлия	-1
	0,3-0,5	Кукуруза	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание в период вегетации	-1
Концентрация д.в. (+/- 5%)– 410 г/л + 7,4 г/л					
АСТЭРИКС, с.э. (410 г/л + 7,4 г/л) ТОО «ФМРус» П-3 13.10.2033 г.	0,3-0,5	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до появления второго междоузлия	-(1)
	0,3-0,5	Кукуруза	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60(1)
АБСИНТИУМ, с.э. (410 г/л + 7,4 г/л) ТОО «Агро Глобал Казахстан» П-3 31.01.2030 г.	0,3-0,5	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в период от начала кущения культуры до появления второго междоузлия (фаза 32 по Задоксу)	-(1)
БАЛЕРИНА, с.э. (410 г/л + 7,4 г/л) АО Фирма «Август» П-4 01.10.2030 г.	0,3-0,5	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в период от начала кущения культуры до появления второго междоузлия (фаза 32 по Задоксу)	-1
10.02.2032 г.	0,3-0,5	Кукуруза	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков	-1
Бернар, с.э. (410 г/л + 7,4 г/л) ТОО «MKR PLUS» П-3 26.05.2036 г.	0,3-0,5	Сорго	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы развития сорняков. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	60(1)
	0,3-0,5	Кукуруза	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	60(1)
	0,5	Ячмень яровой	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков (с учетом чувствительности сортов) в случае преобладания подмаренника цепкого; если погодные условия не позволили произвести обработку раньше срока. Озимые обрабатывают весной. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	60(1)
	0,5	Пшеница озимая	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков (с учетом чувствительности сортов) в случае преобладания подмаренника цепкого; если погодные условия не позволили произвести обработку раньше срока. Озимые обрабатывают весной. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	60(1)
	0,5	Пшеница яровая	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков (с учетом чувствительности сортов) в случае преобладания подмаренника цепкого; если погодные условия не позволили произвести обработку раньше срока. Озимые обрабатывают весной. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	60(1)
	0,3-0,5	Ячмень яровой	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Озимые обрабатывают весной. Расход рабочей жидкости - 200–400 л/га	60(1)
	0,3-0,5	Пшеница озимая	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Озимые обрабатывают весной. Расход рабочей жидкости - 200–400 л/га	60(1)
	0,3-0,5	Пшеница яровая	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Озимые обрабатывают весной. Расход рабочей жидкости - 200–400 л/га	60(1)
ДИСКАТОР, к.э. (410 г/л + 7,4 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-3 26.01.2027 г.	0,3-0,5	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры	-1

ЭКСПЕРТ ПРЕМИУМ, с.э. (410 г/л + 7,4 г/л) ТОО «АЙБАД-2015» П-3 22.04.2035 г.	0,3-0,5	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки(осоты)	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков	-1
	0,3-0,5	Кукуруза	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание в период вегетации	-1
ЭФИР ПРЕМИУМ, с.э. (410 г/л + 7,4 г/л) ТОО «Астана-Нан» П-2 13.03.2035 г.	0,3-0,5	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и до появления второго междоузлия (фаза 32 по Задоксу)	-1
	0,3-0,5	Озимая пшеница	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков	(-1)
	0,3-0,5	Яровой ячмень	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивани е посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков	(-1)
	0,3-0,5	Овёс	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивани е посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков	(-1)
	0,3-0,5	Кукуруза	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков	(-1)
ЭСТЕР ПРИМА с.э. (410 г/л + 7,4 г/л) ARCUS INVEST HOLDING B.V. П-4 10.10.2032 г.	0,3-0,5	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскиваниепосевов в фазе кущения культуры	(1)
	0,3-0,5	Суданская трава	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу 3-5 листьев культуры	(-1)
ЭЛАНТ ЭКСТРА, к.э. (410 г/л + 7,4 г/л) ООО «Форвард», Россия П-3 23.04.2028 г.	0,3-0,5	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние двудольные и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до появления второго междоузлия и ранние фазы роста сорняков	-1
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 410 г/л + 15 г/л					
АССОЛЮТА ПРАЙМ, м.к. (410 г/л + 15 г/л) ООО «Агро Эксперт Груп», Россия П-3 17.03.2030 г.	0,3-0,5	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние двудольные и некоторые многолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазе от начала кущения культуры до появления второго междоузлия. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га.	-1
	0,3-0,5	Пшеница озимая	Однолетние двудольные и некоторые многолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазе от начала кущения культуры до появления второго междоузлия Озимые обрабатывают весной. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га..	-1
	0,3-0,5	Кукуруза	Однолетние двудольные и некоторые многолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га.	-1
БАЛЕРИНА СУПЕР, с.э. (410 г/л + 15 г/л) АО Фирма «Август» П-3 13.06.2031 г.	0,3-0,5	Пшеница яровая, ячмень яровой, овес, просо	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М- 4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости 50-300 л/га	-1
	0,5	Пшеница яровая и озимая, овес		Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости 50-300 л/га	
	0,3-0,5	Пшеница озимая		Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости 50- 300 л/га	
	0,3-0,5	Кукуруза		Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости 50- 300 л/га	
	0,5	Ячмень яровой		Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры. Расход рабочей жидкости 50-300 л/га	60 (1)
Экстратим Форте, с.э. (410 г/л + 15 г/л) ТОО «EcoSave» П-3 18.03.2036 г.	0,3-0,5	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние и многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в период от начала кущения культуры до появления второго междоузлия (фаза 32 по Задоксу)	- (1)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 418 г/л + 12 г/л					
СТАТУС ФЛО, с.э. (418 г/л + 12 г/л) Представительство ООО «Землякофф кроп протекшен» в РК П-3 06.05.2032 г.	0,3-0,5	Пшеница, ячмень, тритикале озимые и яровые, рожь, овес, кукуруза (в том числе на силос и масло)	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4- Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорняки.	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Озимые культуры обрабатывают весной. Расход рабочей жидкости – 50-300 л/га	-1
	0,5			Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости – 50-300 л/га	
	0,3-0,5	кукуруза (в том числе на силос и масло)		Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости – 50-300 л/га	
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 452 г/л + 6,25 г/л					
КАТТЕНГ, с.э. (452,42 г/л + 6,25 г/л) AGROBEST GRUP, Турция П-3 05.06.2029 г.	0,3-0,5	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в период от начала кущения культуры до появления второго междоузлия	-1
	0,4-0,6	Кукуруза	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу 3-7 листьев культуры	-1

Набидисулам, с.э. (452,42 г/л +6,25 г/л) Shaanxi Sunger Road Bio-Science CO., Ltd., Китай П-3 30.09.2035 г.	0,3 - 0,6	Кукуруза	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-4 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости – 200- 300 л/га	- (1)
	0,3 - 0,6	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2, 4 - Д и 2М-4Х, и многолетние двудольные сорняки.	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости 200- 300 л/га	- (1)
ПИЛАРФЛОРА, с.э. (453 г/л + 6 г/л) Пиларквим (Шанхай) Ко., Лтд. П-3 15.01.2035 г.	0,3-0,5	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в период от начала кущения культуры до появления второго междоузлия (фаза 32 по Задоксу)	- (1)
ПРАЙМУР с.э. (452,42 + 6,25) МОЕР Кемсайенс Ко Лтд П-3 14.03.2029	0,3-0,5	Пшеница яровая	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу начала кущения – выход в трубку (до появления второго междоузлия). Расход рабочей жидкости – 100-300 л/га	-1
	0,3-0,5	Ячмень яровой		Опрыскивание посевов в фазу кущения – выход в трубку (до второго междоузлия). Расход рабочей жидкости – 100-300 л/га	
	0,3-0,5	Кукуруза		Опрыскивание посевов в фазу 3-7 листьев кукурузы. Расход рабочей жидкости – 100-300 л/га	
СВАРОГ, с.э. (452 г/л + 6,25 г/л) ООО «Франдеса», Беларусь П-3 04.07.2029 г.	0,4-0,6	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры	60 (1)
ТИМСПРЕЙ, с.э. (452,42 г/л + 6,25 г/л) ШАНДОНГ ВЕЙФАНГ РЕЙНБОУ КЕМИКАЛ КО., ЛТД, П-3 30.05.2027 г.	0,3-0,5	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры – выхода в трубку	-1
	0,5-0,6	Кукуруза	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Сплошное опрыскивание посевов в фазе 5-7 листьев культуры в случае преобладания подмаренника цепкого, если погодные условия не позволили произвести обработку раньше этого срока	-(1)
	0,4-0,6	Кукуруза	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Сплошное опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков	-(1)
ЭТИЛГЕКСУЛАМ-Д, с.э. (452,42 г/л + 6,25 г/л) Наньцзин Эссенс Файн- Кемикал Ко., Лтд., Китай П-3 09.09.2029 г.	0,3-0,5	Пшеница и ячмень яровые, пшеница озимая	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание в фазу кущения культуры – выхода в трубку. Расход рабочей жидкости 100-200 л/га	-1
	0,4-0,6	Кукуруза	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу 3-7 листьев культуры	-1
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 453 г/л + 7,4 г/л					
БОЛЕРО с.э. (453 г/л + 7,4 г/л) ТОО «HARVEST Ltd (Харвест Ltd)» П-3 20.03.2034 г.	0,3-0,5	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние сорняки, в т.ч. Устойчивые к 2,4Д и 2М-4Х и некоторые многолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до появления второго междоузлия.	50 (1)
	0,5	Озимая пшеница	Однолетние сорняки, в т.ч. Устойчивые к 2,4Д и 2М-4Х и некоторые многолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до появления второго междоузлия.	50 (1)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 610 г/л + 9,4 г/л					
МУСТЕР, с.э. (610 г/л + 9,4 г/л) Филиал "Hangzhou Ruijiang Crop Science Co.,Ltd., Казахстан" "Hangzhou Ruijiang Crop Science Co., Ltd.,Китай" в городе Алматы П-3 05.02.2035 г.	0,3 - 0,4	Пшеница яровая, пшеница озимая	Однолетние двудольные и некоторые многолетние и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в период от начала кущения культуры до появления второго междоузлия (фаза 32 по Задоксу)	- (1)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 850 г/л + 12 г/л					
ДИСКАТОР ПРАЙМ, к.э. (850 г/л + 12 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-3 10.01.2035 г.	0,3-0,5	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры	-(1)

2,4-Д кислоты в виде сложного эфира + карфентразон-этил + флуроксипир

ПРОГРЕСС ГРАНД, к.э. (440 г/л + 20 г/л + 40 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-3 22.02.2031 г.	0,35-0,45	Пшеница яровая	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры	-1
	0,35-0,45	Ячмень яровой			
	0,25-0,35	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Применяется в качестве добавки к сульфонил-мочевинам при опрыскивании посевов в фазе кущения культуры	-1

2,4-Д (2-этилгексильный эфир) + МЦПА кислоты

ВАЛИНОР, к.э. (725 г/л + 117 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-3 23.01.2036 г.	0,3-0,4-	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры	-1
---	----------	-------------------------------	---	--	----

2,4-Д (2-этилгексильный эфир) + МЦПА кислоты + флуорокси-пир-метил

ВАЛИНОР ПРО, к.э. (718 г/л + 83 г/л + 53 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-3 22.01.2036 г.	0,25-0,35-	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры	-1
---	------------	-------------------------------	---	--	----

2,4-Д (сложный 2-этилгексильный эфир) + клопиралид

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 410 г/л + 40 г/л					
КЛОПЭФИР, к.э. (410 г/л + 40 г/л) ООО Форвард, Россия П-3 29.03.2027 г.	0,6-0,8	Пшеница и ячмень яровой	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки, включая виды осота (бодяк и др.)	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры, в ранние фазы роста сорняков	-1
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 500 г/л + 117 г/л					
ЛАСО, к.э. (500 г/л + 117 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-3 26.02.2035 г.	0,4 - 0,5	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры до выхода в трубку. На следующий год не рекомендуется высевать бобовые культуры, подсолнечник, гречиху.	-(1)

Карфентразон-этил+ трибенурон-метил

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 375 г/кг + 375 г/кг					
ТЕРРАНОВА, в.д.г. (375 г/кг + 375 г/кг) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-3 29.07.2031 г.	0,015-0,025 + ПАВ 150 мл/га	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры	-1
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 22% + 14%					
Спектр, с.п. (22% + 14%) SHANDONG BINNONG TECHNOLOGY CO., LTD. П-3 14.06.2034 г.	0,01-0,015	Пшеница яровая	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры	60(1)

Карфентразон-этил

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 480 г/л					
САХАРА, к.э. (480 г/л) АО ФИРМА «Август» П-3 30.01.2036 г.	0,025-0,03	Пшеница яровая и озимая	Однолетние двудольные, в том числе подмаренник цепкий, и другие, устойчивые к 2,4 -Д сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений. Озимые обрабатывают весной. Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	56 (1)

Азисульфурон

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 500 г/кг					
БОЛИВЕР 50%, в.д.г. (500 г/кг) AGROBEST GRUP, Турция П-3 17.02.2030 г.	0,02-0,03 + ПАВ Тренд 200 мл/га	Рис	Просовидные и болотные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3 листьев – кущения культуры	-1
ГУЛЛИВЕР, в.д.г. (500 г/кг) ТОО «ЭфЭмСи Агро Казахстан» 29.05.2027 г.	0,035- 0,045 + Тренд 90 0,2 л/га	Рис	Просовидные и болотные	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – кущения культуры	60 (1)
ЕССЕНЛИВЕР, в.д.г. (500 г/кг) Наньцин Эссенс Файн- Кемикал Со., Лтд, Китай П-3 08.01.2034	0,020-0,030	Рис	Просовидные и болотные (клубникамыш)	Опрыскивание посевов в фазе 3 листьев кущения культуры	-1
ОЛИВЕР, в.д.г. (500 г/кг) ТОО «Астана-Нан» П-3 19.06.2027 г.	0,02-0,03 + ПАВ Тренд 0,2 л/га	Рис	Просовидные и болотные	Опрыскивание посевов в фазе 3 листьев – кущения культуры	-1

Амидосульфурон

Трент в.д.г. (750 г/кг) ТОО «Астана-Нан» П-4 21.02.2034	0,02	Пшеница яровая, озимая, ячмень яровой	Однолетние и некоторые многолетние двудольные, в т. Ч устойчивые к 2, 4- Д и 2М-4Х (подмаренник цепкий, выюнок полевой)	Опрыскивание посевов весной от фазы кущения до появления флаг- листа культуры	-1
	0,02-0,03	Кукуруза	Однолетние и некоторые многолетние двудольные, в т. Ч устойчивые к 2, 4- Д и 2М-4Х (подмаренник цепкий, выюнок полевой)	Опрыскивание в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков	-1

Амидосульфурон + йодосульфурон-метил-натрия + мефенпир-диэтил (антидот)

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 100 г/л + 25 г/л + 250 г/л					
АМИДА, м.д. (100 г/л + 25 г/л + 250 г/л) ШАНДОНГ ВЕЙФАНГ РЕЙНБОУ КЕМИКАЛ КО., ЛТД, П-3	0,05-0,075	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам (независимо от фазы развития культуры)	- (1)
	0,05-0,075	Лен	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» культуры и в ранние фазы роста сорняков	- (1)

13.06.2029 г.	0,075-0,1	Кукуруза	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и в ранние фазы роста сорняков	- (1)
Ассист, м.д. (100 г/л + 25 г/л + 250 г/л) ТОО «EcoSave» П-3 05.03.2036 г.	0,06-0,08	Пшеница яровая	Однолетние и многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам (независимо от фазы развития культуры)	- (1)
	0,05-0,075	Лён	Однолетние и многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» культуры и в ранние фазы роста сорняков	- (1)
СЕКТОР ТУРБО, м.д. (100 г/л + 25 г/л + 250 г/л) ТОО «БАЙЕР КАЗ» П-4 15.04.2031 г.	0,05-0,075	Лен	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» культуры и ранние фазы роста сорняков	-1
23.02.2034 г.	0,05-0,075	Ячмень яровой	Однолетние и многолетние двудольные сорняки.	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам независимо от фазы развития культуры	-1
	0,075-0,1	Кукуруза	Однолетние и многолетние двудольные сорняки.	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и в ранние фазы роста сорняков	-1
СЕКАЧ, м.д. (100 г/л + 25 г/л + 250 г/л) ARCUS INVEST HOLDING B.V. П-3 20.01.2033 г.	0,05-0,075	Лен	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» культуры и ранние фазы роста сорняков	-(1)
	0,05-0,075	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам (не зависимо от фазы развития культуры)	-(1)
Даларан м.д. (100 г/л + 25 г/л + 250 г/л) ТОО «Астана-Нан» П-3 25.01.2034 г.	0,05-0,075	Пшеница озимая	Однолетние и многолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2, 4-Д сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры в ранние фазы роста сорняков. В случае пересева в год применения рекомендуется высевать зерновые, кукурузу, лен. Не рекомендуется в год применения высевать озимый рапс, а также на следующий год подсолнечник, яровой рапс, свеклу, гречиху, бобовые и овощные культуры	- 1
	0,05-0,075	Лён	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» культуры и ранние фазы роста сорняков	- 1
	0,05-0,075	Пшеница яровая	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам (независимо от фазы культуры)	- 1

Амидосульфурон + метсульфурон-метил

Концентрация д.в. (+/- 5%) ~ 250 г/кг + 500 г/кг					
КАССАР, в.д.г. (250 г/кг + 500 г/кг) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-4 24.01.2033 г.	0,008-0,01	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе с 3-х листьев до 2-го междоузлия культуры	-(1)
Концентрация д.в. (+/- 5%) ~ 600 г/кг + 150 г/кг					
СЕЛЕНИТ, в.д.г. (600 г/кг + 150 г/кг) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-4 23.02.2032 г.	0,01-0,02	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – до выхода в трубку	-1
	0,01-0,02	Лен масличный	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу «елочки» культуры	-1
Концентрация д.в. (+/- 5%) ~ 500 г/кг + 250 г/кг					
СЕЛЕНИТ МАКС, в.д.г. (500 г/кг + 250 г/кг) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-4 03.09.2035 г.	0,01-0,015	Лен масличный	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу «елочки» культуры	-(1)
	0,01 – 0,02	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – до фазы второго междоузлия культуры	-(1)

Амидосульфурон + тифенсульфурон + метсульфурон-метил

Концентрация д.в. (+/- 5%) ~ 350 г/кг + 350 г/кг + 50 г/кг					
КАНОНИР 3.0., в.д.г. (350 г/кг + 350 г/кг + 50 г/кг) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-3 25.02.2030 г.	0,02-0,025	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры Расход рабочей жидкости 200л/га	-1
	0,02-0,025	Лен масличный	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу «елочки» культуры	-1
Концентрация д.в. (+/- 5%) ~ 400 г/кг + 200 г/кг + 150 г/кг					
Станис Про, в.д.г. (400 г/кг + 200 г/кг + 150 г/кг) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-3 14.05.2034 г.	0,015 – 0,02	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе с 3-х листьев до 2-го междоузлия культуры	-(1)
	0,015 – 0,02	Лен масличный	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу «елочки» культуры	-(1)

Амидосульфурон + трибенурон-метил + тифенсульфурон

Концентрация д.в. (+/- 5%) ~ 217 г/кг + 511 г/кг + 67 г/кг					
РИАНОН ЭКСПЕРТ, в.д.г. (217 г/кг + 511 г/кг + 67 г/кг) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-3 29.01.2036 г.	0,01-0,02+ ПАВ Пикассо 50 мл/га	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе с 3-х листьев до 2-го междоузлия культуры	-1

Аминопиралид

Концентрация д.в. (+/- 5%) ~ 240 г/л					
--------------------------------------	--	--	--	--	--

Арго, в.р. (240 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-4 07.03.2035 г.	0,04 – 0,06	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Однолетние и многолетние двудольные сорняки, включая подмаренник цепкий, виды осота, бодяка и горчак розовый	Опрыскивание посевов весной от фазы кущения до фазы формирования второго междоузлия культуры (включительно). При необходимости пересева в сезон применения препарата на том же поле можно выращивать кукурузу, сорго, яровые зерновые и злаковые травы через 1 месяц после внесения препарата. При этом перед посевом необходимо провести глубокую вспашку	-(1)
	0,15 - 0,18	Пары (зерновые севообороты)	Горчак розовый	Опрыскивание сорняков в период активного роста	-(1)
Горец в.р. (240 г/л) ТОО «Астана-Нан» П-4 12.02.2034	0,04-0,05	Рапс	Однолетние и многолетние двудольные сорняки, включая виды осота, ромашки, горца	Опрыскивание в фазе «розетки» культуры	-(1)
	0,04-0,06	Пшеница яровая и озимая	Однолетние и многолетние двудольные сорняки, включая осоты	Опрыскивание посевов в фазе кущения – до второго междоузлия	-(1)
	0,15-0,18	Пары (зерновые севообороты)	Горчак розовый	Опрыскивание сорняков в период активного роста	-(1)
ЛАНС, в.р. (240 г/л) ТОО «Кортева Агрисаенс Казахстан» П-4 17.02.2030 г.	0,04-0,06	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Однолетние и многолетние двудольные сорняки, включая осоты	Опрыскивание посевов в фазе кущения – до второго междоузлия культуры	-1
	0,15-0,18	Пары (зерновые севообороты)	Горчак розовый	Опрыскивание сорняков в период активного роста	-1
Пиранья, в.р. (240 г/л) ЛЕЙТОН АГРИО ЕВРОПА КФТ. П-4 08.07.2036 г.	0,15-0,18	Пары (зерновые севообороты)	Горчак розовый	Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га. Ограничения по севообороту: минимум через 18-22 месяцев после применения препарата могут быть посеяны: подсолнечник, картофель, люцерна, лук, сахарная свекла, лен-долгунец, капуста, чечевица, нут (турецкий горох), соя, кормовые бобы, горох, морковь, хлопок	-(1)
	0,04-0,06	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Однолетние и многолетние двудольные сорняки, включая осоты	Опрыскивание посевов в фазе кущения – до второго междоузлия культуры. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га. Ограничения по севообороту: минимум через 18-22 месяцев после применения препарата могут быть посеяны: подсолнечник, картофель, люцерна, лук, сахарная свекла, лен-долгунец, капуста, чечевица, нут (турецкий горох), соя, кормовые бобы, горох, морковь, хлопок.	47 (1)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 300 г/л					
Ланцет, в.р. (300 г/л) ТОО «Достык-Агро- 2012» П-4 25.12.2034 г.	0,14-0,17	Пары (зерновые севообороты)	Горчак розовый	опрыскивание в период активного роста сорняков	-1
	0,03-0,05	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние и многолетние двудольные сорняки, включая осоты	опрыскивание посевов в фазе кущения-до второго междоузлия культуры	-1

Аминопирилат + флорасулам

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 300 г/кг + 150 г/кг					
ЛАНЦЕЛОТ 450, в.д.г. (300 г/кг + 150 г/кг) Дай АгроСаенсес, США П-3 01.02.2028 г.	0,025 – 0,033	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние и многолетние двудольные, включая осоты, т.ч. горчак розовый	Опрыскивание посевов в фазе кущения – до второго междоузлия культуры включительно	-1

Ацетохлор

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 900 г/л					
ГЕРБ 900, к.э. (900 г/л) ТОО «ФМРус» П-3 17.03.2035 г.	1,5-3,0	Кукуруза	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до посева (с заделкой при недостатке влаги) или до всходов культуры	-1
	1,5-2,7	Подсолнечник, соя	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры.	-1

Ацифлуорфен

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 250 г/л					
Тиллер, в.р.к. (250 г/л) ФОРВАРД П-3 02.02.2036 г.	1,0-1,8	Соя	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазу 1-4 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков	-1
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 320 г/л					
ТАНТО, к.к.р. (320 г/л) АО «ЩелковоАгрохим» П-3 14.04.2031 г.	0,5-1,0	Соя	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазу 1-4 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков	-1

Атразин

Атриум в.д.г. (900 г/кг) ТОО «ФМРус» П-3	1,12-1,65	Кукуруза на зерно	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание сорняков в период активного роста до всходов культуры	60(1)
--	-----------	-------------------	---------------------------------------	--	-------

20.03.2034 г.					
---------------	--	--	--	--	--

Аклонифен

Бравура, к.с. (600 г/л) АО «Щелково Агрохим», П-3 03.02.2036 г.	2,0-3,0	Картофель	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры	60(1)
	2,0-2,5	Подсолнечник	Однолетние злаковые и двудольные сорняки		
	1,5-2,5	Подсолнечник	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 настоящих листьев подсолнечника и ранние фазы роста сорняков	

Бентазон

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 300 г/л					
БЕНИТО, к.к.р. (300 г/л) АО «Щелково Агрохим» П-3 14.04.2031 г.	2,0-3,0	Соя	Однолетние двудольные, в т.ч. дурнишник обыкновенный	Опрыскивание посевов, начиная с фазы 1-го настоящего листа культуры в ранние фазы роста сорняков (2-6 листьев)	60 (1)
	1,5-3,0	Горох	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2М- 4Х	Опрыскивание посевов в фазе 5-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков	
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 480 г/л					
БЕНАГРО, в.р. (480 г/л) ТОО «Агро-Хим-Лидер» П-3 26.04.2032 г.	2,0	Люцерна 1-го года вегетации (семенные посевы)	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 1-2 настоящих листьев культуры.	-(1)
	1,5-3,0	Соя	Однолетние двудольные сорняки, в том числе дурнишник	Опрыскивание посевов в фазе 1-3 настоящих листьев культуры.	-(1)
	2,0-4,0	Рис	Клубнекамыш, сусак, сыти, монохория, виды рогоза, частуха	Опрыскивание посевов в фазе 2-листьев – кушения культуры.	-(1)
	3,0-4,0	Лен	Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» при высоте культуры 3-10 см.	-(1)
	2,0-4,0	Кукуруза	Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 настоящих листьев культуры.	-(1)
	2,0	Зерновые яровые с подсевом люцерны	Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х	Опрыскивание посевов в фазе 1-2 настоящих листьев люцерны (в фазе кушения зерновых)	-(1)
Бента Форте в.р. (480 г/л) ТОО «Астана-Нан» П-4 26.08.2035 г.	1,5-3,0	Соя	Однолетние двудольные, в т.ч . дурнишник	Опрыскивание посевов в фазе 1-3 настоящих листьев культуры	60(1)
	3,0-4,0	Лён	Однолетние двудольные, в т.ч . устойчивые к 2 М-4Х	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» при высоте культуры 3-10 см	60(1)
	0,67-1,0	Горох на зерно	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазе 5-6 листьев культуры.	60(1)
БЕНТАСИЛ, в.р. (480 г/л) ТОО «ФМРус» П-3 21.06.2033 г.	1,5-3,0	Соя	Однолетние двудольные, в т.ч. дурнишник обыкновенный	Опрыскивание посевов в фазе 1-3 настоящих листьев культуры	60 (1)
	2,0-3,0	Горох	Однолетние двудольные, в т.ч . дурнишник обыкновенный	Опрыскивание посевов в фазе 5-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. Принимать во внимание сортовую чувствительность. Расход рабочей жидкости 200 - 300 л/га	60(1)
	3,0-4,0	Лен	Однолетние двудольные, в т.ч . дурнишник обыкновенный	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» культуры в ранние фазы роста сорняков (3-5 листьев). Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	60(1)
Гранбаз, в.р. (480 г/л) ФОРВАРД П-3 09.02.2036 г.	2,0-3,0	Горох (кроме овощного)	Однолетние двудольные сорные растения, в т.ч. устойчивые к МЦПА и 2М-4Х	Опрыскивание посевов в фазе 5-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков	60 (1)
	1,5-3,0	Соя	Однолетние двудольные сорные растения, в т.ч. дурнишник обыкновенный	Опрыскивание посевов в фазе 1-3 настоящих листьев культуры	60 (1)
	3,0-4,0	Лен-долгунец	Однолетние двудольные сорные растения, в т.ч. устойчивые к МЦПА и 2М-4Х	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» при высоте культуры 3-10 см	60 (1)
	2,0-4,0	Яровые, озимые пшеница и ячмень, овес	Однолетние двудольные сорные растения, в том числе устойчивые к 2,4 -Д и МЦПА	Опрыскивание в фазе кушения зерновых	60 (1)
	2,0-4,0	Пшеница, ячмень яровые с подсевом клевера	Однолетние двудольные сорные растения, в том числе устойчивые к МЦПА	Опрыскивание посевов в фазе 1-2 настоящих листьев клевера (в фазе кушения зерновых)	60 (1)
	2,0	Пшеница, ячмень яровые с подсевом люцерны	Однолетние двудольные сорные растения, в том числе устойчивые к МЦПА	Опрыскивание посевов в фазе 1-2 настоящих листьев люцерны (в фазе кушения зерновых)	60 (1)
	2,0	Люцерна 1-го года вегетации	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 1-2 настоящих листьев культуры	60 (1)
	1,5-2,0	Люцерна (старовозрастные семенные посевы)	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 1-2 настоящих листьев культуры	60 (1)
	1,5-3,0	Нут	Однолетние двудольные сорные растения, в том числе устойчивые к МЦПА	Опрыскивание посевов в фазе 5-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков	60 (1)
ЗОЛОТОЙ ДРАКОН, в.р. (480 г/л) SHANDONG BINNONG TECHNOLOGY CO., LTD П-3 07.11.2029 г.	1,5-3,0	Соя	Однолетние двудольные, в т.ч. дурнишник обыкновенный	Опрыскивание посевов в фазе 1-3 настоящих листьев культуры	60 (1)
КОРСАР, в.р.к. (480 г/л) АО Фирма «Август» П-4 02.03.2036 г.	1,5-3,0	Соя	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. дурнишник обыкновенный	Опрыскивание посевов в фазе 1-3 настоящих листьев культуры. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	-1
ФЕНТОКСАН, в.р. (480 г/л) AGROBEST GRUP, Турция П-3 28.01.2030 г.	1,5-2,5	Соя	Однолетние и многолетние двудольные сорняки, в том числе дурнишник	Опрыскивание посевов в фазе 1-3 настоящих листьев культуры, ранние фазы роста сорняков	-1
	1-2,0	Люцерна 1 года вегетаии (семенные посевы)	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 1-2 настоящих листьев культуры, ранние фазы роста сорняков	-1

Бентазон + имазамокс

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 400 г/л + 25 г/л					
КОРСАР СУПЕР, в.р.к. (400 г/л + 25 г/л) АО Фирма «Август» П-3 07.07.2031 г.	1,2-1,6	Соя, горох	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (1-3 настоящих листьев) и 1-3 настоящих листьев культуры. Расход рабочей жидкости 50-300 л/га	60 (1)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 480 г/л + 22,4 г/л					
ГРАНИТ СУПЕР, в.р.к. (480 г/л + 23 г/л) ТОО «Agro Mark Kaz» П-3 17.02.2027 г.	1,5-1,7	Соя	Однолетние злаковые и однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА	Опрыскивание посевов в фазу 1-3 настоящих листьев культуры (злаковые сорняки в фазе 1-3 листьев) двудольные 2-6 листа) На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы. Безопасный интервал между применением гербицида и посевов свеклы 16 месяцев. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га.	-1
	1,2-1,5	Горох	Однолетние злаковые и однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА	Опрыскивание посевов в фазу 1-3 настоящих листьев культуры (злаковые сорняки в фазе 1-3 листьев) двудольные 2-6 листа). На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы. Безопасный интервал между применением гербицида и посевов свеклы 16 месяцев. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га.	-1
	1,2-1,5	Люцерна	Однолетние злаковые и однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА	Опрыскивание посевов в фазу 1-2 настоящих листьев культуры. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га.	-1
КОРУМ, в.р.к. (480 г/л + 22,4 г/л) БАСФ Агрокемилал Продактс Б.В., Пуэрто Рико П-3 02.06.2027 г.	1,25-1,85	Соя, горох	Однолетние и многолетние двудольные и однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 1-3 настоящих листьев культуры в ранние фазы роста сорняков	-1

Бентазон + хизалофоп-п-этил

ГЕЙЗЕР, к.к.р. (300 г/л + 45 г/л) АО «Щелково Агрохим» П-3 15.09.2030 г.	2,0-3,0	Соя	Однолетние и многолетние злаковые и однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов, начиная с фазы 1-го настоящего листа культуры и в ранние фазы роста сорняков (2-6 листьев). Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	60 (1)
---	---------	-----	---	--	--------

Бентазон+фомесафен

КОГОРТА, в.г.р. (330 г/л + 150 г/л) АО Фирма «Август» П-3 23.06.2033 г.	1,5-2,0	Соя	Однолетние двудольные сорняки	Сплошное опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков и 1-4 настоящих листьев у культуры. Норма расхода рабочей жидкости 100-300 л/га (в зависимости от типа распылителей)	60 (1)
--	---------	-----	-------------------------------	---	--------

Пропизамид

ПРЕКЕР, к.с. (500 г/л) ШАНДОНГ ВЕЙФАНГ РЕЙНБОУ КЕМИКАЛ КО., ЛТД. П-4 21.02.2034 г.	3,0-5,0	Люцерна, клевер (старовозрастные посевы)	Однолетние, многолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	Опрыскивание посевов рано весной в период покоя до начала отрастания культуры или поздней осенью (в зонах достаточного увлажнения)	- (1)
	4,0-5,0	Люцерна (семенные посевы)	Однолетние, многолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	Опрыскивание посевов осенью в фазе 3-4 пар настоящих листьев до смыкания рядков культуры	- (1)
	1,0	Рапс	Однолетние двудольные и некоторые злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов весной в фазе 3-4 листьев культуры по вегетирующим сорнякам	- (1)

Фомесафен

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 240 г/л					
НЕКСУС в.р. (240 г/л) АО Фирма «Август» П-3 01.02.2034 г.	1,0-1,75	Соя	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 100-300 л/га	60 (1)
	1,0-1,75	Соя	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазу от 1-го до 3-го тройчатого листа сои, в ранние фазы развития сорных растений. Расход рабочей жидкости – 100- 300 л/га	60 (1)
ФОМЕСОФТ, в.р. (250 г/л) ТОО «ФМРУС» П-3 12.06.2033 г.	1,5-2,0	Соя	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов начиная с фазы первого листа культуры в ранние фазы роста сорняков (2-5 листьев). Расход рабочей жидкости 200-300 л/га.	60 (1)
	1,5-2,0	Картофель, хлопчатник	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов при 2-6 листьев сорных растений независимо от фазы развития культуры	60 (1)
ФЛЕКС УЛЬТРА, в.р. (250 г/л) SHANDONG BINNONG TECHNOLOGY CO., LTD. П-3 31.07.2033 г.	1,5-2,0	Соя	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание в фазе 2-4 листьев культуры	30(1)
Филберт, в.р. (250 г/л) ФОРВАРД П-3 27.01.2036 г.	1,5-2,0	Соя	Однолетние двудольные и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов начиная с фазы первого листа культуры в ранние фазы роста сорняков (2-5 листьев).	30 (1)

Фомесафен+ хизалофоп-п-этил+ кломазон

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 95 г/л + 25 г/л + 230 г/л					
---	--	--	--	--	--

Аватар, 35%, к.э. , (95 г/л + 25 г/л + 230 г/л) SHANDONG BINNONG TECHNOLOGY CO., LTD Китай П-4 12.07.2033	1,5-2,0	Соя	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 1-2 ветвлений (тройчатый лист) культуры и в фазе 3-5 листьев сорняков	60(1)
Триммер 35%, к.э. (95 г/л + 25 г/л + 230 г/л) ТОО "Еco Harvest Group" П-4 09.02.2034	1,5-1,8	Соя	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание посевов 2 -5 настоящих листьев культуры	- (1)

Флуфенацет + дифлюфеникан

Леноцет Плюс к.с. (400 г/л + 100 г/л) ШАНДОНГ ВЕЙФАНГ РЕЙНБОУ КЕМИКАЛ КО., ЛТД, П-4 01.04.2034 г.	0,3	Яровая пшеница, яровой ячмень	Однолетние, в том числе устойчивые к 2,4- Д и 2М-4Х, двудольные и некоторые злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов до или после появления всходов, до третьей стадии настоящего листа включительно	- (1)
---	-----	----------------------------------	---	--	-------

Биспирибак натрия

НОМИНИ 400, с.к. (400 г/л) Кумий Кемикал Индастри Ко. Лтд., Япония П-3 21.02.2027 г.	0,075-0,09 + (ПАВ) А- 100 0,075- 0,09	Рис	Однолетние злаковые (просо куриное), клубнекамыш	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев однолетних злаковых сорняков и 3-6 листьев клубнекамыша	60(1)
--	--	-----	---	---	-------

Биспирибак натрия+метафифоп

НОМИНИ СУПРИМ, с.э. (40 г/л+100 г/л) Филиал АО «Сумитомо Корпорэйшн» в Алматы П-3 30.03.2033 г.	0,8-1,0 + ПАВ А - 100 0,08 - 0,1% (в % соотношен и и объемов)	Рис	Однолетние злаковые сорняки (просо куриное), клубнекамыш	Листовое опрыскивание в ранневсходовый и послевсходовый период в фазе 3-5 листьев (просо куриное). Баковое смешивание с (ПАВ) А100 (0,08 - 0,1%) Расход рабочей жидкости: Авиа: 50-100 л/га. Наземный: 200- 00 л/га	60(1)
---	---	-----	---	---	-------

Бромексинил + МЦПА

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 200 г/л + 200 г/л					
БРОМА, к.э. (200 г/л + 200 г/л) Цзянсу Хуейфен Агрокемикал Ко., Лтд, Китай П-3 20.03.2028 г.	1,2-1,5	Пшеница яровая и озимая	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу культуры	-1
БРОПАК, к.э. (200 г/л+ 200 г/л) ШАНДОНГ ВЕЙФАНГ РЕЙНБОУ КЕМИКАЛ КО., ЛТД, П-3 18.05.2033	1,4-2,0	Лен	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов при высоте культуры 5-15 см, при активном росте сорняков	-(1)

Галаксифен-метил

Хелиантекс, к.с. (74,4 г/л) ТОО «Кортева Агрисаенс Казахстан» П-3 16.03.2036 г.	0,044 л/га + ПАВ, 0,150 л/га	подсолнечник	Амброзия полыннолистная, дурнишник зобовидный, щирца, марь белая и другие однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу 4 -6 листьев-начало бутонизации культуры. Расход рабочей жидкости 200 л/га	60 (1)
--	------------------------------------	--------------	---	--	--------

Галаксифен-метил + пироксулам + клоквиносет кислоты

МЕРИТ ЭКСТРА 317, в.д.г. (69,5 г/кг + 250 г/кг + 354 г/кг) Дай АгроСаенсес, США П-3 13.03.2030 г.	0,06-0,075 ПАВ Серфер 1,0 л/га	Пшеница яровая	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки (овсюг, куриное просо, щетинник сызый, костер виды, лисохвост, подмаренник цепкий, ромашка непахучая, горчица полевая, марь белая, щирца запрокинутая)	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры ВВСН 20-25.Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	-1
--	---	----------------	--	--	----

Галаксифен-метил + флорасулам + клоквиносет кислоты

Квелекс 200, в.д.г. (104,2 г/кг + 100 г/кг + 70,8 г/кг) ТОО «Кортева Агрисаенс Казахстан» П-3 20.08.2034 г.	0,04-0,05 + ПАВ Виволт, 0,2л/га	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние и многолетние двудольные сорняки (мак- самосейка, подмаренник цепкий, ромашка непахучая, осот желтый, бодяк полевой, марь белая, василек полевой)	Опрыскивание посевов: яровые – в фазе ВВСН 12-39; озимые – ВВСН 25-39. Расход рабочей жидкости: 100-300 л/га	-(1)
--	---------------------------------------	----------------------------------	---	--	------

Галоксифоп-п-метил

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 104 г/л					
ГАЛОШАНС, к.э. (104 г/л) ООО «Шанс» П-3 20.03.2029 г.	0,5	Свекла сахарная, кормовая, подсолнечник, рапс	Однолетние злаковые сорняки (виды щетинника, куриное просо, просо сорнополевое)	Опрыскивание сорняков в период их активного роста (в фазе от 2-6 листьев до кущения). Расход рабочей жидкости – 200- 300 л/га	60 (1)
	1,0	Свекла сахарная, кормовая, подсолнечник, рапс	Многолетние злаковые и сорняки (пырей ползучий)	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	60 (1)
	0,7	Лук	Однолетние злаковые сорняки (виды щетинника, куриное просо)	Опрыскивание сорняков период их активного роста (в фазе от 2-6 листьев до начала кущения). Расход рабочей жидкости 200-300 л/га.	60 (1)

	1,2	Лук	Многолетние злаковые сорняки (пырей ползучий)	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га.	60 (1)
	1,0-1,5	Хлопчатник	Многолетние злаковые (гумай, свинорой, пырей ползучий)	Опрыскивание вегетирующей культуры при высоте сорняков 10-15 см. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	-1
ГАЛОКС СУПЕР 108, к.э. (108 г/л) ТОО «Agro Mark Kaz» П-3 06.03.2033 г.	0,5	Свекла сахарная, хлопчатник, лен-долгунец	Однолетние злаковые	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста (фаза 2-6 листьев)	-1
	1,0	Свекла сахарная	Пырей ползучий, гумай и другие многолетние злаковые	Опрыскивание вегетирующей культуры при высоте сорняков 10-15см	-1
	1,0-1,5	Хлопчатник	Многолетние злаковые (гумай, свинорой, пырей ползучий)	Опрыскивание вегетирующей культуры при высоте сорняков 10-15см	-1
	1,0-1,5	Лен- долгунец	Плевел льняной, пырей ползучий	Опрыскивание посевов при высоте льна 3-10 см и пырея 10-20 см.	-1
	0,5-1,0	Подсолнечник, сафлор, соя, картофель, рапс	Однолетние и многолетние злаковые сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста	-1
	1,0-1,5	Лук	Однолетние и многолетние злаковые сорняки, ыпырей, гумай	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста	-1
ГЕНЕРАЛ, к.э. (108 г/л) ТОО «Агро-Хим-Лидер» П-3 27.02.2028 г.	0,5	Свекла сахарная, хлопчатник, лен	Однолетние злаковые	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста (фаза 2-6 листьев). Расход рабочей жидкости – 250-300 л/га	-1
	1,0	Свекла сахарная	Пырей ползучий, гумай и другие многолетние злаковые сорняки	Опрыскивание вегетирующей культуры при высоте сорняков 10-15 см. Расход рабочей жидкости 250-300 л/га	-1
	1,0-1,5	Хлопчатник	Многолетние злаковые сорняки (гумай, свинорой, пырей ползучий)	Опрыскивание вегетирующей культуры при высоте сорняков 10-15 см. Расход рабочей жидкости 250-300 л/га	-1
	1,0-1,5	Лен	Пырей ползучий	Опрыскивание посевов при высоте льна 3-10 см и пырея ползучего 10-20 см	-1
	0,5-1,0	Подсолнечник, сафлор, соя, картофель, рапс	Однолетние и многолетние злаковые сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости 250-300 л/га	-1
	1,0-1,5	Лук	Однолетние и многолетние злаковые сорняки (пырей ползучий, гумай)	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости –300-350 л/га	-1
ГУРОН, к.э. (104 г/л) ФОРВАРД П-3 28.01.2036 г.	0,8-1,0	Лен долгунец и масличный	Многолетние злаковые сорные растения, включая пырей ползучий	Опрыскивание в период вегетации	- (1)
	0,5-0,7	Лен долгунец и масличный, сафлор, рапс яровой и озимый, чечевица, нут, горох, соя, подсолнечник	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание в период вегетации	- (1)
	0,8-1,0	Сафлор, рапс яровой и озимый, чечевица, нут, горох, соя, подсолнечник	Многолетние злаковые сорные растения, включая пырей ползучий	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста	- (1)
	0,5-0,7	Свёкла сахарная и кормовая	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста (фаза 2-6 листьев)	- (1)
	0,8-1,0	Свёкла сахарная и кормовая	Многолетние злаковые сорные растения, включая пырей ползучий	Опрыскивание посевов при высоте сорняков 10-15 см	- (1)
ЗЕЛЛЕК СУПЕР, к.э. (108 г/л) ТОО "Кортева Агрисаенс Казахстан П-3 01.02.2028 г.	0,5-1,0	Подсолнечник, сафлор, соя, картофель	Однолетние и многолетние злаковые	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста	-1
	0,5	Рапс	Однолетние злаковые		-1
	1,0	Рапс	Многолетние злаковые		-1
ЗЕЛЛ ИКС к.э. (108 г/л) ТОО «GOOD JOB INDUSTRY KAZAKHSTAN» («ГУД ДЖОБ ИНДАСТРИ КАЗАХСТАН») П-3 08.11.2033 г.	0,8-1,0	Картофель	Однолетние и многолетние злаковые	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости 250-300 л/га	-1
	0,8-1,0	Лук	Однолетние и многолетние злаковые сорняки (пырей ползучий, гумай)	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста.Расход рабочей жидкости –300-350 л/га	
	0,5-1,5	Хлопчатник	Многолетние злаковые (гумай, свинорой, пырей ползучий)	Опрыскивание вегетирующей культуры при высоте сорняков 10- 15 см. Расход рабочей жидкости 250-300 л/га	
ИМПУЛЬС, к.э. (108 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-3 30.07.2031 г.	0,5	Лен	Однолетние злаковые	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста	-1
	1,0-1,5	Лен	Однолетние и многолетние злаковые, включая пырей ползучий	Опрыскивание посевов при высоте льна 3 – 10 см и пырея 10 – 20 см.	-1
	0,5-1,0	Подсолнечник, соя, рапс	Однолетние и многолетние злаковые	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста	-1
Канон, к.э. (104 г/л) ООО «Интер Групп» П-3 27.11.2034 г.	1,0	Соя, нут, подсолнечник, свекла сахарная, рапс яровой	Многолетние злаковые сорняки (пырей ползучий)	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га.	60 (1)
	0,5	Соя, нут, подсолнечник, свекла сахарная, рапс яровой	Однолетние злаковые сорняки (виды щетинника, просо куриное, просо сорное)	Опрыскивание сорняков в период их активного роста (в фазе от 2-6 листьев до кушения). Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	60 (1)
ОПТИМУС ПРАЙМ, к.э. (108 г/л) Шандонг Биннонг Технолоджи Ко., Лтд, Китай П-3 10.10.2028 г.	0,5-1,5	Хлопчатник	Однолетние и многолетние (гумай, свинорой, пырей ползучий) злаковые сорняки	Опрыскивание посевов хлопчатника в фазе 2– 3 листьев однолетних сорняков и при высоте многолетних сорняков 10-15 см	60 (1)

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 240 г/л					
ДЕЛИК 240, к.э. (240 г/л) ДВА Агро ГМБХ, Германия П-3 13.01.2031 г.	0,15-0,20	Сахарная свекла	Однолетние злаковые	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста (с фазы 2-6 листьев, до начала стеблевания)	-1
	0,3-0,5	Сахарная свекла	Многолетние злаковые сорняки, в том числе гумай, свинорой, пырей ползучий.		-1
	0,15-0,2	Хлопчатник, картофель, соя, подсолнечник, рапс	Однолетние злаковые	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста	-1
	0,3-0,5	Хлопчатник, картофель, соя, подсолнечник, рапс	Многолетние злаковые сорняки, в том числе гумай, свинорой, пырей ползучий.		-1
	0,15-0,20	Лён	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов при высоте льна 3-10 см и пырея 10-20 см	-1
	0,3-0,5	Лён	Многолетние злаковые сорняки, в том числе гумай, свинорой, пырей ползучий		-1
ИМПУЛЬС ФОРТЕ, к.э. (240 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-3 26.01.2036 г.	0,15-0,2	Рапс, лен, горох	Однолетние злаковые	Опрыскивание в период вегетации.	-1
	0,3-0,4	Рапс, лен, горох	Многолетние злаковые сорняки, включая пырей ползучий	Опрыскивание в период вегетации.	-1
	0,15-0,4	Подсолнечник, соя, гречиха, чечевица, горчица	Однолетние и многолетние злаковые сорняки, включая пырей ползучий	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста	-1
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 520 г/л					
ИМПУЛЬС 520, к.э. (520 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-3 30.01.2033 г.	0,1 – 0,15	Рапс, горчица, лен масличный, подсолнечник, горох, чечевица, соя, гречиха	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев сорняков, независимо от фазы развития культуры	60(1)
	0,15 – 0,25	Рапс, горчица, лен масличный, подсолнечник, горох, чечевица, соя, гречиха	Многолетние злаковые сорняки, в том числе пырей ползучий	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10 -20 см., независимо от фазы развития культуры	60(1)
ХАЙФОП, к.э. (540 г/л) ШАНДОНГ ВЕЙФАНГ РЕЙНБОУ КЕМИКАЛ КО., ЛТД, П-3 15.01.2035	0,15-0,20	Рапс	Однолетние и многолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста.Расход рабочей жидкости 250-300 л/га	- (1)
	0,12-0,15	Лен	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов при высоте льна 3-10 см. Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста	- (1)
	0,2-0,3	Лен	Однолетние и многолетние злаковые сорные растения, в том числе пырей ползучий	Опрыскивание посевов при высоте льна 3-10 см и пырея 10-20 см	- (1)
	0,15-0,25	Подсолнечник	Однолетние и многолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости 250-300 л/га	- (1)

Галоксифоп-п-метил + хизалофоп-п-тефурил

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 120 г/л+60 г/л					
Подиамакс, м.к.э. (125 г/л + 60 г/л) ООО «Шанс» П-3 28.11.2035 г.	0,25-0,4	Подсолнечник, соя, горох, картофель	Однолетние злаковые (просокуриное, виды щетинника и др.) сорняки	Опрыскивание сорняков в период их активного роста (в фазе от 2-3 листьев до кущения). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	61(1)
	0,4-0,5	Подсолнечник, соя, горох,картофель	Многолетние злаковые (пырей ползучий) сорняки	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10 -15 см. Расход рабочей жидкости –200-300 л/га	60(1)

Глифосат

Глифосат (аммонийная соль)

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 720 г/кг					
БУРАН ЭКСТРА 75%, в.д.г. (750 г/кг) ТОО «Агрохимия» П-3 28.05.2036 г.	1,0-1,8	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки (в т.ч. пырей)	Опрыскивание сорняков в период их активного роста, при достижении ими высоты 10-15 см. Норма расхода рабочей жидкости 200-300 л/га.	-1
	3,0	Пары	Горчак ползучий (розовый)	Опрыскивание сорняков в период их активного роста (бутонизация, цветение). Норма расхода рабочей жидкости 200-300 л/га.	-1
	1,0-1,8	Поля, предназначенные под посев различных сельскохозяйственных культур	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки (в т.ч. пырей)	Опрыскивание полей в период отрастания сорняков весной. Норма расхода рабочей жидкости 200-300 л/га.	-1
ЖОЙКЫН ДАРА, в.д.г. (747 г/кг) Моер Кемсайенс Ко, Китай П-4 26.11.2030 г.	1,0-1,8	Пары	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-1
	3,0	Пары	Горчак розовый	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-1
	1,0-1,8	Поля, предназначенные под посев различных с/х культур	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной	-1
	1,5-2,0	Земли несельскохозяйственного назначения	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков	-1
РАУНДАП Пауэр, в.д.г. (720 г/кг) Bayer Agriculture BV, Бельгия П-3 15.03.2027 г.	1,0-1,5	Поля, предназначенные под посев различных сельскохозяйственных культур	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной до посева культуры	-1
	1,0-2,5	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период активного роста	-1
	1,0-2,0	Поля, предназначенные под посев различных сельскохозяйственных культур	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью	-1

	1,5	Земли несельскохозяйственного пользования (полосы отчуждения линий электропере дач, газо- и нефтепровод ов, обочины дорог, железнодорожные насыпи)	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков	-1
ТОМАГАВК ЭКСТРА, в.р.г. (747 г/кг) ТОО «ФМРус» П-3 1 7.01.2033 г.	1,0-1,8	Поля, предназначенные под посев разных сельскохозяйственных культур	Однолетниеи многолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание вегетерующих сорняков весной	-(1)
	3,0	Пары	Горчак розовый	Опрыскивание сорняков в период ихактивного роста	-(1)
	1,0-1,8	Пары	Однолетниеи многолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание сорняков в период ихактивного роста	-(1)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 770 г/кг					
Bangur Pro, в.р.г. (800 г/кг) Jiangxi Huihe Chemical Co. Ltd П-3 09.12.2034 г.	1,0-1,5	Поля, предназначе нные под посев разных с/х культур	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков за 7-14 дней до посева	-1
Винка Санфосат 757, в.д.г. (75,7%) ЧЖЭЦЗЯН СИНЬАНЬХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ГРУППА П-3 31.07.2034 г.	1,5-4,0	Пары	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-(1)
ГЛИФАТ ФОРТЕ 757, в.д.г (757 г/кг) ТОО «Агро-Хим-Лидер» П-3 01.04.2031 г.	0,75-1,0	Пары	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-1
	2,0-3,0		Многолетние сорняки в.т.ч. гумай, тростник, пырей		
	3,0		Горчак розовый		
	1,0-1,5	Поля, предназначе нные под посев различных с/х культур	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной, за 5– 7 дней до посева или осенью	-1
	2,0-3,0		Многолетние сорняки в.т.ч. гумай, тростник, пырей		
	3,0		Горчак розовый		
Глифосан профи, в.д.г (757 г/кг) ТОО «Мивоки» П-3 24.12.2035 г.	1,2-2,0	пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки в т.ч. пырей	Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	-1
	3,0	пары	Горчак розовый	Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	-1
ДРАКОН 77%, в.д.г. (770 г/кг) Наньцзин Эссенс Файн- Кемикал Со., Лтд, Китай П-4 04.01.2034	1,0-1,6	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-1
	3,0	Пары	Горчак розовый, тростник обыкновенный	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-1
	3,0	Земли, засоренные карантинным и сорняками	Амброзия полыннолистная, виды повилики, паслен колючий	Опрыскивание вегетирующих сорняков	-1
	1,0-1,6	Поля, предназначе нные под посев различных с/х культур	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной	-1
	1,5-2,0	Земли несельскохозяйственного пользования (полосы отчуждения линий электропере дач, газо- и нефтепровод ов, обочины дорог, железнодорожные насыпи)	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-1
EN-UP 75,7%, в.р.г. (757 г/кг) THAI HARVEST LIMITED П-3 26.06.2036 г.	3,0	Пары	Горчак розовый	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-(1)
	0,75–1,5	Поля, предназначенные для посева различных культур осенью	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-(1)
	0,75–1,5	Поля, предназначенные для посева различных культур весной	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-(1)
	1,0–2,0	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-(1)
РАУНД 80 % в.д.г. (800 г/кг) ТОО «HARVEST Ltd» («Харвест Ltd») П-3 23.02.2034	1,0-1,6	Поля предназначенные под посев различных сельскохозяйственных культур	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью	-1
	1,0-1,5	Поля предназначенные под посев различных сельскохозяйственных культур	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной	-1
	1,0-1,6	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-1
СОНРАУНД СТАР 77%, в.д.г. (770 г/кг) ТОО «A.S.K. Kazakhstan» («А.С.К. Казахстан») П-3 28.12.2032 г.	1,0-1,6	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-(1)
	3,0	Пары	Горчак розовый, тростник обыкновенный	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-(1)
	1,0-1,6	Поля предназначе нные под посев различных с/х культур	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной	-(1)
	1,5-2,0	Земли несельсхозо яйственного назначения	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-(1)
ТУРБОГЛИФ, 775 в.д.г. (775 г/кг) ТОО «Достык-Агро 2012» П-3 28.03.2034 г.	1,0-1,6	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-1
	3,0	Пары	Горчак розовый	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-1
	1,0-1,6	Поля, предназначенные под посев различных с/х культур	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной	-1
ФЕЛИКС 757, в.д.г. (757 г/кг) ДВА Агро ГМБХ, Германия П-4 13.01.2031 г.	0,75-1,0	Пары	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-1
	2,0	Пары	Многолетние злаковые и двудольные сорняки, в т.ч. гумай, тростник	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-1
	3,0	Пары	Горчак розовый	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-1

	1,0-1,5	Поля, предназначенные под посев с/х культур	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующей растительности весной	-1
	2,0	Поля, предназначенные под посев с/х культур	Многолетние злаковые и двудольные сорняки, в т.ч. гудай, тростник	Опрыскивание вегетирующей растительности весной	-1
	3,0	Поля, предназначенные под посев с/х культур	Горчак розовый	Опрыскивание вегетирующей растительности весной	-1
	1,5-2,0	Земли несельскохозяйственного использования	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-1
	2,0	Земли несельскохозяйственного использования	Многолетние злаковые и двудольные сорняки, в т.ч. гудай, тростник	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-1
	3,0	Земли несельскохозяйственного использования	Горчак розовый	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-1
ФУХА ГЛИФОСАТ 757, в.г. (757 г/кг) Сычуань Лэшань Фуха Тонгда Агро-Кемикал Технолоджи Ко., Лтд, Китай П-3 13.08.2028 г.					
ФАРАОН ГАРАНТ 757, в.д.г. (757 г/кг) ТОО «Агро Mark Kaz» П-4 04.12.2035 г.	0,75-1,0	Пары	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-1
	2,0	Пары	Многолетние злаковые и двудольные сорняки, в т.ч. гудай, тростник, пырей	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-1
	3,0	Пары	Горчак розовый	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-1
	1,0-1,5	Поля, предназначенные под посев с/х культур	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующей растительности весной	-1
	2,0	Поля, предназначенные под посев с/х культур	Многолетние злаковые и двудольные сорняки, в т.ч. гудай, тростник, пырей	Опрыскивание вегетирующей растительности весной	-1
	3,0	Поля, предназначенные под посев с/х культур	Горчак розовый	Опрыскивание вегетирующей растительности весной	-1
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 888 г/кг					
РИДОВЕР ЭКСТРА, в.г. (888 г/кг) ШАНДОНГ ВЕЙФАНГ РЕЙНБОУ КЕМИКАЛ КО., ЛТД, П-3 11.04.2027 г.	1,0-1,6	Поля, предназначенные под посев сельскохозяйственных культур	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-1
	1,0-1,6	Пары	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-1

Глифосат (изопропиламинная соль)

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 360 г/л					
ВАЛСАГЛИФ, в.р. (360 г/л) Стоктон Кемикал Корпорейшн, США П-3 11.02.2030 г.	2,0-4,0	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-1
	6,0	Пары	Горчак розовый	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-1
	3,0	Земли несельскохозяйственного назначения	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-1
	4,0-5,0	Земли несельскохозяйственного назначения	Многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-1
	6,0	Земли несельскохозяйственного назначения	Трудноискореняемые сорняки (вьюнок полевой)	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-1
ВИХРЬ, в.р. (360 г/л) ООО Резерв, Россия П-3 11.07.2027 г.	2,5-3,0	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-1
	6,0	Пары	Горчак розовый	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-1
	3,0-6,0	Земли несельскохозяйственного пользования	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание вегетирующих сорняков	-1
	8,0-10,0	Дренажные каналы и их обочины	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки, в т.ч. тростник и рогоз	Опрыскивание каналов до затопления их водой	-1
ЖОЙКЫН, в.р. (360 г/л) Моер Кемсайенс Ко. Лтд., Китай П-4 10.12.2028 г.	2,5-3,0	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-1
	6,0	Пары	Горчак розовый	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-1
	3,0-6,0	Земли несельскохозяйственного назначения	Однолетние и многолетние злаковые двудольные сорняки	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-1
ПАССАТ, в.р. (360 г/л) Представительство ООО «Агро Эксперт Групп» в РК П-3 03.02.2035 г.	2,0-4,0	Поля, предназначенные под посев различных культур	Однолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости 100-200 л/га.	-1
	4,0-6,0	Поля, предназначенные под посев различных культур	Многолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости 100-200 л/га.	-1
	6,0	Поля, предназначенные под посев различных культур	Злаковые сорняки (горчак розовый, молочай лозный, свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой)	Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости 100-200 л/га.	-1
	2,0-4,0	Пары	Однолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости 100-200 л/га.	-1

	4,0-6,0	Пары	Многолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости 100-200 л/га.	-1
	6,0	Пары	Зластные сорняки (горчак розовый, молочай лозный, свинорой, выюнок полевой, бодяк полевой)	Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости 100-200 л/га.	-1
	3,0-4,0	Земли несельскохозяйственного пользования (охранные зоны линий электропере дач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и другие промышленные территории)	Однолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости 100–200 л/га.	-1
	4,0-6,0	Земли несельскохозяйственного пользования (охранные зоны линий электропере дач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и другие промышленные территории)	Многолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости 100–200 л/га.	-1
	2,0-4,0	Поля, предназначенные под посев различных культур	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Предпосевное опрыскивание вегетирующих сорняков весной. Расход рабочей жидкости 100-200 л/га	-1
ПИЛАРАУНД, в.р. (360 г/л) Пиларквим (Шанхай) Ко.,Лтд., Китай П-4 24.02.2027 г.	2,5-3,0	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание сорняков в период активного роста	-1
	6,0	Пары	Горчак розовый	Опрыскивание сорняков в период активного роста	-1
РИДАУТ, в.р. (360 г/л) ШАНДОНГ ВЕЙФАНГ РЕЙНБОУ КЕМИКАЛ КО., ЛТД, П-3 26.12.2026 г.	2,0-4,0	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-1
	6,0	Пары	Горчак розовый	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-1
	2,0-4,0	Поля, предназначенные под посев различных сельскохозяйственных культур	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послепосевный период	-1
	3,0-6,0	Земли несельскохозяйственного пользования (полосы отчуждения линий электропере дач, газо- и нефтепроводов, обочины дорог, железнодорожные насыпи)	Однолетние и многолетние сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков	-1
РАП, в.р. (360 г/л) ООО "Форвард", Россия П-4 28.01.2029г.	2,0-4,0	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-1
	6,0	Пары	Горчак розовый	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-1
	2,0-4,0	Яблоня, виноградники	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом (при условии защиты культуры)	-1
	4,0-6,0	Виноградник и	Многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом (при условии защиты культуры)	-1
	4,0-8,0	Яблоня	Многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом (при условии защиты культуры)	-1
	2,0-4,0	Поля, предназначенные под посев различных культур (гречиха)	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послепосевный период	-1
	3,0	Поля, предназначенные под посев различных культур (пшеница яровая)	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послепосевный период	-1
СОНРАУНД 48%, в.р. (360 г/л) AGROBEST GRUP, Турция П-4 17.02.2030 г.	2,0-4,0	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-1
	6,0	Пары	Горчак розовый	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-1
	5,0-7,0	Земли несельскохозяйственного назначения (полосы отчуждения линий электропере дач, газо- и нефтепроводов, обочины дорог, железнодорожные насыпи)	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-1
СПРУТ, в.р. (360 г/л) АО «Щелково Агрохим» П-4 21.02.2029 г.	2,0-3,0	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание осево-уборочных сорняков за 2 недели до уборки урожая (при влажности зерна не более 30 %) для подсушивания зерна и частичного подавления сорняков. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га	-1
	6,0	Пары	Горчак, тростник, свинорой, выюнок полевой	Опрыскивание осево-уборочных сорняков за 2 недели до уборки урожая (при влажности зерна не более 30 %) для подсушивания зерна и частичного подавления сорняков. Расход рабочей жидкости 100-200 л/га	-1
	2,0-4,0	Поля предназначенные под посев различных с/х культур	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послепосевный период	-1
	4,0-6,0	Поля предназначенные под посев различных с/х культур	Многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послепосевный период	-1
	6,0-8,0	Поля предназначенные под посев различных с/х культур	Зластные многолетние (свинорой, выюнок полевой, бодяк полевой)	Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послепосевный период	-1

	7,0	Открытая коллекторно- дренажная и оросительная сеть	Однолетние и многолетние сорняки, в т.ч. гидрофитные (тростник, рогоз и др.)	Опрыскивание по вегетирующим сорнякам в период интенсивного оттока питательных веществ в корневую систему (июль-сентябрь)	-1
	3,0-5,0	Открытая коллекторно-дренажная и оросительная сеть	Однолетние и многолетние сорняки, в т.ч. гидрофитные (тростник, рогоз и др.)	Повторное опрыскивание на следующий год оставшихся вегетирующих сорняков	-(1)
	3,0	Пшеница яровая	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов за 2 недели до уборки (при влажности зерна не более 30%) для подсушивания зерна и частичного подавления сорняков	-1
	2,0-4,0	Поля, предназначенные под посев различных с.х. культур	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной. Расход рабочей жидкости 100-200 л/га.	-1
ТРИУМФ 48%, в.р. (360 г/л) ОО «ФМРус» П-4 25.02.2036 г.	2,0-3,0	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-1
	6,0	Пары	Горчак розовый	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-1
ТОРНАДО, в.р. (360 г/л) АО Фирма «Август» П-3 27.12.2032 г.	2,0-4,0	Пары	Однолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га	-1
	4,0-6,0	Пары	Многолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости 100-200 л/га	-1
	6,0	Пары	Злостные (горчак, свинорой, выюнок полевой, бодяк полевой)	Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га	-1
	2,0-4,0	Плодовые, виноградник и	Однолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом (при условии защиты культуры). Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га.	-1
	4,0-6,0	Плодовые	Многолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом (при условии защиты культуры). Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га	-1
	4,0	Виноградники	Многолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом (при условии защиты культуры). Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га	-1
	2,0-4,0	Поля, предназначенные под посев сельскохозяйственных культур	Однолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послепосевной период. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га.	-1
	4,0-6,0	Поля, предназначенные под посев сельскохозяйственных культур	Многолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послепосевной период. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га	-1
	6,0	Поля, предназначенные под посев сельскохозяйственных культур	Злостные (горчак ползучий, выюнок полевой, молочай лозный, свинорой пальчатый, тростник обыкновенный, софора лисохвостая и другие)	Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послепосевной период. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га	-1
	6,0	Дренажные каналы и их обочины	Многолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание каналов до затопления их водой. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га	-1
	3,0	Земли несельскохозяйственного пользования	Однолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га	-1
	6,0	Земли несельскохозяйственного пользования	Многолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га	-1
	Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 450 г/л				
ГЛИФОС ПРЕМИУМ, в.р. (450 г/л) Кеминова А/С, Дания П-4 18.01.2028 г.	2,25	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-1
	4,5	Пары	Горчак розовый	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-1
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 480 г/л					
Виктори в.р. (41%-480 г/л) SHANDONG BINNONG TECHNOLOGY CO., LTD. П-3 27.12.2033 г.	2,0-4,0	Поля, предназначенные под посев различных сельскохозяйственных культур	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной	-1
ДОМИНАТОР МЕГА, в.р. (480 г/л) Дау АгроСенсес, США П-4 26.01.2027 г.	2,0-2,2	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-1
	4,25	Пары	Горчак розовый	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-1
	2,0-3,0	Земли несельскохозяйственного использования	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-1
КЕРНЕЛ, в.р. (480 г/л) Кеминова А/С, Дания П-4 13.11.2028 г.	2,25	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-1
	4,5	Пары	Горчак розовый	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-1
ТОРНАДО 500, в.р. (500 г/л) АО Фирма «Август» П-3 10.02.2033 г.	2,0	Поля, предназначенные под посев различных с/х культур.	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной. Расход рабочей жидкости 50-200л/га	-1

01.10.2030 г.	2,0	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-1
	4,32	Пары	Горчак розовый	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-1
	1,5-4,0	Поля, предназначенные под посев различных с/х культур	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послеуборочный период	-1
	2,0-3,0	Земли несельскохозяйственного пользования	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-1
	1,0-1,5	Пшеница яровая	Десикация культурных растений	Опрыскивание в начале восковой спелости	-1
ФУХУА ГЛИФОСАТ 360, в.р. (480 г/л) Сычуань Лэшань Фухуа Тонгда Агро-Кемикал Технолоджи Ко., Лтд, Китай П-3 13.08.2028 г.					
2,0-6,0	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости 200 л/га	-1	
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 800 г/л					
ПИЛАРСАТО СУПЕР, в.р. (800 г/л) Пиларквим (Шанхай) Ко.,Лтд. П-4 19.01.2034 г.	1,0-2,0	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста	- (1)
	2,5-3,0	Пары	Горчак розовый	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста	- (1)
	1,0-2,0	Поля, предназначенные под посев различных сельскохозяйственных культур	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной	- (1)
	1,0-2,0	Поля, предназначенные под посев различных сельскохозяйственных культур (стерня)	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью	- (1)

Глифосат (изопропиламинная и калиевая соль)

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 540 г/л					
БАЙСАТ 540, в.р. (540 г/л) Филиал "Hangzhou Ruijiang Crop Science Co.,Ltd., Казахстан" "Hangzhou Ruijiang Crop Science Co., Ltd.,Китай" в городе Алматы П-3 17.01.2035 г.	1,5-2,5	Поля, предназначенные под посев различных с/х культур осенью	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью	- (1)
	1,5-2,0	Поля, предназначенные под посев различных с/х культур весной	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной	- (1)
	4,0	Пары	Горчак розовый	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	- (1)
	1,5-2,5	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	- (1)
КРЕДИТ ИКСТРИМ, в.р.к. (540 г/л) Нуфарм ГмбХ и Ко КГ, Австрия П-3 31.01.2035 г.	1,5-2,5	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-1
	4,0	Пары	Горчак розовый	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-1
	1,5-2,0	Поля, предназначенные под посев различных сельскохозяйственных культур	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной	-1
	1,5-2,5	Поля, предназначенные под посев различных сельскохозяйственных культур	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью	-1
	1,8-2,8	Земли несельскохозяйственного пользования	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков	-1
	1,5-2,0	Поля, предназначенные под посев различных сельскохозяйственных культур	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной	-1
МОНОЛИТ, в.р. (540 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-3 12.04.2029 г.	1,5-2,5	Поля, предназначенные под посев различных сельскохозяйственных культур	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью	-1
	1,5-2,5	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста	-1
	1,5-2,5	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста	-1
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 404,5 г/л + 295 г/л					
Вентос, в.р.к (404,5 г/л + 295 г/л) ТОО «Terra Prime» П-3 20.04.2036 г.	1,5-2,5	Поля, предназначенные под посев различных сельскохозяйственных культур	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной	-1
	1,5-2,5	Поля, предназначенные под посев различных сельскохозяйственных культур	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью	-1
	1,5-2,5	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста	-1

Глифосат (калиевая соль)

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 360 г/л					
ТОТАЛ ПЛЮС, в.р. (360 г/л) ТОО «Бартонс Кемикал ГмбХ» П-3 17.02.2030 г.	2,0-4,0	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-1
	6,0	Пары	Горчак розовый	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-1
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 450 г/л					
СТИРАП, 45% в.р. (450 г/л) ТОО «Агро Глобал» П-4 30.06.2036 г.	4,5	Пары	Горчак розовый	Опрыскивание сорняков в период активного роста	-1
	2,0-5,0	Земли несельскохозяйственного пользования	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной	-1
	2,25	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание в период вегетации	-1
	1,8-2,4	Поля, предназначенные под посев различных с.х. культур	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание весной	-1

	1,8-3,0	Поля, предназначенные под посев различных с.х. культур	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание осенью	-1
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 480 г/л					
ПАССАТ 480, в.р. (480 г/л) ООО «Агро Эксперт Групп», Россия П-3 09.09.2035 г.	1,7 – 2,25	Поля, предназначенные под посев различных культур	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной. Расход рабочей жидкости 100-200 л/га.	-1
	1,7 – 2,8	Поля, предназначенные под посев различных культур	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью. Расход рабочей жидкости 100-200 л/га.	-1
	2,0 – 2,2	Пары	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков. Расход рабочей жидкости 100-200 л/га.	-1
	4,25	Пары	Горчак розовый	Опрыскивание вегетирующих сорняков. Расход рабочей жидкости 100-200 л/га.	-1
	2,0 – 3,0	Земли несельскохозяйственного использования	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости 100-200 л/га.	-1
	2,0 – 2,25	Земли, засоренные карантинным и сорняками	Виды амброзии, повилики и паслена колючего	Опрыскивание вегетирующих сорняков. Расход рабочей жидкости 100-200 л/га.	-1
РАУНДАП ФЛЕКС, в.р.к. (480 г/л) Bayer Agriculture BV, Бельгия П-3 02.05.2029 г.	1,5-2,25	Поля, предназначенные под посев различных яровых зерновых, технических, масличных, бахчевых, овощных культур, посадки картофеля	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной до посева культуры	-1
	1,5-2,25	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста	-1
	4,5	Пары	Горчак ползучий (розовый)	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста	-1
	1,5-2,25	Стерня	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков после уборки предшественника осенью	-1
ТАЧДАУН 500, в.р. (500 г/л) Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария П-3 12.04.2033 г.	2,0-2,1	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной	-1
	4,0	Пары	Горчак розовый	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной	-1
	4,0-5,0	Коллекторно- дренажная оросительная сеть, каналы и их обочины	Тростник обыкновенный	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной	-1
	2,0-3,0	Земли несельскохозяйственного назначения	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной	-1
31.10.2034 г.	1,2-1,8	Поля, предназначенные под посев разных сельскохозяйственных культур	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков за 3-7 дней до посева культуры	-1
ТОТАЛ ЭКСТРА, в.р. (500 г/л) ТОО «Бартонс Кемикал ГмБХ» П-3 10.03.2031 г.	1,5-2,0	Пары	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-1
	4,32	Пары	Горчак розовый	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-1
	1,2-1,8	Поля, предназначенные под посев различных сельскохозяйственных культур	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной до посева культур	-1
УРАГАН ФОРТЕ 500, в.р. (500 г/л) Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария П-3 05.09.2033 г.	2,0-4,0	Поля, после уборки хлопчатника, овощей и других сельхозкультур	Вегетирующие однолетние и многолетние сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков после уборки культуры (осенью)	-1
	2,0-2,1	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание сорняков в период активного роста	-1
	4,0	Пары	Горчак розовый	Опрыскивание сорняков в период активного роста	-1
	4,0-5,0	Коллекторно- дренажная оросительная сеть, каналы и их обочины	Тростник обыкновенный	Опрыскивание сорняков в период активного роста	-1
	2,0-3,0	Земли несельскохозяйственного использования	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание сорняков в период активного роста	-1
	1,2-1,8	Поля, предназначенные под посев разных сельскохозяйственных культур	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков за 3-7 дней до посева культуры	-1
ФАКЕЛ ЭКСТРА, р.к. (500 г/л) ООО «ХИМАГРОМАРКЕТИНГ.РУ», Россия П-3 18.08.2027 г.	2,0-4,0	Пары и поля, предназначенные под посев разных сельскохозяйственных культур	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-1
ЭНТОГЛИФОС 50% в.р. (500 г/л) IFODA AGRO KIMYO NIMOYA, Узбекистан П-3 20.01.2031 г.	3-4	Поля, предназначенные под посев разных сельскохозяйственных культур в послеуборочный период	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или осенью послеуборочный период	-1
	3-4	Земли несельскохозяйственного пользования	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га.	-1
	3-4	Поля, предназначенные под посев сельскохозяйственных культур	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной.	-1
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 540 г/л					
АгроКлин 540 в.р. (540 г/л) ТОО «LoveLand AGRO	2,0-2,5	Пары	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости - 100- 200 л/га	-1

Service» П-3 20.07.2036 г.	1,7-2,2	Поля, предназначенные под посев различных сельскохозяйственных культур	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-1
АРГУМЕНТ СТАР, в.р. (540 г/л) Лейтон Агрио Европа КФТ Венгрия П-3 22.02.2029 г.	1,5-2,5	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-1
	4,0	Пары	Горчак ползучий (розовый)	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-1
21.02.2030 г.	1,5-2,5	Поля, предназначенные под посевы с/х культур	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной	-1
АрдГЛИФ, в.р. (560 г/л) Nanjing Rinchen International Trading Co.LTD П-3 20.06.2032 г.	1,5- 2,0	Поля под посевы различных с/х культур	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание сорняков в период активного роста.	(1)
	4,0	Поля под посевы различных с/х культур	Горчак		
	1,5- 2,5	Пары	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки		
	2,0 – 4,0	Земли не сельскохозяйственного использования	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки		
	1,5-2,5	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га	-1
	2,6-4,0			Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послеуборочный период культур или весной за 2 недели до посевных работ культур. Расход рабочей жидкости 100-200 л/га	
	1,5-2,0	Поля, предназначенные под посев яровых зерновых, овощных, картофеля, технических (в том числе лен), масличных, бахчевых культур)	Однолетние злаковые и двудольные сорняки, многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности. Расход рабочей жидкости 100-200 л/га	
	2,6-4,0				
	2,0-5,0	Сенокосы и пастбища при их окультуривании	Лиственные древеснокустарниковые породы (осина, ольха, ива)	Опрыскивание нежелательной сорной растительности. Не допускается сбор грибов и ягод в сезон проведения обработки территорий. Расход рабочей жидкости 100-200 л/га	
	2,0 4,0	Земли не сельскохозяйственного назначения (охраняемые зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения, железных и шоссейных дорог, аэродромы и другие промышленные территории)	Однолетних и чувствительных многолетних нежелательных злаковых и двудольных травянистых растений, всех видов нежелательных травянистых растений (за исключением относительно устойчивых вейника, тростника и др.), лиственных древеснокустарниковых пород (осина, береза, ольха и др.); относительно устойчивых нежелательных травянистых растений (вейник, тростник и др.), лиственных древеснокустарниковых пород (ива, клен, ясень, вяз, акация и др.)		
	3,0-5,0				
	2,0	Зерновые	Десикация	Опрыскивание посевов за 2 недели до уборки урожая (при влажности зерна не более 30 %) для подсушивания зерна и частичного подавления сорняков. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га.	
EN-UP Xtra, в.р. (540 г/л) THAI HARVEST LIMITED П-3 26.06.2036 г.	1,5–2,5	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста	- (1)
	1,5–2,5	Поля, предназначенные для посева различных культур осенью	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью	- (1)
	1,5–2,0	Поля, предназначенные для посева различных культур весной	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной до посева	- (1)
БАЗУКА, в.р. (540 г/л) Жеджанг Жонгшан Кемикал ГруппСток Ко., Лтд, Китай П-3 27.02.2030 г.	2,0-2,2	Пары	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание в период вегетации	-1
	4,25	Пары	Горчак розовый	Опрыскивание в период вегетации	-1
	1,5-2,0	Поля, предназначе нные для посев с/х культур	Однолетние и многолетние злаковые двудольные сорняки	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-1
Батыр 540, в.р. (540 г/л) ТОО "MKR PLUS" П-3 26.05.2036 г.	3,0-5,0	Земли несельскохозяйст венного назначения	Относительно устойчивые нежелательные травянистые растения (вейник, тростник) лиственные древесно - кустарниковые породы (ива, клен, ясень, вяз, акация)	Опрыскивание нежелательной сорной растительности в период активного роста. Расход рабочей жидкости 100–200 л/га. Не допускается сбор дикорастущих ягод и грибов в сезон проведения обработки. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки	-1
	1,4-2,8	Земли несельскохозяйст венного назначения	Однолетние и чувствительные многолетние нежелательные злаковые двудольные травянистые растения	Опрыскивание нежелательной сорной растительности в период активного роста. Расход рабочей жидкости 100– 200 л/га. Не допускается сбор дикорастущих ягод и грибов в сезон проведения обработки. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки	-1
	1,4-2,8	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости 200–300 л/га.	-1

	2,8-3,7	Поля, предназначенные под посев яровых культур, возделываемых при минимальной и нулевой технологиях обработки	Многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной до посева. Расход рабочей жидкости 200–300 л/га.	-1
	1,4-2,8	Поля, предназначенные под посев яровых культур, возделываемых при минимальной и нулевой технологиях обработки	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной до посева. Расход рабочей жидкости 200–300 л/га.	-1
	2,8-3,7	Поля, предназначенные под посев различных культур	Многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости 200–300 л/га.	-1
	1,4-2,8	Поля, предназначенные под посев различных культур	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости 200–300 л/га.	-1
ВОЛЬНИК, в.р. (540 г/л) ООО «Франдеса», Беларусь П-3 04.07.2029 г.	1,5-2,5	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-1
	4,0	Пары	Горчак розовый	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-1
	1,5-2,0	Поля, предназначенные под посев разных с/х культур	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной	-1
	1,5-2,5	Поля, предназначе нные под посев разных с/х культур	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью	-1
	1,8-5,0	Земли несельскохозяйственного пользования	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков	-1
	4,0	Оросительн ые каналы и их обочины	Многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание каналов до затопления их водой	-1
VEPR 540, в.р. (540 г/л) ТОО «Farm Agrochemical Products» П-3 08.04.2034 г.	1,5-3,0	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-(1)
	1,5-2,5	Поля, Предназначенные под посев различных сельскохозяйственн ых культур.	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или до всходов культуры.	-(1)
ГЛИФОШАНС СУПЕР, в.р. (540 г/л) ООО «Шанс» П-3 07.03.2029 г.	1,4-2,8	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости: наземное опрыскивание – 100-200 л/га	-1
	1,4-2,8	Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепровод ов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы)	Однолетние и чувствительные многолетние нежелательные злаковые и двудольные травянистые растения	Опрыскивание нежелательной сорной растительности. Не допускается сбор грибов и ягод в сезон проведения обработки территорий. Расход рабочей жидкости: наземное опрыскивание – 100-200 л/га	-1
	2,0-3,0	Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепровод ов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы)	Все виды нежелательных травянистых растений (за исключением относительно устойчивых вейника, тростника), листовые древесно- кустарниковые породы (осина, береза, ольха)	Опрыскивание нежелательной сорной растительности. Не допускается сбор грибов и ягод в сезон проведения обработки территорий. Расход рабочей жидкости: наземное опрыскивание – 100-200 л/га	-1
	1,4-2,5	Поля предназначенные под посевы и посадку зерновых, зернобобовых, овощных, картофеля, технических (в т.ч. льна) масличных и бобовых	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной, в конце лета или осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости 100-200 л/га	-(1)
	2,5-4,0	Цветочных, декоративных, плодовых, злаковых и двудольных однолетних и многолетних трав, в том числе газонных	Многолетние злаковые и двудольные сорняки		
ГЛИФАТ 540, в.р. (540 г/л) ТОО «Explanta» П-3 27.02.2028 г.	1,5-2,5	Пары	Однолетние, многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	-1
	4,0	Пары	Горчак розовый (ползучий)	Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	-1
	1,5-2,0	Поля, предназначенные под посев разных сельскохозяйственных культур	Однолетние, многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	-1
	1,5-2,5	Поля, предназначенные под посев разных сельскохозяйственных культур	Однолетние, многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	-1
ГЛИФОСАТ 540, в.к. (540 г/л) ТОО «Агро-Хим-Лидер» П-3 27.12.2034 г.	1,5-2,5	Поля, предназначе нные под посев различных с/х культур	Однолетние и некоторые многолетние злаковые и двудольные сорняки (осоты)	Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью. Расход рабочей жидкости - 200 - 300л/га	-1
	1,5-2,5	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание сорняков в период активного роста.Расход рабочей жидкости - 200 -300л/га	-1
	4,0	Пары	Горчак розовый (ползучий)	Опрыскивание сорняков в период активного роста. Расход рабочей жидкости -200 -300л/га	-1

ГРАНД ЭКСТРА 540, в.р. (540 г/л) ТОО «QADAM Group» (Кадам Групп) П-3 15.07.2036 г.	1,5-2,5	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание в период активного роста сорняков	-1
	4,0	Пары	Горчак ползучий (розовый)	Опрыскивание в период активного роста сорняков	-1
	1,5-2,0	Поля, предназначенные под посев различных культур	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание в период активного роста сорняков.	-1
	1,5-2,0	Поля, предназначенные под посев различных культур	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послеуборочный период	-1
	1,5-2,5	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послеуборочный период	-1
Глифор Форте, в.р. (540 г/л) ООО «Интер Групп» П-3 16.08.2034 г.	4,0	Пары	Горчак	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста	- (1)
	2,8-4,0	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста	- (1)
	1,5-2,5	Поля, предназначенные под посев различных культур	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной до посева или до всходов культуры	- (1)
	2,0-4,0	Земли несельскохозяйственного пользования	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание нежелательной сорной растительности в период активного роста	- (1)
ДРАКОН ФОРТЕ, в.р. (540 г/л) НАНЬЦЗИН ЭССЕНС ФАЙН-КЕМИКАЛ КО. ЛТД П-3 28.07.2036 г.	1,5-2,0	Поля предназначенные под посев различных с/х культур	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью	- (1)
	1,5-2,0	Поля предназначенные под посев различных с/х культур	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной	- (1)
	4,0	Пары	Горчак розовый	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	- (1)
	1,5-3,0	Земли не сельскохозяйственного использования	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	- (1)
	1,5-2,5	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	- (1)
КАЛИБР 540, в.р. (540 г/л) ТОО «Айбад-2015» РК П-4 11.06.2031	1,5-2,0	Поля, предназначенные под посев с/х культур	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-1
	2,0-2,2	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости -100-200 л/га	-1
	4,25	Пары	Горчак ползучий (розовый)	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-1
КУНГФУ 54%, в.р. (540 г/л) Шандонг Биннонг Технолоджи Ко.Лтд, Китай П-3 18.01.2028 г.	2,0-2,2	Пары	Однолетние и многолетние Двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание в период вегетации	-1
	4,25	Пары	Горчак розовый	Опрыскивание в период вегетаций	-1
	1,7-2,2	Поля, предназначенные под посев разных сельскохозяйственных культур	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной	-1
МЕТЕОР 540, в.р. (540 г/л) ТОО «Агро Глобал» П-4 24.01.2029 г.	2,0-2,1	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной	-1
	4,0	Пары	Горчак розовый	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной	-1
	4,0-5,0	Коллекторно- дренажная оросительная сеть, каналы и их обочины	Тростник обыкновенный	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной	-1
	2,0-3,0	Земли несельскохозяйственного назначения	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной	-1
	1,2-1,8	Поля, предназначенные под посев разных сельскохозяйственных культур	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков за 3-7 дней до посева культуры	-1
НАПАЛМ, в.р. (540 г/л) Юнайтед Агри-Кемикал Компани ГмбХ, Швейцария П-4 12.04.2031 г.	1,5-2,5	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-1
	4,0	Пары	Горчак розовый	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-1
РАУНДАП ЭКСТРА, 54% в.р. (540 г/л) ТОО «Байер КАЗ» П-3 28.07.2036 г.	1,5-2,0	Поля предназначенные под посев различных яровых, зерновых, технических, масличных, бахчевых, овощных культур, картофеля	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной до посева культуры. Расход рабочей жидкости 150-200 л/га	-1
	1,5-2,5	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости 150-200 л/га	-1
	4,0	Пары	Горчак ползучий (розовый)	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости 150-200 л/га	-1
	1,5-2,5	Стерня	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью. Расход рабочей жидкости 150-200 л/га	-1

Раунд Голд, в.р. (540 г/л) ТОО «Golden Agro Plant» П-3 22.04.2036 г.	1,5-2,5	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-(1)
	1,5-2,0	Поля, предназначенные для посева различных культур весной	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-(1)
	1,5-2,0	Поля, предназначенные для посева различных культур осенью	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-(1)
РИД ЭВЕЙ, в.р. (540 г/л) ШАНДОНГ ВЕЙФАНГ РЕЙНБОУ КЕМИКАЛ КО., ЛТД, П-3 14.03.2027 г.	1,5-2,5	Поля, предназначе нные под посев сельскохозяйственных культур	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной	-1
	1,5-2,5	Пары	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-1
	1,5-2,5	Поля, предназначе нные под посев сельскохозяйственных культур	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью	-(1)
Раунд экстра, в.р. (540 г/л) ТОО "НордАгроТрейд" П-3 29.05.2036 г.	1,5-2,0	Поля предназначенные под посев различных сельскохозяйственных культур	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной	-(1)
	1,5-2,5	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-(1)
	1,5-2,5	Поля предназначенные под посев различных сельскохозяйственных культур	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью	-(1)
Страйк, в.р. (540 г/л) ТОО "EcoSave" П-3 07.04.2036 г.	1,5-3,0	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста	-(1)
	1,5-2,0	Поля, предназначенные под посев различных культур	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание нежелательной сорной растительности в период активного роста	-(1)
САРМАТ ЭКСТРА 54%, в.р. (540 г/л) Hangzhou Ruijiang Crop Science Co., Ltd., Китай П-3 30.03.2028 г.	1,5-2,5	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание сорняки сорняков в период активного роста	-1
	4,0	Пары	Горчак розовый	Опрыскивание сорняков в период активного роста	-1
	1,5-2,0	Поля, предназначенные под посев разных сельскохозяйст венных культур	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной	-1
	1,5-2,5	Поля, предназначе нные под посев разных сельскохозяйственных культур	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью	-1
СМЕРЧ, в.р. (540 г/л) ТОО «Астана-Нан» П-3 02.10.2030 г	2,0-2,2	Пары	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание в период вегетации	-1
	4,25	Пары	Горчак розовый	Опрыскивание в период вегетации	-1
	1,7-2,2	Поля, предназначе нные под посев разных с/х культур	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной	-1
	1,7-2,2	Пшеница яровая	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскиваниепосевов после уборки культуры	-(1)
	1,7-2,2	Земли несельскохозяйист венного пользования	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание по вегетирующим сорнякам	-(1)
	1,7-2,2	Коллекторно дренажная оросительная сеть, каналы и их обочины	Однолетние и многолетние сорняки, в т.ч. рогоз, тростник обыкновенный и др.	Опрыскивание по вегетирующим сорнякам в период оттока питательныхвеществ в корневую систему	-(1)
	1,5	Пшеница яровая	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов за 2 недели до уборки для подсушивания зерна и частичного подавления сорняков	-1
	1,5-4,0	Поля, предназначенные под посев различных с/х культур	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послеуборочный период	-(1)
СОТЕМ XL 54 %, в.р. (540 г/л) ТОО «Eurasia Crop Care» П-4 05.12.2032 г.	1,5-2,0	Поля, предназначе нные под посев сельскохозяйственных культур	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости 100-200 л/га	-1
	1,5-2,5	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости 100-200 л/га	-1
СПРУТ ЭКСТРА, в.р. (540 г/л) АО «Щелково Агрохим» П-3 11.07.2030 г.	1,5-2,5	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-1
	4,0	Пары	Горчак розовый	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-1
	1,5-2,0	Поля, предназначенные под посев различных с/х культур	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной	-1
	1,5-2,5	Поля, предназначенные под посев различных с/х культур	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью	-1
	1,8-2,8	Земли несельскохозяйственного пользования	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков	-1
Тайфун экстра, в.р. (540 г/л) ШАНДОНГ ВЕЙФАНГ РЕЙНБОУ КЕМИКАЛ КО., ЛТД П-3 13.02.2036 г.	1,5-2,5	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-1
	4,0	Пары	Горчак розовый	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-1
	1,5-2,0	Поля, предназначенные под посев различных с/х культур	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорняков до посева весной	-1

	1,5-2,5	Поля, предназначенные под посев различных с/х культур	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорняков после уборки культуры (осенью)	-1
ТЕРЕКС, в.р. (540 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-4 30.07.2031 г.	1,5-2,5	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание сорняков в период активного роста	-1
	4,0	Пары	Горчак розовый	Опрыскивание сорняков в период активного роста	-1
	1,5-2,0	Поля, предназначенные под посев разных с/х культур	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной	-1
	1,5-2,5	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-1
ТРИУМФ МАСТЕР, в.р. (540 г/л) ARCUS INVEST HOLDING B.V. П-3 17.02.2030 г.	4,0	Пары	Горчак розовый	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-1
	1,5-2,0	Поля, предназначе нные под посев различных сельскохозяйственных культур	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной	-1
	1,8-2,8	Земли несельскохозяйственного пользования	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков	-1
	1,7-2,2	Поля, предназначенные под посев разных сельскохозяйственных культур	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной	-(1)
ТОМАГАВК, в.р. (540 г/л) ТОО «ФМРус» П-3 26.07.2032 г.	4,25	Пары	Горчак розовый	Опрыскивание в период вегетации	-(1)
	2,0-2,2	Пары	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание в период вегетации	-(1)
	2,0-4,0	Земли не сельскохозяйстве нного использования	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-1
	2,0-4,0	Земли несельхозхоз яйственного пользования	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание нежелательной сорной растительности в период активного роста. Расход рабочей жидкости 50-200 л/га.	-1
ТОРНАДО 540, в.р. (540 г/л) АО Фирма «Август» П-3 19.01.2027 г.	1,5-2,0	Поля, предназначе нные под посев различных культур	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной до посева или до всходов культуры Расход рабочей жидкости 50-200 л/га.	-1
	1,5-2,5	Поля, предназначе нные под посев различных культур	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послепоборочный период. Расход рабочей жидкости 50-200 л/га.	-1
	1,5-2,5	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости 50-200 л/га.	-1
	4,0	Пары	Горчак	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости 50-200 л/га.	-1
	1,5-2,5	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание сорняков в период активного роста. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	-1
ФАРАОН ГОЛД 54%, в.р. (540 г/л) ТОО «Agro Mark Kaz» П-4 22.11.2033 г.	4,0	Пары	Горчак розовый (ползучий)	Опрыскивание сорняков в период активного роста. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	-1
	1,5-2,0	Поля, предназначенные под посев различных сельскохозяйственных культур	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков до посева весной. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	-1
	1,5-2,0	Поля, предназначенные под посев различных сельскохозяйственных культур	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	-1
	1,5-2,0	Поля, предназначе нные под посев разных с/х культур	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной	-1
Хит, в.р. (540 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-3 30.07.2031	4	Пары	Горчак розовый	Опрыскивание сорняков в период активного роста	-1
	1,5-2,5	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание сорняков в период активного роста	-1
	1,2-3,5	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-1
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 600 г/л					
ЖОЙКЫН МЕГА 60%, в.р. (600 г/л) Моер Кемсайенс Ко, Китай П-3 14.03.2029 г.	3,5	Пары	Горчак ползучий (розовый)	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-1
	1,2-3,5	Поля, предназначе нные под посев различных с/х культур	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной	-1
	1,2-3,5	Поля, предназначенные под посев (посадку) сельскохозяйственных культур	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета и осенью в послепоборочный период, либо весной до посева и всходов культуры.	-1
РАП 600, в.р. (600 г/л) ФОРВАРД П-3 10.02.2036 г.	1,2-3,5	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание сорняков в период их активного роста.	-1
	3,5	Пары	Горчак розовый	Опрыскивание сорняков в период их активного роста.	-1
	1,2-3,5	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-1
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 660 г/л					
Винка Санфосат 660 К, р.к. (660 г/л) ЧЖЭЦЗЯН СИНЬАНЬХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ГРУППА П-3 27.01.2035 г.	3,5-5,0	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста	-(1)

ГЛИФОСАТ-ГОЛД в.р. (690 г/л) ТОО «GOOD JOB INDUSTRY KAZAKHSTAN» («ГУД ДЖОБ ИНДАСТРИ КАЗАХСТАН») П-3 28.02.2032 г.	4,0-4,5	Пары	Горчак ползучий (розовый)	Опрыскивание растений в период их активного роста в чистом виде. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га	-(1)
	2,0-2,2	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста в чистом виде. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га	-(1)
	1,5-2,0	Поля, предназначенные под посев с/х культур	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	-(1)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 770 г/кг					
ТРИУМФ СУПЕР, в.д.г. (770 г/кг) ARCUS INVEST HOLDING B.V. П-3 17.02.2030 г.	1,0-1,6	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	60(1)
	3,0	Пары	Горчак розовый	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	
	1,0-1,6	Поля, предназначе нные под посев различных сельскохозяйственных культур	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной	
	1,5-2,0	Земли несельскохозяйственного пользования	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков	

Глифосат (натриевая соль)

КОСМИК ТУРБО, в.г. (700 г/кг) Ариста ЛайфСайенс С.А.С., Франция П-3 10.04.2027 г.	1,0-4,0	Поля, предназначенные под посев различных сельскохозяйственных культур (зерновые яровые, овощные, технические, масличные)	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные, злостные многолетние сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послеуборочный период	-1
	1,0-4,0	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные, злостныемноголетние сорняки	Опрыскивание в период активного роста сорняков	-1
26.06.2030 г.	1,0-1,5	Поля, предназначенные под посев различных сельскохозяйственных культур	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание сорняков весной до посева культуры. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	-1

Глифосат + 2,4-Д диметиламинная соль

ТЕРЕКС ПРЕМИУМ, в.р. (462 г/л + 168 г/л) Синтезия Кеми ГмБХ, Германия П-3 12.04.2029 г.	1,35-1,45	Поля, предназначенные под посев различных с/х культур	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной	-1
	1,4-1,6	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста	-1

Глифосат + дикват

СПОРТАК УЛЬТРА, в.р. (500 г/л + 35 г/л) Синтезия Кеми ГмБХ, Германия П-3 02.03.2028 г.	1,5-1,8	Поля, предназначенные под посев сельскохозяйственных культур	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной	-1
	1,5-2,0	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста	-1
	1,5-2,0	Поля, предназначенные под посев сельскохозяйственных культур	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью	-1

Глюфосинат аммония

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 150 г/л					
БАСТА 15%, в.р. (150 г/л) BASF SE, Германия П-3 26.01.2027 г.	2,5-3,5	Плодовые, ягодные культуры, виноградники	Многолетние, однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений (при условии защиты культуры)	-2
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 200 г/л					
ОРУЖИЕ, в.р. (200 г/л) ШАНДОНГ ВЕЙФАНГ РЕЙНБОУ КЕМИКАЛ КО., ЛТД., П-3 29.06.2027 г.	3,0-5,0	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-1
Винка Глюфосинат 200, р.к. (200 г/л) ЧЖЭЦЗЯН СИНЬАНЬХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ГРУППА П-3 13.11.2034 г.	3,0 – 7,5	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание во время вегетации сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	-1

Глюфосинат аммония + глифосат аммоний

Винка Санфосэйт Плюс, в.р. (72 г/л +396 г/л) ЧЖЭЦЗЯН СИНЬАНЬХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ГРУППА П-3 22.11.2034 г.	3,0-4,5	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки (в т.ч. пырей)	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-1
	3,0-4,5	Поля, предназначенные под посев разных сельскохозяйственных культур	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной	-1

Десмедифам + фенмедифам

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 100 г/л + 100 г/л					
БИЦЕПС 22, к.э. (100 г/л + 100 г/л) АО Фирма «Август»	3,0	Свекла сахарная	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. виды щирицы	Однократное опрыскивание посевов в фазе 4 настоящих листьев культуры. Расход рабочей жидкости 200-250 л/га	-1

П-3 22.04.2030 г.	1,5	Свекла сахарная	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. виды щирицы	Двукратное последовательное опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков (по первой и второй волне). Расход рабочей жидкости 200-250 л/га	-2
	1,0	Свекла сахарная	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. виды щирицы	Трехкратное последовательное опрыскивание посевов в фазе семядолей сорняков (по первой, второй и третьей волне). Расход рабочей жидкости – 200-250 л/га	-3
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 110 г/л + 110 г/л					
Бетарен 22, мас.к.э. (110 г/л + 110 г/л) АО «Щёлково Агрохим», Россия П-3 11.04.2029 г.	1,0	Свекла сахарная	Однолетние двудольные сорняки (включая виды щирицы)	Последовательное опрыскивание посевов в стадии семядолей у сорняков (по первой, второй и третьей волне). Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га	60 (3)
	1,5	Свекла сахарная	Однолетние двудольные сорняки (включая виды щирицы)	Последовательное опрыскивание посевов в фазу 2-4 листа сорняков (по первой и второй волне). Расход рабочей жидкости 100-200 л/га	60 (2)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 150 г/л + 150 г/л					
БИЦЕПС 300 м.к.э. (150 г/л + 150 г/л) АО Фирма «Август» П-3 03.06.2031 г.	1,0	Свекла сахарная, свекла столовая	Однолетние двудольные сорняки	Трехкратное опрыскивание посевов в фазе семядолей сорняков по первой, второй и третьей волне с интервалом 7-14 дней. Расход рабочей жидкости 200-250 г/л.	-3
	1,5	Свекла сахарная, свекла столовая	Однолетние двудольные сорняки	Двукратное опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков по первой и второй волне с интервалом 7-14 дней. Расход рабочей жидкости 200-250 г/л.	-2

Дикамба (диметиламинная соль)

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 480 г/л					
БАНВЕЛ 480, в.р. (480 г/л) Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария П-4 16.11.2032 г.	0,15-0,5	Пшеница яровая и озимая, рожь, овес, ячмень, просо	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4- Д и 2М-4Х	Применяется как добавка к 2,4-Д и 2М- 4Х в фазе кушения культуры	-1
	0,4-0,8	Кукуруза	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4- Д	Применяется как добавка к 2,4-Д в фазе 3-5 листьев у культуры	-1
	1,6-2,0	Сенокосные угодья, пастбища	Чемерица, лютики, щавель, борщевик и др.	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной	-1
	2,6-3,1	Сенокосные угодья, пастбища	Чемерица, лютики, щавель, борщевик и др.	Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью	-1
	20,0-40,0	Земли несельскохозяйственного пользования	Горчак ползучий и другие многолетние корнеотпрысковые	Опрыскивание очагов вегетирующих сорняков	-1
ВИВАТ 48%, в.р. (480 г/л) Филиал "Hangzhou Ruijiang Crop Science Co.,Ltd., Казахстан" "Hangzhou Ruijiang Crop Science Co., Ltd.,Китай" в городе Алматы П-4 23.01.2035 г.	0,15-0,3	Поля, предназначенные под посев злаковых сельскохозяйственных культур	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2, 4-Д и некоторые многолетние двудольные сорняки, включая виды осота полевого, полынь и выюнок полевой	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной до посева. Применяется в качестве добавки к глифосатосодержащим гербицидам, эфирам и гербицидам группы сульфониломочевины	- (1)
	0,25-0,3	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2, 4-Д и некоторые многолетние двудольные сорняки, включая виды осота полевого, полынь и выюнок полевой	Опрыскивание посевов в фазе кушения культуры	- (1)
ВИНКА ДИКАМБА 480 в.р (480 г/л) ЧЖЭЦЯН СИНЬАНЬХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ГРУППА П-3 21.12.2033 г.	0,15- 0,3	Пшеница яровая	Широколистные сорняки	Способ:Опрыскивание Время обработки: Опрыскиваниепосевов в фазукушения культуры и ранние фазы роста сорняков. Ограничения: Не обрабатывайте в ветреные дни и соблюдайтемеры предосторожности, чтобы ненавредить соседним культурам	60(1)
ДЕЙМОС, в.р.к. (480 г/л) АО Фирма «Август» П-3 22.04.2030 г.	0,4-0,8	Кукуруза	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4- Д, и некоторые многолетние двудольные сорняки, включая виды осоты	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры, при наличии 2-4 листьев у однолетних двудольных сорняков и при высоте 15 см у многолетних. Расход рабочей жидкости – 50-400 л/га	60 (1)
	0,25-0,3	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорняки, включая виды осоты	Опрыскивание посевов в фазе кушения культуры, при наличии 2-4 листьев у однолетних двудольных сорняков и при высоте 15 см у многолетних. Расход рабочей жидкости – 50-400 л/га	60 (1)
ДЕКАБРИСТ, в.р. (480 г/л) Лейтон Агро Европа КФТ Венгрия П-3 06.04.2028 г.	0,25-0,3	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4- Д и некоторые многолетние двудольные, включая осот полевой	Опрыскивание посевов в фазе кушения культуры	-1
21.02.2030 г.	0,15-0,5	Поля, предназначенные под посев с/х культур	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной, применяется в качестве добавки к глифосат-содержащим гербицидам	- (1)
ДАМБА, в.р. (480 г/л) АО «Щелково Агрохим» П-3 14.04.2031 г.	0,15-0,3	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый	Однолетние и многолетние двудольные сорняки, в.т.ч. устойчивые к 2,4- Д и 2М-4Х, включая виды осотов (бодяк)	Опрыскивание посевов в фазу кушения культуры	-1
	0,1			Применяется в качестве добавки к 2,4- Д и сульфониломочевинам при опрыскивании посевов в фазу кушения	
	0,1-0,2	Землинесельскохозяйствен нного пользования		Применяется в качестве добавки к глифосатсодержащим гербицидам (Спрут Экстра) при опрыскивании вегетирующих сорняков весной и осенью	
ДИАНАТ 48%, в.р. (480 г/л) БАСФ Корпорейшн, США П-4 10.01.2027 г.	0,25-0,3	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота	Опрыскивание посевов в фазе кушения культуры	-1
	0,1	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и некоторые	Применяется в качестве добавки к 2,4- Д и сульфонил- мочевином при опрыскивании посевов в фазе кушения культуры	-1

			многолетние двудольные, включая виды осота		
ДЮРАНОР 480, в.р. (480 г/л) ALBAUGH EUROPE SARL П-4 12.03.2034	0,4-0,8	Кукуруза	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и триазилам, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяк и др.)	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры, 2-4 листьев у однолетних и 15 см высоты у многолетних сорняков. Применяется самостоятельно, а также в качестве добавки к 2,4-Д.	- (1)
	0,15-0,3	Озимая и яровая пшеница, овёс, ячмень яровой, просо	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяк и др.)	Применяется как самостоятельно, так и в качестве добавки к 2,4-Д и 2М-4Х при опрыскивании посевов в фазе кушения культуры	- (1)
ЛАРТ, в.р. (480 г/л) ТОО «ФМРус» П-3 13.12.2033	0,4-0,8	Кукуруза	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и некоторые многолетние двудольные (включая виды осота, бодяк и др.) сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры, 2-4 листьев у однолетних сорняков и при высоте многолетних 15 см. Применяется как самостоятельно, так и в качестве добавки к 2,4-Д. Расход рабочей жидкости – 150-400 л/га	60(1)
	0,15-0,3	Ячмень яровой	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорняки, включая виды осота (бодяк и др.)	Опрыскивание посевов в фазе кушения культуры, 2-4 листьев у однолетних сорняков и при высоте многолетних 15 см. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)
	0,15-0,3	Пшеница яровая	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорняки, включая виды осота (бодяк и др.)	Опрыскивание посевов в фазе кушения культуры, 2-4 листьев у однолетних сорняков и при высоте многолетних 15 см. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)
МОНОМАКС, в.р. (480 г/л) ООО «Агро Эксперт Групп», Россия П-3 09.12.2034 г.	0,15-0,3	Пшеница и ячмень яровые, пшеница озимая	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, а также некоторые многолетние двудольные сорняки, включая виды осота (бодяк и другие)	Опрыскивание посевов весной в фазе кушения культуры, 2-4 листьев у однолетних и 15 см высоты у многолетних сорняков. Применяется как самостоятельно, так в качестве добавки к 2,4-Д и МЦПА. Расход рабочей жидкости 150-400 л/га.	60 (1)
	0,1-0,15	Пшеница и ячмень яровые, пшеница озимая	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, а также некоторые многолетние двудольные сорняки, включая виды осота (бодяк и другие)	Применяется в качестве добавки к 2,4-Д и сульфонилмочевинам при пррыскивании посевов в фазе кушения культуры. Расход рабочей жидкости 150-400 л/га.	60 (1)
	0,4-0,8	Кукуруза	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, а также некоторые многолетние двудольные сорняки, включая виды осота (бодяк и другие)	Опрыскивание в фазе 3-5 листьев культуры, 2-4 листьев у однолетних и 15 см высоты у многолетних сорняков. Применяется в качестве добавки к 2,4-Д. Расход рабочей жидкости 150-400 л/га.	60 (1)
РЕЙНВЕЛ, в.р. (480 г/л) ШАНДОНГ ВЕЙФАНГ РЕЙНБОУ КЕМИКАЛ КО., ЛТД., П-3 13.01.2027 г.	0,15 – 0,5	Яровая пшеница	Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х	Опрыскивание посевов в фазе кушения культуры	-1
	0,4-0,5	Кукуруза	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и триазилам, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяк и др.), сорняки	Сплошное опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры, 2-4 листьев у однолетних и 10-15 см высоты у многолетних сорняков	-1
САПФИР, в.р. (480 г/л) ARCUS INVEST HOLDING B.V П-3 19.12.2032 г.	0,1	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота	Применяется в качестве добавки к 2,4-Д и сульфанилмочевинам при опрыскивании посевов в фазе кушения культуры	- (1)
	0,25-0,3	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота	Опрыскивание посевов в фазе кушения культуры	- (1)
ШАНС ДКБ, в.р. (480 г/л) ООО «Шанс» П-3 19.03.2029 г.	0,15-0,3	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой, овес	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х и некоторые многолетние двудольные сорняки, включая виды осота (бодяк и др.)	Опрыскивание посевов в фазе кушения культуры, 2-4 листьев у однолетних 10-15 см высоты у многолетних сорняков. Применяется как самостоятельно, так и в качестве добавки к 2,4-Д и МЦПА. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60 (1)
	0,4-0,5	Кукуруза	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и триазилам, и некоторые многолетние двудольные сорняки, включая виды осота (бодяк и др.)	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры, 2-4 листьев у однолетних и 10-15 см высоты у многолетних сорняков. Применяется самостоятельно, а также в качестве добавки к 2,4-Д. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	60 (1)
Концентрация д.в. (+/- 5%) ~ 700 г/кг					
МЕЗОМАКС ЭКСПРЕСС, в.д.г. (700 г/кг) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-3 29.05.2030 г.	0,15-0,25	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу кушения культуры. Расход рабочей жидкости 150-200 л/га	-1
	0,07-0,08	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Применяется в качестве добавки к 2,4-Д и сульфонил- мочевинам при опрыскивании посевов в фазе кушения культуры	-1
	0,07-0,12	Пары	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков	-1
	0,07-0,12	Поля, предназначенные под посев зерновых культур	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной. Применяется в качестве добавки к глифосатам	-1

Дикамба + топразезон

Топмазин Плюс, в.р.к (160 г/л + 50 г/л) ШАНДОНГ ВЕЙФАНГ РЕЙНБОУ КЕМИКАЛ КО., ЛТД, П-4	1,0-1,5	Кукуруза	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д, и некоторые однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев кукурузы и ранние фазы роста сорных растений в смеси ПАВ (0,5% от объема рабочей жидкости). Ограничения по севообороту – в течение 18 месяцев после применения	60 (1)
---	---------	----------	---	--	--------

14.02.2034				препарата нельзя высевать сахарную свеклу, сою и горох. Расход рабочей жидкости 200–300 л/га	
------------	--	--	--	--	--

Дикамба + никосульфурон

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 220 г/л + 50 г/л					
МИЛАГРО ПЛЮС 270, м.д. (220 г/л + 50 г/л) Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария П-3 05.05.2028 г.	0,8-1,2	Кукуруза	Однолетние и многолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков (2-6 листьев у однолетних и при высоте 10-20 см у многолетних)	-1
Даналит 270, м.д. (220 г/л + 50 г/л) ТОО «Астана-Нан» П-3 08.07.2036 г.	0,8-1,2	Кукуруза	Однолетние и многолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков (2-6 листьев у однолетних и при высоте 10-20 см у многолетних)	-1
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 420 г/л + 80 г/л					
Вортекс, к.э. (420 г/л + 80 г/л) ФОРВАРД П-3 23.01.2036 г.	0,3-0,6	Кукуруза	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков (2-6 листьев у однолетних и при высоте 10-20 см у многолетних)	-1

Дикамбы кислоты + никосульфурон + римсульфурон

ПРИНЦИПАЛ ПЛЮС, в.д.г. (550 г/кг + 92 г/кг + 23 г/кг) ТОО «Кортева Агрисаенс» Казахстан П-3 13.03.2030 г.	0,330-0,440 + ПАВ Виволт 200 мл/га	Кукуруза	Многолетние и однолетние однодольные и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев кукурузы, 1-4 листьев у однолетних сорняков, фазу розетки многолетних двудольных сорняков и при росте пырея ползучего 10-15 см. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	60 (1)
--	--	----------	---	--	--------

Дикамбы кислота + пиклорама кислота + клопиралида кислота

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 88,5 г/л + 8,5 г/л + 177 г/л					
ДЕЛПЕР, в.г.р. (88,5 г/л + 8,5 г/л + 177 г/л) ARCUS INVEST HOLDING B.V. П-4 04.03.2035 г.	1,5-2,5	Земли несельскохозяйственного назначения	Злостные однолетние и многолетние сорняки (горчак ползучий, виды осота)	Опрыскивание по вегетирующему горчаку в фазе развития розетка – цветение	-(1)

Дикамба + триасульфурон

ЛИНТУР 70, в.д.г. (659 г/кг + 41 г/кг) Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария П-4 17.03.2027 г.	0,12-0,15	Пшеница яровая	Однолетние и многолетние двудольные, в т.ч. устойчивые	Опрыскивание посевов в фазе начала (3-4 листа) – конец кущения зерновых при ранних фазах роста сорняков. Рекомендуется применение на почвах с pH не выше 7, 0. При необходимости пересева высевать только зерновые культуры, кукурузу. Осенью того же года, при условии вспашки на глубину не менее 15 см можно высевать любые культуры	-1
---	-----------	----------------	--	---	----

Дикамба + трибенурун-метил

МЕЗОМАКС, в.д.г. (480 г/кг + 120 г/кг) Синтеза Кеми ГмбХ, Германия П-3 18.03.2029 г.	0,08-0,12	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	-1
---	-----------	-------------------------	---	--	----

Дикамбы кислота + хлорсульфурон кислоты

ФЕНИЗАН, в.р. (360 г/л + 22,2 г/л) АО «Щелково Агрохим» П-4 17.02.2030 г.	0,14-0,2	Пшеница и ячмень яровой	Однолетние двудольные (в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х) и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе начало кущения (3-4 листа) – выход в трубку (1-2 междоузлия) культуры	-1
	0,14-0,2	Лен	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2М- 4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу «ёлочки» при высоте культуры 3- 10 см и ранние фазы роста сорняков	-1

Дикват (дибромид)

Концентрация д.в. (+/- 5%)~150 г/л					
ДИКОШАНС, в.р. (150 г/л) ООО «Шанс» П-3 16.08.2032 г.	1,5–2,0	Поля, предназначенные под посев яровых культур	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков до посева или до появления всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 50-200 л/га	-(1)
ТОНГАРА в.р. (150 г/л) АО «Щелково Агрохим» П-3 10.03.2033 г.	1,5-2,0	Поля, предназначенные под посев яровых культур	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной до посева или всходов культуры	-(1)
	1,5-2,0	Поля предназначенные под посев различных сельскохозяйственных культур	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью	
Регион Экстра в.р. (150 г/л) ТОО «Астана-Нан» П-3 06.03.2034 г.	1,5-2,0	Поля под посев сельскохозяйственных культур	Весь спектр сорняков	Опрыскивание вегетирующих сорняков	-(1)
СУХОВЕЙ, в.р. (150 г/л) АО Фирма «Август» П-3 31.01.2029 г.	1,5-2,0	Поля, предназначенные под посев яровых культур	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной до посева или до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 50-200 л/га	-1

Концентрация д.в. (+/- 5%) ~ 200 г/л					
ЛЕГИОН ФОРТЕ 200, в.р. (200 г/л) ТОО «QADAM Group (КАДАМ Групп)» П-3 29.08.2033 г.	1,2- 2,0	Подсолнечник, картофель, рапс	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-3 дня до появления массовых всходов культуры	10 (1)
Панч, в.р. (200 г/л) ТОО "EcoSave" П-3 06.04.2036 г.	1,5	Поля, предназначенные под посев яровых культур	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной до посева или до всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 50-200 л/га	-(1)
РЕГЛОН ФОРТЕ 200, в.р. (200 г/л) Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария П-4 12.11.2035 г.	1,2- 2,0	Картофель	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-3 дня до появления массовых всходов культуры.	10 (1)
РЕГЛОН ЭИР 200, в.р. (200 г/л) SYNGENTA CROP PROTECTION AG П-3 31.01.2035 г.	1,0-2,0	Поля, после уборки хлопчатника, овощей и других сельхозкультур	Вегетирующие однолетние сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков после уборки культуры	-(1)
Концентрация д.в. (+/- 5%) ~ 250 г/л					
СОЛИСТ, в.р. (250 г/л) ARCUS INVEST HOLDING B.V. П-3 03.02.2036 г.	1,7-2,0	Поля, предназначенные под посев различных сельскохозяйственных культур	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной до посева или всходов культуры или осенью по вегетирующим сорнякам	- (1)
Концентрация д.в. (+/- 5%) ~ 300 г/л					
Спорттак в.р. (300 г/л) Синтезия Кемп ГмбХ, Германия П-3 03.07.2034 г.	0,75–1,0	Поля, предназна ченные под посев яровых культур	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной до посева или до всходов культуры. Расход рабочей жидкости 50-200 л/га	-(1)
	0,8 – 1,2	Пары	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-(1)

Диурон

АНДУРОН 80, с.п. (800 г/кг) Ancom Crop Care SDN BHD, Малайзия П-3 11.03.2029 г.	0,6	Пшеница яровая	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Сплошное опрыскивание в фазу 2-5 листьев культуры и 2-4 листьев сорняков	-1
--	-----	----------------	--	--	----

Диклосулам

ПЛЕКТОР, в.д.г. (750 г/кг) АО ФИРМА «АВГУСТ» П-3 15.01.2036 г.	0,025-0,05	Соя	Однолетние двудольные сорные растения	Обработка почвы до посева или до всходов культуры. На следующий год после применения можно высевать зерновые, бобовые культуры. Через год сорго, кукурузу, рис. Через два года можно высевать сахарную свеклу, подсолнечник, рапс, гречиху и другие культуры. Расход рабочей жидкости - 100 – 300 л/га	60(1)
	0,015-0,03 + ПАВ АДЬЮ, Ж (0,1% от объема рабочей жидкости)	Соя	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазу 1-3 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений в чистом виде или в смеси с ПАВ АДЬЮ, Ж (900 г/л этанола изодецилового спирта) (0,1% от объема рабочей жидкости). На следующий год после применения можно высевать зерновые, бобовые культуры. Через год сорго, кукурузу, рис. Через два года можно высевать сахарную свеклу, подсолнечник, рапс, гречиху и другие культуры. Расход рабочей жидкости - 50 – 300 л/га (в зависимости от типа распылителей).	60(1)

Имазапир

Концентрация д.в. (+/- 5%) ~ 250 г/л					
БЕЛЛАТОР, в.р. (250 г/л) ARCUS INVEST HOLDING B.V. П-3 12.03.2035 г.	2,0-2,5	Земли не с/х пользования (полосы отчуждения ЛЭП, газо-и нефтепроводов, обочины дорог, железнодорожные насыпи)	Все виды сорняков, в т.ч. амброзия полынелистная и горчак ползучий	Опрыскивание сорняков в ранние фазы их роста, в том числе амброзии полынелистной в фазе 2-4 листьев и горчака ползучего в фазе стеблевания	-(1)
ГРЕЙДЕР, в.г.р (250 г/л) АО Фирма «Август» П-3 13.08.2035 г.	0,075-0,12	Подсолнечник (сорта и гибриды, устойчивые к имидазолинонам)	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (2-4 настоящих листа) и 4-5 настоящих листьев у культуры в смеси с 0,3 л/га ПАРАДОКС, в.р.к. (имазамокс, 120 г/л). Расход рабочей жидкости 50-300 л/га	-(1)
	0,075-0,12	Рапс (сорта и гибриды, устойчивые к имидазолин онам)	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев у культуры и ранние фазы роста сорняков (2-6 листьев у двудольных, 3 листа – начало кущения у злаковых) в смеси с 0,3 л/га ПАРАДОКС, в.р.к. (имазамокс, 120 г/л). Расход рабочей жидкости 50-300 л/га.	-(1)
	0,04-0,06	Чечевица (сорта и гибриды, устойчивые к мидазолино нам)	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (2-4 листьев) и 4-6 настоящих листьев у культуры в смеси с ПАРАДОКС, в.р.к (имазамокс, 120 г/л) - 0,17-0,28 л/га. Расход рабочей жидкости 50-300 л/га.	60 (1)
ПРОФИ, в.р. (250 г/л) Лейтон Агрио Европа КФТ Венгрия П-3	2,0-2,5	Земли не с/х пользования (полосы отчуждения ЛЭП, газо-и нефтепроводов, обочины дорог, железнодорожные насыпи)	Все виды сорняков, в т.ч. амброзия полынелистная и горчак ползучий	Опрыскивание сорняков в ранние фазы их роста, в том числе амброзии полынелистной в фазе 2-4 листьев и горчака ползучего в фазе стеблевания	-1

17.02.2035 г.	4,0-5,0	Государственная граница (следовые полосы)	Все виды сорняков	Опрыскивание сорняков в ранние фазы их роста	-1
ФОРУС, в.р.к. (250 г/л) АО «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ» П-3 19.05.2035 г	2,0-2,5	Земли несельскохозяйст венного пользования (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог , аэродромы и др. промышленные территории)	Все виды сорняков, в т.ч. горчак ползучий и амброзия польннолистная	Опрыскивание сорняков в ранние фазы их роста, и горчака ползучего в фазу стеблевания	-1
	0,075-0,12	Подсолнечник (сорта и гибриды устойчивые к гербицидам на основе имидазолинонов)	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (2-4листа) и 4-5 настоящих листьев у культуры (в смеси с 0,7 л/ га Сафари)	-1

Индазифлам

Бекано, к.с. (500 г/л) ТОО «Байер КАЗ» П-4 14.10.2034 г.	0,15	Яблоня	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до всходов сорняков и повторно при появлении новой волны сорняков	-(2)
	0,15	Виноград			-(2)
	0,15-0,2	Виноград	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до всходов сорняков	-(1)
	0,15-0,2	Яблоня			-(1)

Имазамокс

Концентрация д.в. (+/- 5%)~40 г/л					
БАЙТОРЕ, в.с.к. (40 г/л) ТОО «A.S.K. Technik» (А.С.К.Техник), Казахстан П-3 13.12.2027 г.	0,75-1,0	Соя	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 1-3 настоящих листьев культуры в ранние фазы роста сорняков. На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы (безопасный интервал между применением гербицида и посевом свеклы – 16 месяцев)	-1
	0,75-1,0	Горох при выращивании на зерно	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки		-1
17.05.2028 г.	1,0-1,2	Рис (гибриды и сорта устойчивые к данному гербициду)	Однолетние и многолетние злаковые, двудольные и болотные сорняки	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам (независимо от фазы развития культуры). На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы (интервал – 16 месяцев)	-1
	0,75-1,0	Рапс яровой (гибриды и сорта устойчивые к данному гербициду)	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев рапса в ранние фазы роста сорняков. На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы (интервал – 16 месяцев)	-1
	0,75-1,0	Подсолнечник (гибриды и сорта устойчивые к данному гербициду)	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев подсолнечника в ранние фазы роста сорняков. На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы (интервал – 16 месяцев)	-1
17.11.2030 г.	1,0-1,2	Чечевица устойчивая к данному гербициду	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазу 2-5 узлов культуры в ранние фазы роста сорняков	-1
Дентайр, в.р. (40 г/л) ООО «Интер Групп» П-3 28.11.2034 г.	1,0-1,5	Подсолнечник (сорта и гибриды, устойчивые к имидазолинон ам) на семена и масло	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (2-4 листьев) и 4-5 настоящих листьев у культуры. Можно высевать пшеницу, рожь, не ранее чем через 4 месяца, люцерну, сою, ячмень, 60 (1) овес, кукурузу, горох через 9 месяцев, сахарную и столовую свеклу, рапс – через 16 месяцев. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га.	60 (1)
ИМАЗОШАНС, в.р. (40 г/л) ООО «Шанс» П-3 19.03.2029 г.	0,75-1,0	Соя	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (1-3 настоящих листьев) и 1-3 настоящих листьев у культуры. На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы (безопасный интервал между применением гербицида и посевом свеклы – 16 месяцев). Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	60 (1)
	0,75-1,0	Горох и нут (при выращивании на зерно)	Однолетние злаковые и двудольные сорняки		53(1)
	1,0-1,2	Подсолнечник (сорта и гибриды, устойчивые к имидазолинон ам) на семена и масло	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (2-4 листьев) и 4-5 настоящих листьев у культуры. В год применения можно высевать пшеницу озимую, рапс озимый (устойчивый к имидазолинонам); на следующий год – яровую и озимую пшеницу, ячмень, рожь, тритикале; кукурузу, сою, горох, бобы, сорго, люцерну, люпин, рапс и подсолнечник (устойчивые к имидазолинонам); через два года – овес, подсолнечник (традиционные сорта и гибриды); через три года – любые культуры без ограничений, включая традиционные сорта и гибриды рапса; сахарную свеклу. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	60 (1)
ЛЕГОМИН 4%, в.р. (40 г/л) ТОО «Астана-Нан» П-3 02.06.2027 г.	0,75-1,0	Соя	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 1-3 настоящих листьев культуры в ранние фазы роста сорняков. На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы (безопасный интервал между применением гербицида и посевом свеклы –16 месяцев)	-1
	0,75-1,0	Горох (при выращивании на зерно)	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 1-3 настоящих листьев культуры в ранние фазы роста сорняков. На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы (безопасный интервал между применением гербицида и посевом свеклы – 16 месяцев)	-1
Орель, в.р (40 г/л) ФОРВАРД П-3 27.01.2036 г.	0,75-1,0	Горох и нут (при выращивании на зерно)	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 1-3 настоящих листьев культуры в ранние фазы роста сорняков. На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы (безопасный интервал между применением гербицида и посевом свеклы – 16 месяцев)	-(1)

	0,75-1,0	Соя	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 1-3 настоящих листьев культуры в ранние фазы роста сорняков. На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы (безопасный интервал между применением гербицида и посевом свеклы – 16 месяцев)	- (1)
	0,75-1,1	Подсолнечник (гибриды и сорта устойчивые к имидазолинонам)	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев подсолнечника в ранние фазы роста сорняков. На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы (интервал – 16 месяцев)	- (1)
	0,75-1,1	Рапс (гибриды и сорта устойчивые к имидазолинонам)	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам (независимо от фазы развития культуры). На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы (интервал – 16 месяцев)	- (1)
	0,7-1,0	Чечевица (сорта устойчивые к имидазолинонам)	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазу 2-5 узлов культуры в ранние фазы роста сорняков	- (1)
ПУЛЬСАР 4%, в.р. (40 г/л) БАСФ Агрокемикал Продактс Б.В., Нидерланды П-4 10.02.2030 г.	0,75-1,0	Соя	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 1-3 настоящих листьев культуры в ранние фазы роста сорняков. На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы (безопасный интервал между применением гербицида и посевом свеклы – 16 месяцев)	-1
18.02.2031 г.	0,75-1,0	Горох при выращивании на зерно	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 1-3 настоящих листьев культуры в ранние фазы роста сорняков. На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы (безопасный интервал между применением гербицида и посевом свеклы – 16 месяцев)	-1
ЮНКЕР, в.р. (40 г/л) Лейтон Агрио Европа КФТ Венгрия П-3 24.02.2036 г.	1,0-1,5	Подсолнечник, устойчивый к имидазолинонам	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (2-4 листьев) и 4-5 настоящих листьев у культуры. Ограничения по севообороту: можно высевать пшеницу, рожь, не ранее чем через 4 месяца, люцерну, сою, ячмень, овес, кукурузу, горох через 9 месяцев, сахарную и столовую свеклу, рапс – через 16 месяцев.	60(1)
	0,75-1,0	Горох	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 1-3 настоящих листьев культуры в ранние фазы роста сорняков. На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы (безопасный интервал между применением гербицида и посевом свеклы – 16 месяцев). Расход рабочей жидкости 200-300 л/га.	
	0,5-0,7	Чечевица	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 1-3 настоящих листьев культуры в ранние фазы роста сорняков. На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы (безопасный интервал между применением гербицида и посевом свеклы – 16 месяцев). Расход рабочей жидкости 200-300 л/га.	
	0,75-1,0	Соя	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 1-3 настоящих листьев культуры в ранние фазы роста сорняков. На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы (безопасный интервал между применением гербицида и посевом свеклы – 16 месяцев). Расход рабочей жидкости 200-300 л/га.	
Концентрация д.в. (+/- 5%) – 50 г/л					
ЛИСТЕГО ПРО 050, в.р. (50 г/л) Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария П-3 02.08.2029 г.	0,8-1,0	Подсолнечник (гибриды системы Clearfield®Plu s, устойчивые к данному гербициду)	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-8 настоящих листьев культуры в ранние фазы роста сорняков. На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы, рапса и овощных культур (безопасный интервал между применением гербицида и посевом указанных культур – 16 месяцев)	-1
Концентрация д.в. (+/- 5%) – 120 г/л					
ПАРАДОКС, в.р.к. (120 г/л) АО Фирма «Август» П-3 30.07.2035г.	0,25-0,35	Соя	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (1-3 настоящих листа) и 1-3 настоящих листа у культуры. Расход рабочей жидкости 50-300 л/га.	-1
	0,25-0,35	Горох	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (1-3 настоящих листа) и 1-3 настоящих листа у культуры. Расход рабочей жидкости 50-300 л/га.	-1
	0,3-0,4	Подсолнечник (сорта и гибриды, устойчивые к имидазолинонам)	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (2-4 настоящих листа) и 4-5 настоящих листа у культуры. Расход рабочей жидкости 50-300 л/га.	-1
	0,3-0,4	Рапс (сорта и гибриды, устойчивые к имидазолинонам)	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев у культуры и ранние фазы роста сорняков (2-6 листьев у двудольных, 3 листа – начало кущения у злаковых). Расход рабочей жидкости 50-300 л/га.	-1
	0,25-0,4	Нут (гибриды и сорта, устойчивые к имидазолинонам)	Однолетние и некоторые многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 4-5 листьев культуры в ранние фазы роста сорняков (2-4 листа). Расход рабочей жидкости 50-300 л/га.	60 (1)
	0,25-0,4	Чечевица (гибриды и сорта, устойчивые к имидазолинонам)	Однолетние и некоторые многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 4-6 листьев культуры в ранние фазы роста сорняков (2-4 листа). Расход рабочей жидкости 50- 300 л/га.	60 (1)
	0,17-0,28	Чечевица (сорта и гибриды, устойчивые к имидазолинонам)	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (2-4 листьев) и 4-6 настоящих листьев у культуры в смеси с ГРЕЙДЕР, в.г.р. (имазапир, 250 г/л) - 0,04- 0,06 л/га. Расход рабочей жидкости 50-300 л/га.	60 (1)

[illegible]

	0,05 – 0,07	Горох	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 1-3 настоящих листьев культуры в ранние фазы роста сорняков. На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы (безопасный интервал между применением гербицида и посевом свеклы – 16 месяцев)	- (1)
	0,05 – 0,07	Рапс яровой (гибриды и сорта, устойчивые к имидазолинон ам)	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев у культуры и ранние фазы роста сорняков (2-6 листьев у двудольных, 3 листа – начало кущения у злаковых)	-(1)

Имазамокс + имазапир

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 16,5 г/л + 7,5 г/л					
КАПТОРА ПЛЮС 2,4%, в.р.к. (16,5 г/л + 7,5 г/л) Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария П-3 07.02.2029 г.	1,6-2,5	Подсолнечник (гибриды системы Clearfield Plus, устойчивы к данному гербициду)	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 4-6 листьев культуры в ранние фазы роста сорняков (2-4 листа). На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы, рапса и овощных культур (безопасный интервал между применением гербицида и посевом указанных культур – 16 месяцев)	-1
Кадор Лайт, в.р.к. (16,5 г/л + 7,5 г/л) ФОРВАРД П-3 22.01.2036 г.	1,6-2,5	Подсолнечник на семена и масло (сорта и гибриды устойчивы к данному гербициду)	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 4-6 листьев культуры в ранние фазы роста сорняков (2-4 листа). На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы, рапса и овощных культур (безопасный интервал между применением гербицида и посевом указанных культур – 16 месяцев)	-1
ЕВРО-ЛАЙТНИНГ ПЛЮС, 2,4% в.р.к. (16,5 г/л + 7,5 г/л) BASF AGROCHEMICAL PRODUCTS B.V. П-3 25.12.2033 г.	2,0	Подсолнечник (гибриды системы Clearfield, устойчивы к данному гербициду)	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 4-6 листьев культуры в ранние фазы роста сорняков (2-4 листа). Ограничения по севообороту: можно высевать пшеницу, рожь не ранее, чем через 4 месяца; люцерну, сою, ячмень, овес, кукурузу, горох – через 9 месяцев. Картофель, томаты, табак, лук, просо, салат, подсолнечник, огурцы, морковь – через 19 месяцев, сахарную и столовую свеклу, рапс – через 26 месяцев	-(1)
ЕВРОШАНС ПЛЮС, в.р.к. (16,5 г/л + 7,5 г/л) ООО «Шанс» П-3 23.10.2031	1,6-2,5	Подсолнечник на семена и масло (сорта и гибриды, устойчивы к гербициду Еврошанс Плюс)	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (2-4 листа) и 4-5 настоящих листьев у культуры. Ограничения по севообороту: можно высевать пшеницу, рожь не ранее, чем через 4 месяца; люцерну, сою, ячмень, овес, кукурузу, горох (через 9 месяцев). Картофель, томаты, табак, лук, просо, салат, подсолнечник, огурцы, морковь можно высевать через 19 месяцев, сахарную и столовую свеклу, рапс – через 26 месяцев. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60(1)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 33 г/л + 15 г/л					
ДИОМА, в.р.к. (33 г/л + 15 г/л) ШАНДОНГ ВЕЙФАНГ РЕЙНБОУ КЕМИКАЛ КО., ЛТД., П-3 03.05.2029 г.	1,0-1,2	Подсолнечник(гибриды системы Clearfield, устойчивые к данному гербициду)	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 4-6 листьев культуры в ранние фазы роста сорняков (2-4 листа)	-1
ЕВРО-ЛАЙТНИНГ, 4,8%, в.р.к. (33 г/л + 15 г/л) БАСФ Агрокемикал Продактс Б.В., Нидерланды П-3 25.12.2033 г.	1,0-1,2	Подсолнечник (гибриды и сорта системы CLEARFIE LD устойчивы к данному гербициду)	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 4-6 листьев культуры в ранние фазы роста сорняков (2-4 листьев). Ограничения по севообороту: можно высевать пшеницу, рожь не ранее чем через 4 месяца; люцерну, сою, ячмень, овес, кукурузу, горох – через 9 месяцев; картофель, томаты, табак, лук, просо, салат, подсолнечник, огурцы, морковь – через 19 месяцев; сахарную и столовую свеклу, рапс – через 26 месяцев	-1
ЕВРОФИЛД, в.р.к. (33 г/л + 15 г/л) ТОО «Достык-Агро 2012» П-3 18.12.2035 г.	1,0-1,2	Нут	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 4-6 листьев культуры в ранние фазы роста сорняков (2 -4 листьев). Ограничения по севообороту: можно высевать пшеницу, рожь не ранее чем через 4 месяца, люцерну, сою, ячмень, овес, кукурузу, горох через 9 месяцев, картофель, томаты, табак, лук, просо, салат, подсолнечник, огурцы, морковь через 19 месяцев, сахарную и столовую свеклу, рапс через 26 месяцев	-1
	1,0-1,2	Чечевица	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 4-6 листьев культуры в ранние фазы роста сорняков (2 -4 листьев). Ограничения по севообороту: можно высевать пшеницу, рожь не ранее чем через 4 месяца, люцерну, сою, ячмень, овес, кукурузу, горох через 9 месяцев, картофель, томаты, табак, лук, просо, салат, подсолнечник, огурцы, морковь через 19 месяцев, сахарную и столовую свеклу, рапс через 26 месяцев	-1
	1,0-1,2	Подсолнечник	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 4-6 листьев культуры в ранние фазы роста сорняков (2 -4 листьев). Ограничения по севообороту: можно высевать пшеницу, рожь не ранее чем через 4 месяца, люцерну, сою, ячмень, овес, кукурузу, горох через 9 месяцев, картофель, томаты, табак, лук, просо, салат, подсолнечник, огурцы, морковь через 19 месяцев, сахарную и столовую свеклу, рапс через 26 месяцев	-1
ЕВРОШАНС, в.р.к. (33 г/л + 15 г/л) ООО «Шанс» П-3 26.03.2029 г.	1,0-1,2	Подсолнечник (сорта и гибриды, устойчивы к имидазолинонам)	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (2-4 листьев) и 4-5 настоящих листьев у культуры. Ограничения по севообороту: можно высевать пшеницу, рожь не ранее чем через 4 месяца; люцерну, сою, ячмень, овес, кукурузу, горох – через 9 месяцев после применения препарата. Картофель, томаты, табак, лук, просо, салат, подсолнечник, огурцы, морковь можно высевать через 19 месяцев; сахарную и столовую свеклу, рапс – через 26 месяцев. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	60(1)
	1,0-1,2	Чечевица, нут	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 4 -6 листьев культуры в ранние фазы роста сорняков (2 – 4 листа). Ограничения по севообороту: можно высевать пшеницу, рожь не ранее чем через 4 месяца, люцерну, сою, ячмень, овес, кукурузу, горох – через 9 месяцев. Картофель, томаты, табак, лук, просо, салат, подсолнечник, огурцы, морковь – через 19 месяцев, сахарную и столовую свеклу, рапс – через 26 месяцев	-1
Кадор, в.р.к. (33 г/л + 15 г/л) ФОРВАРД П-3 11.02.2036 г.	1,0-1,2	Подсолнечник (сорта и гибриды, устойчивы к имидазолинонам)	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 4-6 листьев культуры в ранние фазы роста сорняков (2 -4 листа)	-1

	1,0-1,2	Рапс яровой и озимый (сорта и гибриды, устойчивые к имидазолинонам)	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев рапса в ранние фазы роста сорняков. На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы, овощей и сортов и гибридов ярового и озимого рапса, не устойчивых к данному гербициду (безопасный интервал между применением гербицида и посевом свеклы, неустойчивых к гербициду сортов и гибридов рапса и овощей – 16 месяцев)	- (1)
	2,0	Земли несельскохозяйственного назначения	Амброзия полыннолистная	Опрыскивание вегетирующих сорняков	- (1)
КАПТОРА 4,8%, в.р.к. (33 г/л + 15 г/л) Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария П-3 20.11.2034 г.	1,0-1,2	Подсолнечник (гибриды и сорта системы CLEARFIE LD устойчивые к данному гербициду)	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 4-6 листьев культуры в ранние фазы роста сорняков (2-4 листьев). Ограничения по севообороту: можно высевать пшеницу, рожь не ранее чем через 4 месяца; люцерну, сою, ячмень овес, кукурузу, горох – через 9 месяцев; картофель, томаты, табак, лук, просо, салат, подсолнечник, огурцы, морковь – через 19 месяцев; сахарную и столовую свеклу, рапс – через 26 месяцев	-1
КЛИАФИЛТ, 4,8 % в.р.к. (33 г/л + 15 г/л) ТОО «Агро-глобал Казахстан» П-3 31.01.2030 г.	1,0-1,2	Подсолнечник, чечевица, нут (гибриды системы Clearfield устойчивые к данному гербициду),	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 4-6 листьев культуры в ранние фазы роста сорняков (2-4 листа). Ограничения по севообороту: можно высевать пшеницу, рожь не ранее чем через 4 месяца; люцерну, сою, ячмень, овес, кукурузу, горох – через 9 месяцев. Картофель, томаты, табак, лук, просо, салат, подсолнечник, огурцы, морковь – через 19 месяцев; сахарную и столовую свеклу, рапс – через 26 месяцев	-1
Имигерб, в.р.к. (33 г/л + 15 г/л) ТОО «QADAM Group (КАДАМ Групп)» П-3 25.12.2034 г.	1,0-1,2	Подсолнечник (гибриды и сорта системы CLEARFIE LD устойчивые к данному гербициду)	Однолетние и многолетние двудольные злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 4-6 листьев культуры в ранние фазы роста сорняков (2-4 листьев). Ограничения по севообороту: можно высевать пшеницу, рожь не ранее чем через 4 месяца; люцерну, сою, ячмень овес, кукурузу, горох – через 9 месяцев; картофель, томаты, табак, лук, просо, салат, подсолнечник, огурцы, морковь – через 19 месяцев; сахарную и столовую свеклу, рапс – через 26 месяцев	-1
Элемейн, в.р.к. (33 г/л + 15 г/л) ТОО «Астана- Нан» П-3 29.07.2035 г.	1,0-1,2	Подсолнечник (гибриды и сорта системы CLEARFIELD, устойчивые к данному гербициду).	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 4-6 листьев культуры в ранние фазы роста сорняков (2-4 листьев). Ограничения по севообороту: можно высевать пшеницу, рожь не ранее, чем через 4 месяца; люцерну, сою, ячмень, овес, кукурузу, горох – через 9 месяцев. Картофель, томаты, табак, лук, просо, салат, подсолнечник, огурцы, морковь – через 19 месяцев; сахарную и столовую свеклу, рапс – через 26 месяцев. Норма расхода рабочей жидкости - 200 л/га.	- (1)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 495 г/кг + 225 г/кг					
МАХАОН УЛЬТРА, в.д.г. (495 г/кг + 225 г/кг) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-3 05.08.2035 г.	0,06 - 0,08	Подсолнечник (сорта и гибриды, устойчивые к имидазолинонам)	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 4-6 листьев культуры в ранние фазы роста сорняков. Ограничения по севообороту: можно высевать пшеницу и рожь не ранее чем через 4 месяца; сою, ячмень, кукурузу, горох – через 9 месяцев; картофель, томаты, подсолнечник – через 19 месяцев; рапс, свеклу – через 26 месяцев.	-1
	0,06 - 0,08	Чечевица (сорта устойчивые к имидазолинонам)	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 4-6 листьев культуры в ранние фазы роста сорняков. Ограничения по севообороту: можно высевать пшеницу и рожь не ранее чем через 4 месяца; сою, ячмень, кукурузу, горох – через 9 месяцев; картофель, томаты, подсолнечник – через 19 месяцев; рапс, свеклу – через 26 месяцев.	-1
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 330 г/кг + 150 г/кг					
ПАЛАДИН УЛЬТРА, в.д.г. (330 г/кг + 150 г/кг) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-3 26.03.2029 г.	0,06-0,1	Чечевица (сорта устойчивые к имидазолинонам)	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 4-6 листьев культуры в ранние фазы роста сорняков. Ограничения по севообороту: можно высевать пшеницу и рожь не ранее чем через 4 месяца; сою, ячмень, кукурузу, горох – через 9 месяцев; картофель, томаты, подсолнечник – через 19 месяцев; рапс, свеклу – через 26 месяцев. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	-(1)
	0,06-0,1	Подсолнечник (сорта и гибриды устойчивые к имидазолинонам)	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 4-6 листьев культуры в ранние фазы роста сорняков. Ограничения по севообороту: можно высевать пшеницу и рожь не ранее чем через 4 месяца; сою, ячмень, кукурузу, горох – через 9 месяцев; картофель, томаты, подсолнечник – через 19 месяцев; рапс, свеклу – через 26 месяцев. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	-(1)
	0,06-0,1	Рапс яровой (гибриды и сорта, устойчивые к имидазолинонам)	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 4-6 листьев культуры и ранние фазы развития сорняков. Ограничения по севообороту: можно высевать пшеницу и рожь не ранее чем через 4 месяца; сою, ячмень, кукурузу, горох – через 9 месяцев; картофель, томаты, подсолнечник – через 19 месяцев, рапс, свеклу через 26 месяцев. Расход рабочей жидкости 200-300 литров.	-(1)
Имазамокс + квинмерак					
НОПАСАРАН УЛЬТРА, к.с. (35 г/л + 250 г/л) БАСФ Агрохимикал Продактс Б.В., Пуэрто Рико П-3 02.11.2027 г.	0,8-1,0	Рапс яровой (гибриды системы Clearfield, устойчивые к данному гербициду)	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев рапса в ранние фазы роста сорняков. На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы, овощей и сортов и гибридов ярового и озимого рапса, не устойчивых к данному гербициду (безопасный интервал между применением гербицида и посевом свеклы, неустойчивых к гербициду сортов и гибридов рапса и овощей – 16 месяцев)	-1
Имазамокс + хлоримурон-этил					
КОНЦЕПТ, м.д. (38 г/л + 12 г/л) АО «Щелково Агрохим» П-3 15.09.2030 г.	0,6-1,0	Соя	Однолетние злаковые, однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития сорняков и в фазу 1-3 настоящих листьев культуры. Соблюдать ограничения по севообороту. При пересеве в год применения рекомендуется высевать озимую пшеницу, на следующий год – яровые и озимые зерновые, кукурузу; через два года все культуры без ограничений	60 (1)

Имазамокс+ хизалофоп-П-этил + имазапир

САФАРИ ФОРТЕ, м.д. (30 г/л + 20 г/л + 12 г/л) АО «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ» П-3 22.05.2035 г	1,0-1,4	Чечевица	Однолетние и некоторые многолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазу 4-6 листьев культуры, ранние фазы роста сорняков.	52(1-2)
	1,0-1,4	Подсолнечник (сорта и гибриды устойчивые к имидазолинонам)	Однолетние и некоторые многолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (2-4 листа) и 4-5 настоящих листьев культуры. Имеются ограничения по севообороту	52(1-2)

Имазетапир

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 100 г/л					
АГУРА 10%, в.к. (100 г/л) ТОО «Агро Глобал» П-4 26.09.2027 г.	0,5-1,0	Соя	Однолетние, многолетние злаковые и двудольные, в т.ч. виды амброзии	Опрыскивание почвы до посева (с заделкой), до всходов или опрыскивание посевов в фазе 2-3 настоящих листьев культуры. В год применения препарата рекомендуется высевать озимую пшеницу, на следующий год – кукурузу, яровые и озимые зерновые; через 2 года все культуры. Расход рабочей жидкости – 250-300 л/га.	-1
ЕССЕНТАПИР 10%, в.р. (100 г/л) Наньцзинь Эссенс Файн- Кемикал Со., Лтд, Китай П-3 04.01.2034	0,5-1,0	Соя	Однолетние, многолетние злаковые и двудольные, в т.ч. виды амброзии	Опрыскивание почвы до посева (с заделкой), до всходов или опрыскивание посевов в фазе 2-3 настоящих листьев культуры. В год применения препарата рекомендуется высевать озимую пшеницу, на следующий год- кукурузу, яровые и озимые зерновые; через 2 года – все культуры.	-1
ИМАЗЕТ 100, в.к. (100 г/л) ТОО «Агро-Хим- Лидер» П-3 27.02.2028 г.	1,0-1,2	Соя	Однолетние, многолетние злаковые и двудольные, в т.ч. виды амброзии	Опрыскивание почвы до посева (с заделкой), до всходов или опрыскивание посевов в фазе 2-3 настоящих листьев культуры. В год применения препарата рекомендуется высевать озимую пшеницу, на следующий год- кукурузу, яровые и озимые зерновые; через 2 года – все культуры. Расход рабочей жидкости – 250-300 л/га	-1
	1,0	Люцерна	Однолетние, многолетние злаковые и двудольные, в т.ч. виды повилики	Опрыскивание посевов через 7-10 дней после первого укоса. Расход рабочей жидкости 250-300 л/га	-1
ЛИГР, в.р.к. (100 г/л) ООО «Агро Эксперт Груп», Россия П-3 16.01.2028 г.	0,5-1,0	Соя	Однолетние, многолетние злаковые и двудольные в т.ч. виды амброзии	Опрыскивание почвы до посева (с заделкой), до всходов или опрыскивание посевов в фазе 2-3 настоящих листьев культуры. Ограничения по севообороту: при пересеве в год применения препарата рекомендуется высевать озимую пшеницу, на следующий год – кукурузу, яровые и озимые зерновые; через два года – все культуры без ограничений	-1
	0,5-1,0	Горох овощной (на семена)	Однолетние, многолетние злаковые и однолетние двудольные	Опрыскивание почвы в течение 2-3 дней после посева или по всходам культуры в фазе 3-6 листьев культуры	-1
	0,5-0,75	Горох овощной (для промышленной переработки)	Однолетние, многолетние злаковые и однолетние двудольные	Опрыскивание почвы в течение 2-3 дней после посева или по всходам культуры в фазе 3-6 листьев культуры	-1
	1,0	Люцерна	Однолетние, многолетние злаковые и однолетние двудольные, в т.ч. виды повилики	Опрыскивание посевов через 7-10 дней после первого укоса	-1
СЕРП, в.р.к. (100 г/л) ТОО «ФМРус» П-3 18.03.2035 г.	0,5-1,0	Соя	Однолетние, многолетние злаковые и двудольные сорняки, в т.ч. виды амброзии	Опрыскивание почвы до посева (с заделкой) или опрыскивание посевов в фазе 2-3 настоящих листьев культуры. В год применения препарата рекомендуется высевать озимую пшеницу; на следующий год – кукурузу, яровые и озимые зерновые; через два года все культуры	-1
	0,5-0,75	Горох	Однолетние, многолетние злаковые и двудольные сорняки, в т.ч. виды амброзии	Опрыскивание почвы в течение 2-3 дней после посева или по всходам культуры в фазе 3-6 листьев культуры. В год применения препарата рекомендуется высевать озимую пшеницу; на следующий год – кукурузу, яровые и озимые зерновые; через два года все культуры	-1
ТАПИР 10%, в.к. (100 г/л) Моер Кемсайенс Ко. Лтд., Китай П-3 10.12.2028 г.	0,5-1,0	Соя	Однолетние, многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до посева (с заделкой), до всходов или опрыскивание посевов в фазе 2-3 настоящих листьев культуры. В год применения препарата рекомендуется высевать озимую пшеницу, на следующий год – кукурузу, яровые и озимые зерновые; через 2 года – все культуры	-1
ТАПИРОШАНС, в.р.к. (100 г/л) ООО «Шанс» П-3 28.03.2029 г.	0,5-0,8	Соя	Однолетние и многолетние злаковые и однолетние двудольные сорняки, в том числе виды амброзии	Опрыскивание почвы до посева (с заделкой), до всходов или опрыскивание посевов в фазе всходов – двух тройчатых листьев культуры. Ограничения по севообороту: при пересеве в год применения рекомендуется высевать озимую пшеницу, на следующий год – кукурузу, яровые и озимые зерновые, через два года – все культуры без ограничений. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	78 (1)
	0,5-0,75	Нут, горох на зерно, горох овощной на семена и для промышленной переработки	Однолетние и многолетние злаковые и однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание почвы в течение 2-3 дней после посева или опрыскивание вегетирующих растений в фазу всходов 3-6 листьев культуры. Ограничения по севообороту: при пересеве в год применения рекомендуется высевать озимую пшеницу, на следующий год – кукурузу, яровые и озимые зерновые, через два года – все культуры без ограничений. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	40 (1)
Титан, в.к. (100 г/л) ТОО «Астана-Нан»	1,0	Люцерна	Однолетние, многолетние злаковые и однолетние	Опрыскивание посевов через 7-10 дней после первого укоса. Норма расхода рабочей жидкости: 200 л/га.	-(1)

П-3 14.08.2035 г.			двудольные, в том числе повилики.		
	0,5-1,0	Горох овощной	Однолетние, многолетние злаковые и однолетние двудольные	Опрыскивание почвы в течение 2-3дней после посева или по всходам культуры в фазе 3-6 листьев. Норма расхода рабочей жидкости: 200 л/га	-(1)
	0,5-1,0	Соя	Однолетние, многолетние злаковые и двудольные, в том числе виды амброзии	Опрыскивание почвы до посева (с заделкой), до всходов или опрыскивание посевов в фазе 2-3 настоящих листьев культуры. В год применения препарата рекомендуется высевать озимую пшеницу, на следующий год – кукурузу, яровые и озимые зерновые; через 2 года все культуры. Норма расхода рабочей жидкости 200 л/га.	-(1)

Имазетапир + имазапир

ЛИГР ГИБРИД, м.к. (50 г/л + 20 г/л) ООО «Агро Эксперт Групп», Россия П-3 23.01.2029 г.	0,8-1,2	Подсолнечник (сорта и гибриды, устойчивые к имидазолинонам)	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (2-4 листа) 4-6 листьев культуры. Соблюдать ограничения по севообороту. В год применения препарата (в случае пересева или повторной культуры) при условии глубокой вспашки рекомендуется высевать сою, горох, арахис, конские бобы. Через 4 месяца – пшеницу озимую; через 11 месяцев – кукурузу, пшеницу яровую, овес, ячмень яровой и озимый, рожь. Спустя 18 месяцев можно высевать подсолнечник, рис, сорго; через 2 года – все культуры без ограничений. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	-1
--	---------	--	---	--	----

Имазетапир + хлоримурон-этил

ФАБИАН, в.д.г. (450 г/кг + 150 г/кг) АО Фирма «Август» П-4 03.04.2036 г.	100 г/га	Соя	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные, в т.ч. виды амброзии	Опрыскивание вегетирующих сорняков в ранние фазы их развития (злаки – до 2-3 листьев, двудольные – до 4-6 листьев), независимо от фазы развития культуры, однократно. Расход рабочей жидкости 300 л/га.	-(1)
--	----------	-----	--	---	------

Имазетапир + имазамокс

ЭСХИЛ в.г.р. (40 г/л + 30 г/л) АО Фирма «Август» П-3 31.05.2034 г.	0,5-1,0	Подсолнечник, гибриды устойчивые к имидазолинонам	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорных растений (2-4 листа) и 4-5 листьев у культуры. Расход рабочей жидкости – 100 – 300 л/га	60 (1)
	0,5-1,0	Чечевица, гибриды устойчивые к имидазолинонам	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 4-6 листьев культуры в ранние фазы сорняков (2-4 листа). Расход рабочей жидкости – 100-300 л/га	60 (1)
	0,5-1,0	Рапс, гибриды устойчивые к имидазолинонам	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения.	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорных растений. Расход рабочей жидкости – 100- 300 л/га	60 (1)

Йодосульфурон-метил-натрий + тиенкарбазон-метил + мефенпир-диэтил (антисот)

ВЕЛОСИТИ ПАУЭР, в.д.г. (11,3 г/кг + 22,5 г/кг + 135 г/кг) ТОО «Байер КА3» П-3 05.08.2036 г.	0,22-0,33 + ПАВ 0,5 л/га	Яровая и озимая пшеница	Однолетние злаковые, однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе с 3-х листьев до 2-го междоузлия культуры	-1
---	-----------------------------	----------------------------	--	--	----

Йодосульфурон-метил-натрий + 2,4-Д-2-этилгексил + мефенпир диэтил (антисот)

МУШКЕТ ПЛЮС, м.д. (5 г/л + 430 г/л + 25 г/л) Байер КропСайенс АГ, Германия П-3 22.07.2029 г.	0,5-0,7	Пшеница яровая и озимая, яровой ячмень	Однолетние и многолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4 – Д и 2М – 4Х	Опрыскивание посевов в фазе с 3-х листьев до 2-го междоузлия культуры	60 (1)
	0,5-0,7	Кукуруза	Однолетние и многолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4 – Д и 2М – 4Х	Опрыскивание посевов в фазе с 3-х листьев до 5-ти листьев культуры	60 (1)

Пироксасульффон

ЛОКСУФОН ЭКСТРА, в.д.г. (850 г/кг) ШАНДОНГ ВЕЙФАНГ РЕЙНБОУ КЕМИКАЛ КО., ЛТД П-3 19.12.2035 г.	0,1-0,3	Кукуруза	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание почвы перед посевом или появлением всходов	-1
--	---------	----------	--	--	----

Кеинклорак

РИСУЛАМ 250, к.с. (250 г/л) ТОО «Агро-Хим-Лидер» П-3 23.04.2028 г.	1,8-2,4	Рис	Однолетние злаковые сорняки (просовидные)	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев культуры (2-4 листа у сорняков). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	-1
--	---------	-----	--	---	----

Клетодим

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 120 г/л					
КИНЕТИК ЛАЙТ,к.э. (120 г/л) Синтезия Кемп ГмбХ, Германия П-3 24.07.2033	0,8 – 1,0	Рапс, горчица, лён масличный, подсолнечник, горох, чечевица, соя, гречиха	Многолетние злаковые сорняки, в том числе пырей ползучий	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-20 см., независимо от фазы развития культуры	60(1)
	0,5 – 0,7	Рапс, горчица, лён масличный,	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев сорняков, независимо от фазы развития культуры	60(1)

		подсолнечник, горох, чечевица, соя, гречиха			
СЕЛЕКТ, к.э. (120 г/л) Arysta LifeScience S.A.S П-3 11.04.2033 г.	0,5-1,0	Рапс, соя, сахарная свекла, картофель, хлопчатник	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазу куриного проса 2-4 листа.	-1
	1,5-2,0	Рапс, соя, сахарная свекла, картофель, хлопчатник	Многолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-20 см независимо от фазы развития культуры	-1
17.04.2036 г.	0,5-1,0	Лен, горох, подсолнечник	Однолетние злаковые (просо куриное, виды щетинника)	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев у сорняков, независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га.	-1
	1,5-2,0	Лен, горох, подсолнечник	Многолетние злаковые сорняки, в том числе пырей ползучий	Опрыскивание посевов при высоте пырея 10-20 см, независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га.	-1
	0,5–1,5	Поля, предназначенные под посев различных сельскохозяйственных культур	Однолетние и многолетние злаковые сорняки , в том числе пырей ползучий	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной до посева или до всходов культур, опрыскивание сорняков осенью в послеуборочный период	-(1)
Скельта, к.э. (125 г/л) ТОО «Terra Prime» П-3 15.04.2036 г.	0,5-2,0	Горох	Однолетние и многолетние злаковые сорняки в том числе пырей ползучий	Опрыскивание посевов в фазу 2 –6 листьев у однолетних сорняков и высоте пырея ползучего 10–20 см независимо от фазы развития культуры	60(1)
	0,5-2,0	Чечевица	Однолетние и многолетние злаковые сорняки в том числе пырей ползучий	Опрыскивание посевов в фазу 2 –6 листьев у однолетних сорняков и высоте пырея ползучего 10–20 см независимо от фазы развития культуры	60(1)
	0,5-2,0	Лен	Однолетние и многолетние злаковые сорняки в том числе пырей ползучий	Опрыскивание посевов в фазу 2 –6 листьев у однолетних сорняков и высоте пырея ползучего 10–20 см независимо от фазы развития культуры	60(1)
	0,5-2,0	Подсолнечник	Однолетние и многолетние злаковые сорняки в том числе пырей ползучий	Опрыскивание посевов в фазу 2 –6 листьев у однолетних сорняков и высоте пырея ползучего 10–20 см независимо от фазы развития культуры	60(1)
СОНДЕЛЕКТ, к.э. (116,2 г/л) AGROBEST GRUP, Турция П-3 28.01.2030 г.	0,5-0,8	Рапс, подсолнечник, лен, соя, хлопчатник, картофель, свекла, лук, чечевица	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов при 2-4 листа однолетних злаковых сорняков независимо от фазы развития культуры	-1
ЦЕНЗОР МАКС, мас.к.э. (120 г/л) АО «Щелково Агрохим» П-3 19.04.2032 г.	0,3-1,0	Лён, рапс, подсолнечник, горчица, картофель, морковь, чечевица	Однолетние и многолетние злаковые сорняки в том числе пырей ползучий	Опрыскивание посевов в фазу 2-6 листьев у однолетних сорняков и высоте пырея ползучего 10-20 см независимо от фазы развития культуры	-1
ШЕДОУ, к. э. (120 г/л) Arysta LifeScience S.A.S, France П-3 05.04.2031 г.	0,5-1,0	Рапс, соя, сахарная свекла, картофель, хлопчатник, лен, горох, подсолнечник	Однолетние злаковые сорняки (просо куриное, виды щетинника и др)	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев у сорняков, независимо от фазы развития культуры	-1
	1,5-2,0	Рапс, соя, сахарная свекла, картофель, хлопчатник, лен, горох, подсолнечник	Многолетние злаковые сорняки, в том числе пырей ползучий	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-20 см, независимо от фазы развития культуры	-1
ЭРРОУ, к.э. (120 г/л) АДАМА РУС П-3 31.03.2033 г.	1,6-1,8	Подсолнечник	Многолетние злаковые сорняки	Опрыскивание в период вегетации.	-(1)
	0,6-0,7	Подсолнечник	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание в период вегетации.	-(1)
	1,6-1,8	Рапс яровой	Многолетние злаковые сорняки мятлик обыкновенный, мятлик луговой, рейграс пастбищный, гумай	Опрыскивание в период вегетации.	-(1)
	0,5-0,7	Рапс яровой	Однолетние злаковые сорняки: просо куриное, просо волосовидное, щетинник большой, лисохвост полевой	Опрыскивание в период вегетации.	-(1)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 150 г/л					
ГРАМИНИОН, к.э. (150 г/л) АО Фирма «Август» П-3 22.04.2030 г.	0,4-0,6	Рапс, соя, свекла сахарная, картофель, лен-долгунец, горох, подсолнечник, гречиха, чечевица, лен масличный	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев у сорняков независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости – 100-300 л/га	60 (1)
	1,0-1,5	гречиха, чечевица, лен масличный	Многолетние злаковые сорняки, в том числе пырей ползучий	Опрыскивание посевов при высоте пырея 10-20 см независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости – 100-300 л/га	
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 240 г/л					
БАЙТЕРЕК, к.э. (240 г/л) НАНЬЦЗИН ЭССЕНС ФАЙН-КЕМИКАЛ КО. ЛТД П-3 02.04.2036 г.	0,4-0,8	Свекла сахарная, соя, лук, хлопчатник, картофель	Многолетние злаковые сорняки, включая пырей ползучий	Опрыскивание посевов в период вегетации	-1
	0,2-0,4	Свекла сахарная, соя, лук, хлопчатник, картофель	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в период вегетации	-1
	0,3-0,4	Подсолнечник	Многолетние злаковые сорняки, включая пырей ползучий	Опрыскивание посевов в период вегетации.	-1
	0,15-0,2	Подсолнечник	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в период вегетации	-1
	0,3-0,4	Лен	Многолетние злаковые сорняки, включая пырей ползучий	Опрыскивание посевов в период вегетации.	-1
	0,15-0,2	Лен	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в период вегетации	-1
	0,3-0,4	Рапс	Многолетние злаковые сорняки, включая пырей ползучий	Опрыскивание посевов в период вегетации.	-1
	0,15-0,2	Рапс	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в период вегетации	-1

ГРАСИДИМ, к.э. (240 г/л) ШАНДОНГ ВЕЙФАНГ РЕЙНБОУ КЕМИКАЛ КО., ЛТД, П-4 03.02.2035 г.	0,15-0,4	Рапс, лен, подсолнечник	Многолетние злаковые сорные растения, включая пырей ползучий	Опрыскивание посевов в период вегетации	- (1)
ДАГОН, к.э. (240 г/л) ТОО «Астана-Нан» П-3 08.08.2032 г.	0,75-1,0	Чечевица	Многолетние злаковые сорняки, в том числе пырей ползучий	Опрыскивание посевов при высоте пырея 10-20 см, независимо от фазы развития культуры	-1
	0,25-0,5	Чечевица	Однолетние злаковые (просо куриное, виды щетинника)	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев у сорняков, независимо от фазы развития культуры	-1
	0,15-0,4 + ПАВ 0,5 г/га	Лён	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в период вегетации	-1
	0,15-0,4 + ПАВ 0,5 г/га	Рапс	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в период вегетации	-1
	0,75-1,0	Горох	Многолетние злаковые сорняки, в том числе пырей ползучий	Опрыскивание посевов при высоте пырея 10-20 см, независимо от фазы развития культуры	-1
	0,25-0,5	Горох	Однолетние злаковые (просо куриное, виды щетинника)	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев у сорняков, независимо от фазы развития культуры	-1
	0,15-0,4 + ПАВ 0,5 г/га	Подсолнечник	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в период вегетации	-1
Евроделект (240 г/л) AGROBEST GRUP, Турция П-3 29.09.2035 г.	0,5-0,7	Рапс,лен, подсолнечник, соя,хлопчатник	Многолетние злаковые сорняки , в т.ч. пырей	Опрыскивание при высоте многолетних злаковых сорняков 10-15 см независимо от фазы развития культуры	- (1)
	0,2-0,4	Рапс,лен, подсолнечник, соя,хлопчатник	однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов при 2-6 листа однолетних злаковых сорняков независимо от фазы развития культуры	- (1)
КАДИМ 240, к.э. (240 г/л) ТОО «Достық-Агро 2012», Казахстан П-3 16.03.2030 г.	0,125-0,2 + ПАВ Адыогейн 10, 0,3 л/га	Рапс и лен	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание в период вегетации.	-1
	0,3-0,4 + ПАВ Адыогейн 10, 0,3 л/га	Рапс и лен	Многолетние злаковые сорняки, включая пырей ползучий	Опрыскивание в период вегетации.	-1
	0,3-0,4 + ПАВ Адыогейн 10, 0,3 л/га	Чечевица	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание в период вегетации.	-1
	0,6-0,8+ ПАВ Адыогейн 10, 0,3 л/га	Чечевица	Многолетние злаковые сорняки, включая пырей ползучий	Опрыскивание в период вегетации.	-1
	0,125-0,2 + ПАВ Адыогейн 10,0,3 л/га	Подсолнечник	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание в период вегетации.	-1
	0,3-0,4 + ПАВ Адыогейн 10, 0,3 л/га	Подсолнечник	Многолетние злаковые сорняки, включая пырей ползучий	Опрыскивание в период вегетации.	-1
КАТРОС, к.э. (240 г/л) ТОО «Agro Mark Kaz» Казахстан П-3 21.04.2030 г.	0,15-0,4	Рапс, горчица, лен	Однолетние и многолетние злаковые сорняки, в том числе пырей ползучий	Опрыскивание вегетирующих сорняков. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	-1
	0,15-0,4	Подсолнечник			
	0,15-0,4	Бобовые, чечевица, горох			
КИНЕТИК, к.э. (240 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-3 12.01.2036 г.	0,15-0,2 + ПАВ 0,5 г/га	Рапс	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в период вегетации.	-1
	0,3-0,4 + ПАВ 0,5 г/га	Рапс	Многолетние злаковые сорняки, включая пырей ползучий	Опрыскивание посевов в период вегетации.	-1
	0,15-0,2 + ПАВ 0,5 г/га	Лен	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в период вегетации.	-1
	0,3-0,4 + ПАВ 0,5 г/га	Лен	Многолетние злаковые сорняки, включая пырей ползучий	Опрыскивание посевов в период вегетации.	-1
	0,15-0,2 + ПАВ 0,5 г/га	Подсолнечник	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в период вегетации.	-1
	0,3-0,4 + ПАВ 0,5 г/га	Подсолнечник	Многолетние злаковые сорняки, включая пырей ползучий	Опрыскивание посевов в период вегетации.	1
	0,15-0,4 л/ га + ПАВ 0,3 л/га	Чечевица	Однолетние и многолетние злаковые сорняки, включая пырей ползучий	Опрыскивание посевов в период вегетации	60(1)
	0,15-0,4 л/ га + ПАВ 0,3 л/га	Гречиха	Однолетние и многолетние злаковые сорняки, включая пырей ползучий	Опрыскивание посевов в период вегетации	60(1)
	0,15-0,4 л/ га + ПАВ 0,3 л/га	Горчица	Однолетние и многолетние злаковые сорняки, включая пырей ползучий	Опрыскивание посевов в период вегетации	60(1)
	0,15-0,4 л/ га + ПАВ 0,3 л/га	Соя	Однолетние и многолетние злаковые сорняки, включая пырей ползучий	Опрыскивание посевов в период вегетации	60(1)
	0,15-0,4 л/ га + ПАВ 0,3 л/га	Горох	Однолетние и многолетние злаковые сорняки, включая пырей ползучий	Опрыскивание посевов в период вегетации	60(1)
КЛЕТОШАНС, к.э. (240 г/л)	0,7-1,0	Лен	Многолетние злаковые (пырей ползучий) сорняки	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» льна, 2-6 листьев у однолетних злаковых сорняков в	60(1)

ООО «Шанс» П-3 09.02.2034	0,2-0,4	Лен	Однолетние злаковые сорняки	баковой смеси с ПАВ Шанс-90, Ж (0,2 л/га). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га.	
	0,7-1,0	Подсолнечник, рапс яровой, картофель	Многолетние злаковые, в т.ч. пырей ползучий	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-20 см независимо от фазы развития культуры с добавлением ПАВ Шанс90, Ж (0,2 л/га). Расход рабочей жидкости – 200- 300 л/га	60(1)
	0,2-0,4	Подсолнечник, рапс яровой, картофель	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание сорняков в фазе 2-6 листьев у сорняков независимо от фазы развития культуры с добавлением ПАВ Шанс-90, Ж (0,2 л/га). Расход рабочей жидкости 200-300л/га	60(1)
	0,15-0,4	Соя	Однолетние и многолетние злаковые сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60(1)
	0,2-1,0	Хлопчатник			
ЛЕГИОН КОМБИ, к.э. (240 г/л) ООО «Агро Эксперт Групп», Россия П-3 09.02.2028 г.	0,125-0,4	Рапс	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев сорных растений независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	-1
	0,5-1,0	Рапс	Многолетние злаковые сорняки (в т.ч. пырей ползучий)	Опрыскивание при высоте пырея ползучего 10-20 см, независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	-1
	0,125-0,4	Подсолнечник	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев сорных растений независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га.	-1
	0,5-1,0	Подсолнечник	Многолетние злаковые сорняки (в т.ч. пырей ползучий)	Опрыскивание при высоте пырея ползучего 10-20 см, независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	-1
	0,125-0,4	Картофель	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев сорных растений независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости 200-300л/га	-1
	0,5-1,0	Картофель	Многолетние злаковые сорняки (в т.ч. пырей ползучий)	Опрыскивание при высоте пырея ползучего 10-20 см, независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	-1
	0,125-0,4	Сахарная свекла	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев сорных растений независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости 200-300л/га	-1
	0,5-1,0	Сахарная свекла	Многолетние злаковые сорняки (в т.ч. пырей ползучий)	Опрыскивание при высоте пырея ползучего 10-20 см, независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	-1
	0,125-0,4	Лен	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев сорных растений назависимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	-1
	0,5-1,0	Лен	Многолетние злаковые сорняки (в т.ч. пырей ползучий)	Опрыскивание при высоте пырея ползучего 10-20 см, независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости – 200- 300 л/га	-1
	0,125-0,4	Соя	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев сорных растенийназависимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	-1
	0,5-1,0	Соя	Многолетние злаковые сорняки (в т.ч. пырей ползучий)	Опрыскивание при высоте пырея ползучего 10-20 см, независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	-1
МАГНЕТО, к.э. (240 г/л) Жеджянг Жонгшан Кемикал Индастри Груп Ко., Лтд, Китай П-3 27.02.2030	0,3-0,4	Рапс, лен масличный	Многолетние злаковые сорняки, включая пырей ползучий	Опрыскивание посевов при высоте вредного объекта 10-20 см, независимо от фазы развития культуры	-1
ПИЛАРОФ, к.э. (240 г/л) Пиларквим (Шанхай) Ко., Лтд, Китай П-3 21.02.3030 г.	0,125-0,2	Рапс, подсолнечник, лен	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в период вегетации	72 (2)
	0,35-0,4	Рапс, подсолнечник, лен	Многолетние сорняки, включая пырея ползучего	Опрыскивание посевов в период вегетации	72 (2)
ПРОФИТ к.э. (240 г/л) ТОО «QADAM Group (КАДАМ Групп)» П-3 29.11.2032 г.	0,7 – 1,0	Подсолнечник, рапс, лен	Многолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-20 см независимо от фазы развития культуры	-1
	0,2 – 0,4	Подсолнечник, рапс, лен	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев у сорняков независимо от фазы развития культуры	-1
	0,4 – 0,6	Сафлор	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев у сорняков независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости 100 л/га.	-1
	0,4 – 0,6	Сафлор	Многолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-20 см независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости 100 л/га.	-1
Реллик Голд, к.э. (240 г/л) ТОО «Golden Agro Plant» П-3	0,2-0,4	Лен	Однолетние и многолетние злаковые сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков	60(1)
	0,2-0,4	Рапс	Однолетние и многолетние злаковые сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков	60(1)

09.04.2036 г.					
СПАЙДЕР, к.э. (240 г/л) Юнайтед Агри-Кемикал Компани ГмбХ, Швейцария П-3 12.04.2031 г.	0,125-0,2	Рапс и лен	Однолетние и многолетние злаковые сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков	-1
	0,35-0,4	Рапс и лен	Однолетние и многолетние злаковые сорняки, включая пырей ползучий	Опрыскивание вегетирующих сорняков	-1
Спринг 240, к.э. (240 г/л) ТОО Айбад-2015 П-3 16.01.2031 г.	0,125-0,4	Рапс	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев сорных растений независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости 200-300л/га	60 (1)
	0,5-1,0	Рапс	Многолетние злаковые сорняки, включая пырей ползучий	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-20 см, независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	60 (1)
	0,125-0,4	Подсолнечник	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев сорных растений независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости 200-300л/га	60 (1)
	0,125-0,4	Лен	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев сорных растений независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости 200-300л/га	60 (1)
	0,5-1,0	Лен	Многолетние злаковые сорняки, включая пырей ползучий	Опрыскивание посевов при высоте пырея 10-20 см, независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га.	60 (1)
СТИМУЛ, к.э. (240 г/л) ARCUS INVEST HOLDING B.V. П-3 17.02.2030 г.	0,125-0,2	Рапс и лен	Однолетние и многолетние злаковые сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков	60(1)
	0,35-0,4	Рапс и лен	Однолетние и многолетние злаковые сорняки, включая пырей ползучий	Опрыскивание вегетирующих сорняков	60(1)
	0,35-0,4	Подсолнечник, чечевица, гречиха	Однолетние и многолетние злаковые сорняки, включая пырей ползучий	Опрыскивание вегетирующих сорняков	-1
ТАЛГАМ 240, к.э., (240 г/л) Филиал "Hangzhou Ruijiang Crop Science Co.,Ltd., Казахстан" "Hangzhou Ruijiang Crop Science Co., Ltd., Китай" в городе Алматы П-3 12.04.2033	0,2-0,4	Рапс, лен, соя, сафлор, свекла сахарная, подсолнечник	Однолетние и многолетние злаковые сорняки, включая пырей ползучий	Опрыскивание посевов в период вегетации	(-1)
ТАЛИСМАН, к.э. (240 г/л) ЛЕЙТОН АГРИО ЕВРОПА КФТ ВЕНГРИЯ П-3 09.03.2032 г.	0,2-0,4	Лен масличный	Однолетние и многолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	-1
	0,2-0,4	Горчица	Однолетние и многолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	-1
	0,2-0,4	Подсолнечник	Однолетние и многолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев сорных растений независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	-1
	0,2-0,4	Рапс	Однолетние и многолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	-1
Тулпар, к.э. (240 г/л) ТОО «Агро Глобал» П-3 08.01.2036 г.	0,3-0,4 + ПАВ Адьюгрейн 10, 0,3 л/га	Чечевица	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание в период вегетации	-1
	0,6-0,8 + ПАВ Адьюгрейн 10, 0,3 л/га	Чечевица	Многолетние злаковые сорняки, включая пырей ползучий	Опрыскивание в период вегетации	-1
	0,125-0,2 + ПАВ Адьюгрейн 10, 0,3 л/га	Рапс, лен, подсолнечник	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание в период вегетации	-1
	0,3-0,4 + ПАВ Адьюгрейн 10, 0,3 л/га	Рапс, лен, подсолнечник	Многолетние злаковые сорняки, включая пырей ползучий	Опрыскивание в период вегетации	-1
	0,125-0,2 + ПАВ Адьюгрейн 10, 0,3 л/га	Лен	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание в период вегетации	- 1
	0,3-0,4 + ПАВ Адьюгрейн 10, 0,3 л/га	Лен	Многолетние злаковые сорняки, включая пырей ползучий	Опрыскивание в период вегетации	- 1
	0,125-0,2 + ПАВ Адьюгрейн 10, 0,3 л/га	Подсолнечник	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание в период вегетации	- 1
	0,3-0,4 + ПАВ Адьюгрейн 10, 0,3 л/га	Подсолнечник	Многолетние злаковые сорняки, включая пырей ползучий	Опрыскивание в период вегетации	- 1
ЦЕНТУР, к.э. (240 г/л)	0,2-0,3	Лен	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев у сорняков в ранние фазы развития культуры.	-1

DVA Agro GmbH, Германия П-3 11.03.2030 г.	0,4-0,7	Лен	Многолетние злаковые сорняки, включая пырей	Опрыскивание посевов при высоте пырея 10-20 см.	-1
	0,2-0,3	Рапс	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев у сорняков в ранние фазы развития культуры.	-1
	0,4-0,7	Рапс	Многолетние злаковые сорняки, включая пырей	Опрыскивание посевов при высоте пырея 10-20 см.	-1
	0,2-0,3	Подсолнечник	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев у сорняков в ранние фазы развития культуры.	-1
	0,4-0,7	Подсолнечник	Многолетние злаковые сорняки, включая пырей	Опрыскивание посевов при высоте пырея 10-20 см.	-1
	0,2-0,3	Соя	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев у сорняков в ранние фазы развития культуры.	-1
	0,4-0,7	Соя	Многолетние злаковые сорняки, включая пырей	Опрыскивание посевов при высоте пырея 10-20 см.	-1
ЭФЕС, к.э. (240 г/л) ООО «Форвард», Россия П-3 27.05.2029 г.	0,2-0,4 + ПАВ Неон 99 0,2 л/га	Лен масличный	Однолетние злаковые сорняки (щетинник, просо куриное, просо сорнополевое)	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» льна и в период активного роста сорняков (в фазе от 2 до 6 листьев) в баковой смеси с 0,2 л/га ПАВ Неон 99. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	-1
	0,7-1,0 + ПАВ Неон 99 0,2 л/га	Лен масличный	Многолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» льна и в период активного роста сорняков (при высоте пырея ползучего 10-20 см) в баковой смеси с 0,2 л/га ПАВ Неон 99. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	-1
	0,2-0,4 + ПАВ Неон 99 0,2 л/га	Сахарная свекла	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание сорняков в период их активного роста (в фазе от 2 до 6 листьев) с добавлением 0,2 л/га ПАВ Неон 99 независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	60 (1)
	0,7-1,0 + ПАВ Неон 99 0,2 л/га	Сахарная свекла	Многолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-20 см с добавлением 0,2 л/га ПАВ Неон 99 независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60 (1)
	0,2-0,4 + ПАВ Неон 99 0,2 л/га	Подсолнечник	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание сорняков в период их активного роста (в фазе от 2 до 6 листьев) с добавлением 0,2 л/га ПАВ Неон 99 независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60 (1)
	0,7-1,0 + ПАВ Неон 99 0,2 л/га	Подсолнечник	Многолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-20 см с добавлением 0,2 л/га ПАВ Неон 99 независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	60 (1)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 360 г/л					
Центурион Профи, к.э. (360 г/л) Arysta LifeScience S.A.S П-3 08.07.2035 г.	0,5-0,7	Подсолнечник, рапс яровой, лен, горох, хлопчатник	Многолетние злаковые, в том числе пырей ползучий, сорные растения	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10–20 см независимо от фазы развития культуры совместно с ПАВ Сильвет Форте (100% органосиликоновый сурфактант) - 0,2% от объема рабочей жидкости. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)
	0,3-0,4	Подсолнечник, рапс яровой, лен, горох, хлопчатник	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2–6 листьев у сорняков независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)
	0,8-1,0	Подсолнечник, рапс яровой, лен, горох, хлопчатник	Многолетние злаковые, в том числе пырей ползучий, сорные растения	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10–20 см независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	60(1)
	0,15-0,3	Подсолнечник, рапс яровой, лен, горох, хлопчатник	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2–6 листьев у сорняков независимо от фазы развития культуры совместно с ПАВ Сильвет Форте (100% органосиликоновый сурфактант) - 0,2% от объема рабочей жидкости. Расход рабочей жидкости 200- 300 л/га	60(1)
ВЫБОР, к.э. (360 г/л) ШАНДОНГ ВЕЙФАНГ РЕЙНБОУ КЕМИКАЛ КО., ЛТД., П-3 10.10.2027 г.	0,16-0,33	Рапс	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев у куриного проса	-1
	0,5-0,66	Рапс	Многолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-20 см независимо от фазы развития культуры	-1
29.01.2029 г.	0,16-0,33	Подсолнечник, соя, лен	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев у куриного проса	-1
	0,5-0,6	Подсолнечник, соя, лен	Многолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-20 см (независимо от фазы развития культуры)	-1

Клетодим + галоксифоп-п-метил

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 130 г/л + 80 г/л					
КВИКСТЕП, к.э. (130 г/л + 80 г/л) АО Фирма «Август» П-3 19.01.2027 г.	0,4-0,8	Рапс, свекла сахарная, соя, лук	Однолетние и многолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-6 листьев) однолетних злаковых сорняков, при высоте пырея ползучего 10-20 см, независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га.	-1

	0,4-0,8	Лен масличный	Однолетние и многолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» льна и ранние фазы развития (2-6 листьев) однолетних сорняков, при высоте пырея ползучего 10-20 см. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	-1
	0,4	Подсолнечник, картофель	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-6 листьев) однолетних сорняков независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	60 (1)
	0,4	Морковь	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-6 листьев) однолетних сорняков независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	60 (1)
	0,8	Морковь	Многолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-20 см, независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	60 (1)
	0,8	Подсолнечник, картофель	Многолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-20 см, независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	60 (1)
	0,4-0,8	Сафлор	Однолетние и многолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-6 листа) однолетних сорняков, при высоте пырея 10-20 см, независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости 100-300 л/га	-(1)
Клегал, м.к.э. (130 г/л + 80 г/л) ФОРВАД П-3 28.01.2036 г.	0,6-0,8	Картофель	Многолетние злаковые сорные растения, в том числе пырей ползучий	Опрыскивание посадок в фазе 2-6 листьев многолетних сорных растений, при высоте пырея ползучего 10-20 см, независимо от фазы развития культуры	-(1)
	0,4-0,6	Картофель	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посадок в фазе 2-6 листьев сорных растений независимо от фазы развития культуры	-(1)
	0,6-0,8	Лен долгунец и масличный	Многолетние злаковые сорные растения, в том числе пырей ползучий	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» льна и ранние фазы развития (2-6 листьев) многолетних сорняков, при высоте пырея ползучего 10-20 см	-(1))
	0,4-0,6	Лен долгунец и масличный	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» льна и ранние фазы развития (2-6 листьев) однолетних сорных растений	-(1))
	0,6-0,8	Свекла сахарная, рапс яровой и озимый, соя, горох, нут, чечевица, подсолнечник (на семена и масло), гречиха, люпин, люцерна, сафлор	Многолетние злаковые сорные растения, в том числе пырей ползучий	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев многолетних сорных растений, при высоте пырея ползучего 10-20 см, независимо от фазы развития культуры	-(1)
	0,4-0,6	Свекла сахарная, рапс яровой и озимый, соя, горох, нут, чечевица, подсолнечник (на семена и масло), гречиха, люпин, люцерна, сафлор	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев сорных растений независимо от фазы развития культуры	-(1)
СУПРИМ, к.э. (130 г/л + 80 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-3 01.03.2027 г	0,3-0,4	Лен, рапс, горчица, гречиха, чечевица, горох, подсолнечник	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам	-1

Клетодим + хизалофоп-п-этил

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 137 г/л + 73 г/л					
КИНЕТИК ФОРТЕ, к.э. (137 г/л + 73 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-3 29.05.2030 г.	0,3-0,4	Чечевица	Однолетние и многолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов вегетирующих сорняков в период их активного роста	-1
	0,3-0,4	Рапс			
	0,3-0,4	Лен масличный			
	0,3-0,4	Подсолнечник			
ЭВОЛЮШН, к.э. (140 г/л+70 г/л) Arysta LifeScience S.A.S П-3 08.12.2032 г.	0,75-1,0 + ПАВ	Подсолнечник, рапс яровой, горох	Многолетние злаковые, в том числе пырей ползучий	Опрыскивание посевов и посадок в фазе 2-6 листьев сорных растений, при высоте пырея ползучего 10-20 см независимо от фазы развития культуры в смеси с ПАВ Сильвет Форте (100 % органосиликоновый сурфактант) – 0,2% от объема рабочей жидкости. Расход рабочей жидкости: 200-300 л/га	60(1)
	0,35-0,5 + ПАВ	Подсолнечник, рапс яровой, горох	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов и посадок в фазе 2-6 листьев сорных растений независимо от фазы развития культуры в смеси с ПАВ Сильвет Форте (100 % органосиликоновый сурфактант) -0,2% от объема рабочей жидкости. Расход рабочей жидкости: 200-300 л/га	60(1)

Клодинафоп-пропаргил + клокви́нтосет-мексил

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 80 г/л + 20 г/л					
ГОРИЗОН 080, к.э. (80 г/л + 20 г/л) Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария П-3 14.03.2033 г.	0,3-0,5	Яровая пшеница	Овсяг	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2 листа до конца кушения (независимо от фазы развития культуры)	-1
	0,5-0,75	Яровая пшеница	Однолетние злаковые сорняки, в т.ч. щетинники, куриное просо	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2 листа до конца кушения (независимо от фазы развития культуры)	-1

ГОРИЗОН 080 БФ, к.э. (80 г/л + 20 г/л) Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария П-3 27.03.2028 г.	0,3-0,5	Яровая пшеница	Овсяг	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (3-4 листа)	-1
	0,5-0,75	Яровая пшеница	Однолетние злаковые сорняки, в т.ч. щетинники, куриное просо	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (3-4 листа)	-1
ДЕЛЕГАТ, к.э. (80 г/л + 20 г/л) Лейтон Агрио Европа КФТ Венгрия П-3 14.03.2027 г.	0,4-0,5	Пшеница яровая	Овсяг	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2-го листа до конца кущения (независимо от фазы развития культуры)	-1
	0,5-0,75	Пшеница яровая	Однолетние злаковые (просо куриное, виды щетинника)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2-го листа до конца кущения (независимо от фазы развития культуры)	-1
ИТТАР 80, к.э. (80 г/л + 20 г/л) ТОО «Бартонс Кемикал ГмбХ» П-4 17.02.2030 г.	0,3-0,5	Пшеница яровая	Овсяг	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (3-4 листа)	-1
	0,5-0,75	Пшеница яровая	Однолетние злаковые сорняки – виды щетинника, просо куриное	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (3-4 листа)	-1
ЛЕГГЕРО ЛАЙТ, к.э. (80 г/л + 20 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-3 26.01.2033 г.	0,5-0,75	Пшеница яровая	Однолетние злаковые сорняки, в т.ч. щетинники, просянки	Опрыскивание вегетирующих сорняков независимо от фазы развития культуры	-(1)
	0,3-0,5	Пшеница яровая	Овсяг	Опрыскивание вегетирующих сорняков независимо от фазы развития культуры	-(1)
ОВЕН, к.э. (80 г/л + 20 г/л) Представительство ООО "Агро Эксперт Групп" в РК П-3 31.10.2035 г.	0,3-0,5	Пшеница яровая и озимая	Овсяг	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2 листа до конца кущения (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га.	-1
	0,5-0,75	Пшеница яровая	Однолетние злаковые сорняки (щетины, просянки)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2 листа до конца кущения (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости – 200- 300 л/га.	-1
ТЕРДОК 8%, к.э. (80 г/л + 20 г/л) AGROBEST GRUP, Турция П-4 17.02.2030 г.	0,4-0,5	Пшеница яровая и озимая	Однолетние злаковые (овсяг)	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (3-4 листа)	-1
ТОПИК 080, к.э. (80 г/л + 20 г/л) Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария П-3 02.11.2032 г. 17.03.2027 г.	0,5-0,75	Пшеница яровая	Однолетние злаковые (просо куриное, виды щетинника)	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (3-4 листа)	-1
	0,3-0,5	Пшеница яровая	Овсяг	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (3-4 листа)	-1
ТОПИК 080 ВФ, к.э. (80 г/л + 20 г/л) Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария П-3 10.07.2027 г.	0,3-0,5	Пшеница яровая	Овсяг	Опрыскивание посевов в период вегетации	-1
	0,5-0,75	Пшеница яровая	Однолетние злаковые сорняки в т.ч. (просо куриное, виды щетины)	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (3-4)	-1
ФЕНИКС, к.э. (80 г/л + 20 г/л) ООО «Шанс» П-3 09.12.2032 г.	0,4-0,5	Пшеница озимая	Однолетние злаковые сорняки (виды щетины, просо куриное, просо сорнополевое, овсяг, метлица полевая, лисохвост мышехвостиковый)	Опрыскивание посевов по вегетирующим злаковым сорнякам (от 2-3 листьев до конца кущения) независимо от фазы развития культуры. Озимая пшеница обрабатывается весной. Расход рабочей жидкости – 150-200 л/га	60(1)
	0,4-0,5	Пшеница яровая	Однолетние злаковые сорняки (виды щетины, просо куриное, просо сорно- полевое, овсяг, метлица полевая, лисохвост мышехвостиковый)	Опрыскивание посевов по вегетирующим злаковым сорнякам (от 2-3 листьев до конца кущения) независимо от фазы развития культуры. Озимая пшеница обрабатывается весной. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	60(1)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 150 г/л + 37,5 г/л					
Тигуан 15%, м.э (150 г/л+37,5 г/л) Shaanxi Sunger Road Bio-Science CO., Ltd., Китай П-2 29.09.2035 г.	0,195-0,4	Пшеница озимая	Однолетние злаковые сорняки в т.ч. (овсяг, просо куриное, сорнополевые, щетины, метлица обыкновенная)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2-го листа до конца кущения (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости – 200- 300 л/га	-(1)
	0,195 - 0,4	Пшеница яровая	Однолетние злаковые сорняки а т.ч. (овсяг, просо куриное, сорнополевые, щетины, метлица обыкновенная)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2-го листа до конца кущения (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости – 200- 300 л/га	-(1)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 240 г/л+ 60 г/л					
АЙДОК, к.э. (240 г/л+ 60 г/л) AGROBEST GRUP, Турция П-4 21.05.2035 г.	0,2-0,25	Яровая пшеница	Щетинник, куриное просо	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (3-4 листа)	-1
	0,1-0,15	Яровая пшеница	Овсяг	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (3-4 листа)	-1
ВАРЯГ, к.э. (240 г/л + 60 г/л) Юнайтед Агри-Кемикал Компани ГмбХ, Швейцария П-4 12.04.2031 г.	0,2	Пшеница яровая	Овсяг	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам	-1
	0,3–0,35	Пшеница яровая	Однолетние злаковые (просо сорнополевое, щетины)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам	-1
Вариатор, к.э. (240 г/л + 60 г/л) ТОО «Айбад-2015» П-3 14.08.2034 г.	0,1-0,2	Пшеница яровая	Однолетние злаковые сорняки (овсяг, просо куриное, виды щетины)	Опрыскивание посевов в ранние фазы сорняков (3-4 листа)	-(1)

ЗЛАКО ПИК, к.э. (240 г/л + 60 г/л) ТОО «Агро-Хим-Лидер» П-4 15.02.2032 г.	0,1-0,15	Пшеница яровая	Овсяг, щетинник, куриное просо	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (3-4-листья) с добавлением прилипателя 1л/га.	-1
КЛОВИТ, к.э. (240 г/л + 60 г/л) ШАНДОНГ ВЕЙФАНГ РЕЙНБОУ КЕМИКАЛ КО., ЛТД., П-3 19.09.2027 г.	0,2	Пшеница яровая	Овсяг	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам	-1
	0,3-0,35	Пшеница	Однолетние злаковые сорняки (просо сорнополевое, щетинники)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам	-1
КЛОДИМАКС, к.э. (240 г/л + 60 г/л) ТОО «Достык Агро 2012» П-3 4.08.2031 г.	0,2	Пшеница яровая	Овсяг	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам	-1
	0,3-0,35	Пшеница яровая	Однолетние злаковые сорняки (просо сорнополевое, щетинники)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам	-1
ЛЕГГЕРО, э.м.в. (240 г/л + 60 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-3 30.07.2031 г.	0,2	Пшеница яровая	Овсяг	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам	-1
	0,3-0,35	Пшеница яровая	Однолетние злаковые (просо сорнополевое, щетинники)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам	-1
ЛЕГГЕРО ФОРТЕ, к.э. (240 г/л + 60 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-3 01.03.2027 г.	0,15-0,25	Пшеница яровая	Однолетние злаковые сорняки (овсяг, просо куриное, виды щетинника)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам независимо от фазы развития культуры	-1
ЛИБЕРТИ ПЛЮС, к.э. (240 г/л + 60 г/л) ARCUS INVEST HOLDING B.V. П-3 04.03.2030 г.	0,2	Пшеница яровая	Овсяг	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам	60 (1)
	0,3-0,35	Пшеница яровая	Однолетние злаковые (просо сорнополевое, щетинники)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам	60 (1)
ПРЕЛЕГО, к.э. (240 г/л + 60 г/л) LIER CHEMICAL CO.,LTD. П-3 12.03.2034 г.	0,1-0,25	Пшеница яровая и озимая	Овсяг, щетинник, куриное просо	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (3-4 листа)	-(1)
СТАЗИС, к.э. (240 г/л + 60 г/л) Жеджанг Жонгшан Кемикал Индастри Груп Ко., Лтд, Китай П-3 27.02.2030 г.	0,1-0,2	Пшеница яровая	Однолетние злаковые сорняки (овсяг, щетинник, просо куриное)	Опрыскивание посевов в раннюю фазу роста сорняков (3-4 листа)	60 (1)
ТОП ИКС к.э (240 г/л + 60 г/л) ТОО «GOOD JOB INDUSTRY KAZAKHSTAN» («ГУД ДЖОБ ИНДАСТРИ КАЗАХСТАН») П-3 08.11.2033	0,3-0,35	Пшеница яровая	Однолетние злаковые сорняки (просо сорнополевое, щетинники)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам	-(1)
	0,2		Овсяг	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам	
ЦЕНТУРИОН, э.м.в. (240 г/л + 60 г/л) ТОО «Астана-Нан» П-3 23.06.2036 г.	0,1-0,2	Пшеница яровая	Овсяг	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (3-4 листа).	-1
	0,2-0,35	Пшеница яровая	Однолетние злаковые (просо куриное и сорно-полевое, виды щетинника)	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (3-4 листа).	-1
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 300 г/л + 75 г/л					
ЛЕГГЕРО 300, к.э. (300 г/л + 75 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-3 16.05.2035 г.	0,1-0,2	Пшеница озимая и яровая	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам независимо от фазы развития культуры	-1

Клодинафоп-пропаргил + трибенурон-метил + флорасулам + клокви́нтосет-мексил (антидот)

КОМПОЗИТ, с.п. (150 г/кг + 48 г/кг + 16 г/кг + 37,5 г/кг) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-3 12.04.2029 г.	0,25-0,3	Пшеница яровая	Однолетние злаковые и однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов с фазы 3-х листьев до 2-го междоузлия культуры Расход рабочей жидкости – 150-200 л/га	-1
---	----------	----------------	---	--	----

Клопиралид

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 300 г/л					
АГРОН, в.р. (300 г/л) Представительство ООО «Агро Эксперт Групп» в РК П-3 20.06.2032 г.	0,3-0,4	Рапс	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки (в т.ч. виды ромашки, осота, горца, бодяка, латука)	Опрыскивание посевов в фазе 3-4-листьев культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га.	60(1)
	0,1-0,3	Лен масличный	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки (в т.ч. виды ромашки, осота, горца, латука).	Опрыскивание посевов в фазе «ёлочки» культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60(1)
ГЕРМЕС 300, в.р. (300 г/л) ТОО «Агро Глобал» П-3 08.01.2029 г.	1,0	Кукуруза	Виды осота ромашки, горца,	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры	-1
	0,3-0,5	Свекла сахарная	Виды осота, ромашки, горца	Опрыскивание в фазе 1-3 пар настоящих листьев культуры посевов	-1
	0,1-0,3	Лен- долгунец	Виды осота,	Опрыскивание в фазе «ёлочки» культуры при фазе розетки у сорняков посевов	-1
	0,2-0,5	Капуста белокочан ная	Виды осота ромашки, горца	Опрыскивание растений после высадки рассады	-1

	0,3-0,4	Рапс яровой (семенные посевы)	Виды осота, ромашки, горца	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культур	-1
Клорит, в.р. (300 г/л) ТОО «ФМРус» П-3 04.02.2035 г.	0,2-0,4	Кукуруза	Виды ромашки, горца, гречишка выюнкковая, виды бодяка, осота, латука	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га.	60 (1)
	0,2-0,4	Рапс яровой (семенные посевы)	Виды осота, ромашки, горца	Опрыскивание в фазе 3-4 настоящих листьев культуры. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га.	-(1)
	0,2-0,4	Пшеница озимая и яровая	Виды ромашки, горца, гречишка выюнкковая, виды бодяка, осота, латука	Опрыскивание посевов в фазе кущения – до выхода в трубку культуры. Озимые обрабатываются весной. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га.	55(1)
	0,3-0,5	Сахарная свекла	Виды ромашки, горца, гречишка выюнкковая, виды бодяка, осота, латука	Опрыскивание посевов в фазу 1-3 пары настоящих листьев культуры. Расход рабочей жидкости – 200- 300 л/га	60(1)
	0,1-0,3	Лен масличный	Виды осота, ромашки, горца	Опрыскивание посевов в фазе "елочки" льна. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	60(1)
	0,3-0,5	Свекла сахарная	Виды осота, ромашки, горца	Опрыскивание посевов в фазу 1-3 пар настоящих листьев культуры	-(1)
ЛОРНЕТ, в.р. (300 г/л) АО «Щелково Агрохим» П-3 08.04.2032 г.	0,3-0,4	Рапс	Виды осота, ромашки, горца	Опрыскивание посевов в фазу 3-4 листьев культуры	-(1)
	0,1-0,3	Гречица	Виды ромашки, горца, бодяка, осота, латука	Опрыскивание посевов в фазу 1 настоящего листа культуры	-(1)
	0,1-0,3	Лен	Виды осота, ромашки, горца, бодяка	Опрыскивание посевов в фазу «ёлочки» культуры и фазу розетки многолетних двудольных сорняков	-1
01.10.2030 г.	0,3-0,4	Горчица	Многолетние двудольные (осоты, одуванчик) и некоторые однолетние двудольные (ромашка пахучая, горцы)	Опрыскивание посевов начиная с фазы 3-4-х листьев культуры до фазы бутонизации	-1
МАКСИМУС, в.р. (300 г/л) ТОО «QADAMGroup (КАДАМГрупп)» П-3 25.09.2029 г.	0,3-0,4	Рапс яровой	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-4 листьев культуры	-(1)
РАЛИД 300, в.р. (300 г/л) Sinochem Agro CO, Ltd П-3 14.03.2028 г.	0,3-0,5	Свекла сахарная	Виды осота, ромашки, горца	Опрыскивание посевов в фазе 1-3 пар настоящих листьев культуры. Расход рабочей жидкости – 250-300 л/га	-(1)
	0,1-0,3	Лен	Виды осота	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» культуры при фазе розетки у сорняков. Расход рабочей жидкости 250-300 л/га	-(1)
	0,3-0,4	Рапс	Виды осота, ромашки, горца	Опрыскивание посевов в фазе 3-4 листьев культуры. Расход рабочей жидкости 250-300 л/га	-(1)
	0,5-0,6	Земляника	Многолетние двудольные (осоты, щавель, одуванчик) и некоторые однолетние двудольные (ромашка, горцы)	Опрыскивание вегетирующих сорняков, после сбора урожая. Расход рабочей жидкости 250- 300 л/га	-(1)
	0,3-0,4	Лук (всех генераций)	Многолетние двудольные (осоты, щавель, одуванчик) и некоторые однолетние двудольные (ромашка, горцы)	Опрыскивание посевов в фазе 2-х настоящих листьев культуры. Расход рабочей жидкости 250-300 л/га	-(1)
	0,4	Трава газонная	Многолетние двудольные (осоты, щавель,	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры	-(1)
СТОУН 300, в.р. (300 г/л) Бартонс Кемикал ГмбХ., Швейцария П-3 17.02.2030 г.	0,3-0,4	Рапс яровой (семенные посевы)	Виды осота, ромашки, горца	Опрыскивание посевов в фазе 3-4 листьев культуры	-1
СЭНТИУМ, в.р. (300 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия, П-3 23.02.2032 г.	0,1-0,3	Лен масличный	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу «елочки» культуры	-1
	0,3-0,4	Рапс	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание в фазе 3-4 настоящих листьев рапса ярового	-1
	0,3-0,4	Горчица	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание в фазе 3-4 настоящих листьев горчицы	-1
ТРЕЛ 300, в.р. (300 г/л) ТОО «Agro Mark Kaz» П-3 01.03.2033г.	1,0	Кукуруза	Виды осота, ромашки, горца	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры	-1
	0,3-0,5	Свекла сахарная	Виды осота, ромашки, горца	Опрыскивание посевов в фазе 1-3 пар настоящих листьев культуры	-1
	0,1-0,3	Лен- долгунец	Виды осота	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» культуры при фазе розетки у сорняков	-1
	0,2-0,5	Капуста белокочанная	Виды осота, ромашки, горца	Опрыскивание растений после высадки рассады	-1
	0,3-0,4	Рапс яровой и озимый (семенные посевы)	Виды осота, ромашки, горца	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры	-1
Хакер 300, в.р. (300 г/л.) АО Фирма «Август» П-3 04.04.2033	0,3-0,5	Свекла сахарная	Виды осота, ромашки, горца	Опрыскивание посевов в фазе 1-5 пар настоящих листьев культуры. Расход рабочей жидкости – 50-300 л/га (в зависимости от типа распылителей).	60 (1)
	0,1+0,2	Свекла сахарная	Виды осота, ромашки, горца	Опрыскивание посевов, начиная с фазы «вилочки» культуры, по сорным растениям первой и второй волны в фазе семядолей. Расход рабочей жидкости – 50-300 л/га (в зависимости от типа распылителей).	60 (2)
	0,1-0,3	Лен масличный	Виды осота, ромашки, горца, бодяка	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» культуры и фазе розетки многолетних корнеотпрысковых сорняков. Расход рабочей жидкости – 50-300 л/га (в зависимости от типа распылителей).	60 (1)

	0,3-0,4	Рапс яровой	Виды осота, ромашки, горца	Опрыскивание посевов в фазе розетки многолетних двудольных сорняков. Расход рабочей жидкости – 50- 300 л/га	60 (1)
	0,15-0,5	Ячмень яровой	Виды осота, ромашки, горца, полыни	Опрыскивание посевов в фазе кушения – до выхода в трубку культуры. Расход рабочей жидкости – 50- 300 л/га	57 (1)
	0,15-0,5	Пшеница яровая	Виды осота, ромашки, горца, полыни	Опрыскивание посевов в фазе кушения – до выхода в трубку культуры. Расход рабочей жидкости – 50- 300 л/га	57 (1)
ШАНСТРЕЛ 300, (300 г/л) ООО «Шанс» П-3 23.06.2031 г.	0,1-0,3	Лен- долгунец	Все виды ромашки, горца, осота, бодяка	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» культуры и в фазе розетки у сорняков. Расход рабочей жидкости 200- 300 л/га.	-1
	0,3-0,4	Рапс яровой (в том числе семенные посевы)	Все виды ромашки, горца, осота, бодяка	Опрыскивание посевов в фазе 3-4 настоящих листьев рапса ярового и до появления цветочных бутонов у рапса озимого. Расход рабочей жидкости– 200-300 л/га.	60 (1)
	0,3-0,5	Свекла сахарная,кормовая	Все виды ромашки, горца, осота, бодяка	Опрыскивание посевов в фазе 1-3 пар настоящих листьев культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га.	60 (1)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 600 г/л					
Сэнтиум 600, в.р. (600 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-2 21.06.2034 г.	0,1 – 0,2	Лен масличный	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу «елочки» культуры	-(1)
	0,1 – 0,2	Рапс	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание в фазе 3-4 настоящих листьев рапса ярового	-(1)
	0,1 – 0,2	Горчица	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание в фазе 3-4 настоящих листьев горчицы	-(1)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 750 г/кг					
ВИРТУОЗ, в.д.г. (750 г/кг) ТОО «Астана-Нан» П-3 21.02.2035 г.	0,12-0,16	Рапс	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-4 настоящих листьев культуры	-1
	0,12-0,16	Горчица	Однолетние и многолетние двудольные, включая осоты	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста	(1)
	0,12-0,16	Лен масличный	Однолетние и многолетние двудольные, включая осоты	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста	(1)
	0,12-0,16	Сахарная свекла	Однолетние и многолетние двудольные, включая осоты	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста	(1)
	0,12	Лук	Однолетние и многолетние двудольные сорняки, включая осоты	Опрыскивание посевов в фазе 3-4 настоящих листьев до бутонизации культуры	(1)
ГЕРБАСТАР, в.д.г. (750 г/кг) ТОО «QADAM Group (КАДАМ Групп)» П-3 01.04.2034 г.	0,14	Лен	Однолетние и многолетние двудольные сорняки (виды ромашки, осота, горца)	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» культуры. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га.	- (1)
	0,12-0,16	Рапс	Однолетние и многолетние двудольные сорняки (виды ромашки, осота, горца)	Опрыскивание посевов в фазе 3-4 листьев до бутонизации культуры. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	- (1)
	0,2	Сахарная свекла	Однолетние и многолетние двудольные, включая осоты	Опрыскивание посевов в фазе 1-3 пар настоящих листьев культуры	- (1)
Катана, в.д.г. (750 г/кг) ТОО «HARVEST Ltd (Харвест Ltd)» П-3 10.03.2036 г.	0,12	Лен	Однолетние и многолетние двудольные сорняки, включая осоты	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» культуры и в фазе розетки многолетних корнеотпрысковых сорняков. Расход рабочей жидкости 200–300 л/га.	60 (1)
	0,12–0,16	Рапс	Однолетние и многолетние двудольные сорняки, включая осоты	Опрыскивание посевов в фазе 3 –4 листьев культуры.	60 (1)
	0,12 -0,16	Сахарная свекла	Однолетние и многолетние двудольные сорняки, включая осоты	Опрыскивание посевов в фазе 1-3 пар настоящих листьев культуры.	60 (1)
КЛОПИРАЛИД, в.д.г. (750 г/кг) ООО «Форвард», Россия П-3 20.07.2027 г.	0,12	Рапс яровой	Однолетние и некоторые многолетние сорняки (виды ромашки, горца, осота, бодяка)	Опрыскивание посевов в фазе 3-4 листьев культура	-1
	0,12	Лен	Однолетние и некоторые многолетние сорняки (виды ромашки, горца, осота, бодяка)	Опрыскивание посевов, начиная с фазы «елочки» культуры и в фазе розетки многолетних корнеотпрысковых сорняков	-1
КОРРЕКТОР, в.д.г. (750 г/кг) ТОО «Айбад 2015» П-3 11.06.2031 г.	0,12	Лен	Виды ромашки, горца, бодяка, осота и латука	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» культуры и в фазе розетки листьев многолетних корнеотпрысковых растений. Расход рабочей жидкости 200-30 л/га	-1
ЛОНТРЕЛ ГРАНД 75, в.д.г. (750 г/кг) ТОО «Кортева Агрисаенс Казахстан» П-4 11.02.2030 г.	0,12-0,16	Рапс	Однолетние и многолетние двудольные, включая осоты	Опрыскивание посевов в фазе 3-4 настоящих листьев до бутонизации культуры	-1
	0,12-0,16	Свекла сахарная	Однолетние и многолетние двудольные, включая осоты	Опрыскивание посевов в фазе 1-3 пар настоящих листьев культуры	-1
	0,12	Лук	Однолетние и многолетние двудольные, включая осоты	Опрыскивание посевов в фазе 2 настоящих листьев культуры	-1
РАЛИД ЭКСТРА, в.г. (750 г/кг) ШАНДОНГ ВЕЙФАНГ РЕЙНБОУ КЕМИКАЛ КО., ЛТД, П-3 18.09.2027 г.	0,12-0,16	Рапс	Однолетние и многолетние двудольные сорняки, в т.ч. осоты	Опрыскивание в фазе3-5 настоящих листьев до начала бутонизации	-1
17.10.2032 г.	0,12	Рапс	Однолетние и многолетние двудольные сорняки (виды осота, бодяка, ромашки, горца)	Опрыскивание посевов весной, начиная с фазы 3 -4 листьев и до появления цветочных бутонов у культуры	- (1)

	0,14	Лен	Однолетние и многолетние двудольные сорняки, включая осоты	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» культуры, при фазе розетки у сорняков	- (1)
	0,12-0,16	Свекла сахарная	Однолетние и многолетние двудольные сорняки (виды ромашки, горца, осота, бодяка)	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры	- (1)
САМУРАЙ Супер, в.д.г. (750 г/кг) ARCUS INVEST HOLDING B.V П-3 17.02.2030 г.	0,12-0,16	Рапс	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-4 листьев культуры	60(1)
	0,14	Лен	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» культуры	-(1)
	0,4	Кукуруза	Виды осота, ромашки, горца	Опрыскивание посевов в фазе 3-4 листьев культуры	-(1)
СОНХУС, в.д.г. (750 г/кг) Лейтон Агро Европа Кфт.Венгрия П-3 14.03.2027 г.	0,4	Кукуруза	Виды осота, ромашки, горца	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры	-(1)
	0,12	Лен масличный	Однолетние и многолетние двудольные сорняки (виды ромашки, осота, горца, бодяка)	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» культуры и в фазе розетки многолетних корнеотпрысковых сорняков. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га.	- (1)
	0,12-0,16	Рапс яровой	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-4 листьев культуры	-(1)
СПИРИТ, в.д.г. (750 г/кг) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-3 30.07.2031 г.	0,12-0,16	Рапс	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-4 листьев культуры	-1
	0,14	Лен	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» культуры	-1
	0,12-0,16	Горчица	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-4 настоящих листьев до бутонизации культуры	-(1)
СТРАТЕГО, в.д.г. (750 г/кг) Юнайтед Агри-Кемикал Компани ГмбХ, Швейцария П-3 12.04.2031 г.	0,4	Кукуруза	Виды осота, ромашки, горца	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры	-1
	0,12-0,16	Рапс яровой	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-4 листьев культуры	-1
ТРИЛОН 750, в.д.г. (750 г/кг) «ДВА Агро ГмбХ», Германия П-3 13.01.2031 г.	0,1-0,2	Пшеница яровая	Однолетние и многолетние двудольные сорняки, включая виды осота, ромашки, горца	Опрыскивание в фазу кущения до выхода в трубку	-1
	0,1-0,15	Лен	Однолетние и многолетние двудольные сорняки, включая виды осота, ромашки, горца	Опрыскивание в фазу «елочки» культуры, при фазе «розетки» у сорняков	-1
	0,15-0,20	Капуста	Однолетние и многолетние двудольные сорняки, включая виды осота, ромашка, горца	Опрыскивание после высадки рассады	-1
17.02.2030 г.	0,15-0,2	Рапс	Однолетние и многолетние двудольные, включая виды осота, ромашки, горца	Опрыскивание посевов в фазе 4-6 настоящих листьев у культуры. Расход рабочей жидкости 200-300л/га	-1
	0,15-0,2	Свекла	Однолетние и многолетние двудольные, включая виды осота, ромашки, горца	Опрыскивание посевов в фазе 1-3 пар настоящих листьев у культуры.	-1
	0,2-0,5	Кукуруза	Однолетние и многолетние двудольные, включая виды осота, ромашки, горца	Опрыскивание растений в фазу 3-5 листьев кукурузы	-1
ХАКЕР, в.р.г. (750 г/кг) АО Фирма «Август» П-3 28.02.2034 г.	0,08-0,12	Лен	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу «елочки» и в фазу розетки у многолетних двудольных сорняков. Расход рабочей жидкости 50 – 300 л/га.	-(1)
	0,12-0,16	Рапс	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу 3-4 настоящих листьев культуры. Расход рабочей жидкости 50 – 300 л/га.	-(1)
	0,12-0,20	Капуста	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посадок после высадки рассады в фазу розетки бодяков и осотов. Расход рабочей жидкости 50 – 300 л/га.	-(1)
29.01.2029 г.	0,12-0,16	Свекла сахарная	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 1-3 пар настоящих листьев культуры. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	60 (1)
22.04.2030 г.	0,12-0,16	Газонные травы	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков через 1-2 дня после первого укоса. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	-(1)
	0,06-0,15	Пшеница яровая, ячмень яровой	Виды осота, ромашки, горца, польни	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	60 (1)
14.06.2031 г.	0,12	Лук	Однолетние и многолетние двудольные сорняки, включая осоты	Опрыскивание посевов в фазе 2 настоящих листьев культуры. Расход рабочей жидкости 50-300 л/га	60 (1)
НАЙБАРО в.р.г. (750 г/кг) LIER CHEMICALCO., LTD П-3 06.03.2034 г.	0,12-0,16	Рапс	Однолетние и многолетние двудольные, включая осоты	Опрыскивание посевов в фазе 3-4 настоящих листьев до бутонизации культуры	60(1)
	0,12-0,16	Сахарная свекла	Однолетние и многолетние двудольные, включая осоты	Опрыскивание посевов в фазе 1-3 пар настоящих листьев культуры	60(1)
	0,12-0,2	Горчица	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание в момент активного роста сорняков: 2 - 10 листьев у однолетних и 10-15 см («розетка») – у многолетних корнеотпрысковых сорняков.	60(1)
	0,06-0,12	Пшеница яровая и озимая	виды ромашки, горца, бодяка, осота, латука	Опрыскивание посевов в фазе кущения – до выхода в трубку культуры. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	60(1)

Клопиралид (2-этилгексилловый эфир)

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 450 г/л					
ЭФИЛОН к.э. (450 г/л)	0,1-0,3	Лен	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание в фазе «елочки» культуры	-1

ООО «АХК-АГРО» П-3 27.09.2032 г.	0,1-0,3	Рапс	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-4 листьев культуры	-1
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 500 г/л					
ЭЛЬФ, к.э. (500 г/л) ООО «Форвард», Россия П-3 28.01.2029 г.	0,1-0,4	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Однолетние и многолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и до выхода в трубку	-1
	0,1	Рапс яровой	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-4 листьев культуры	
	0,4	Рапс яровой	Многолетние двудольные сорняки		
	0,1-0,4	Свекла сахарная	Однолетние и многолетние двудольные сорняки		

Клопиралид + амидосульфурон

СПИРИТ ФОРТЕ, в.д.г. (500 г/кг + 250 г/кг) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-3 26.03.2029 г.	0,03-0,05	Лен масличный	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» культуры. Расход рабочей жидкости – 300л/га	-1
--	-----------	---------------	--	--	----

Клопиралид (2-этилгексилловый эфир) + имазамокс

ИЛИОН, м.д. (90 г/л + 40 г/л) АО «Щелково Агрохим» П-3 13.04.2031 г.	0,8-1,2	Рапс яровой, устойчивый к имидазолинонам	Однолетние злаковые, однолетние и многолетние двудольные	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (2-4 листа) и 2-6 листьев культуры (до фазы вытягивания стеблей). Ограничения по севообороту. В год применения можно высевать пшеницу озимую, рапс озимый (устойчивый к имидазолинонам); на следующий год – яровые и озимые пшеницу, ячмень, рожь, тритикале; кукурузу, сою, горох, бобы, сorgho, люцерну, люпин, рапс и подсолнечник (устойчивые к имидазолинонам); через два года – овес, подсолнечник, (традиционные сорта и гибриды) через три года – любые культуры без ограничений, включая традиционные сорта и гибриды рапса; свеклу сахарную	-1
---	---------	--	--	---	----

Клопиралид + амидосульфурон + метсульфурон-метил

СЕЛЕНИТ ПРО, в.д.г. (500 г/кг + 200 г/кг + 50 г/кг) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-4 23.02.2032 г.	0,050	Лен масличный	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу «елочки» культуры	-1
	0,050	Пшеница яровая	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – до второго междоузлия культуры	-1
	0,050	Ячмень яровой	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – до второго междоузлия культуры	-1

Клопиралид + метсульфурон-метил

СЕЛЕНИТ ФОРТЕ, в.д.г. (710 г/кг + 40 г/кг) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-4 17.05.2034 г.	0,05-0,08	Лен масличный	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу «елочки» культуры	-(1)
	0,05-0,08	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры до выхода в трубку	-(1)

Клопиралид (2-этилгексилловый эфир)+ пиклорам + аминопиралид

Репер Трио м.д. (267 г/л+ 80 г/л+17 г/л) АО «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ» П-3 20.02.2034	0,2-0,3	Рапс	Однолетние и многолетние двудольные, в т.ч . подмаренник цепкий, виды мари, ромашки, горцев, щирицы, гречишка вьюнковая, виды бодяка и осота.	Опрыскивание вегетирующих растений с фазы 3-6 настоящих листьев до появления цветочных бутонов у рапса. Соблюдать ограничения при пересеве.	60(1)
--	---------	------	--	--	-------

Клопиралид + пиклорам

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 267 г/л + 67 г/л					
КРУЦИФЕР, в.р. (267 г/л + 67 г/л) ООО «Агро Эксперт Груп», Россия П-3 13.07.2031 г.	0,3-0,35	Рапс	Однолетние и многолетние двудольные сорняки (в т.ч. подмаренник, цепкий, вьюнок полевой, виды ромашки, виды ромашки и горца, бодяки, осоты и др)	Опрыскивание посевов начиная с фазы 3-6 листьев культуры до появления цветочных бутонов у рапса. Расход рабочей жидкости -200-300 л/га	-1
ЛЕРАШАНС, в.р. (267 г/л + 67 г/л) ООО «Шанс» П-3 15.03.2029 г.	0,3-0,35	Рапс яровой	Однолетние и многолетние двудольные сорняки, в т.ч. подмаренник цепкий, виды ромашки, горца, щирицы, мари, гречишка вьюнковая, виды бодяка и осота	Опрыскивание вегетирующих растений весной с фазы 3-6 настоящих листьев до появления цветочных бутонов у рапса. Расход рабочей жидкости 200-300л/га	60(1)
Мегалит, в.р. (267 г/л + 67 г/л) ООО «Интер Групп» П-3 07.11.2034 г.	0,3-0,35	Рапс яровой	Однолетние и многолетние двудольные сорняки, в том числе подмаренник цепкий, виды ромашки, горца, щирицы, мари, гречишка вьюнковая, виды бодяка и осота	Опрыскивание вегетирующих растений весной с фазы 3-6 настоящих листьев до появления цветочных бутонов у рапса. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60(1)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 300 г/л +75 г/л					
ГАЛИОН, в.р. (300 г/л +75 г/л) АО Фирма «Август» П-3 03.06.2031	0,25-0,3	Рапс яровой	Однолетние и многолетние двудольные сорняки в том числе подмаренник цепкий, виды ромашки, горца щирицы, мари, гречишка вьюнковая, виды бодяка и осоты	Опрыскивание вегетирующих растений весной с фазы 3-6 настоящих листьев до появления цветочных бутонов у рапса. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	60 (1)
	0,25-0,3	Капуста белокочанная	Однолетние и многолетние двудольные сорняки в том числе подмаренник цепкий, виды ромашки, горца щирицы, мари, гречишка вьюнковая, виды бодяка и осоты	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-4 листа) сорняков независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	60 (1)

Клопиралид (2-этилгексилэвый эфир) + флуораксипир

РЕПЕР, к.к.р. (100 г/л + 15 г/л) АО «Щелково Агрохим» П-3 04.11.2035 г.	0,7-1,0	Рапс	Однолетние и многолетние двудольные сорняки, в т.ч. осот, бодяк, ромашка, горцы	Опрыскивание посевов, начиная с фазы 3-6 настоящих листьев до появления цветочных бутонов у рапса	50 (1)
	0,8-1,0	Горчица	Однолетние и многолетние двудольные, в т.ч. подмаренник цепкий, гречишка выюнная, виды ромашки, горца, щирицы, мари, бодяка и осота	Опрыскивание вегетирующих растений с фазы 3-6 настоящих листьев до фазы бутонизации	50 (1)

Кломазон

Концентрация д.в. (+/- 5%) ~ 480 г/л					
Алгоритм, к.э. (480 г/л) ТОО «ФМРус» П-1 03.02.2035 г.	0,7-1,0	Соя	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры или посевов в фазе 3-х настоящих листьев культуры. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	60(1)
	0,2	Картофель	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	60(1)
	0,2	Рапс яровой	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	60(1)
ТРЕЙСЕР, к.э. (480 г/л) АО Фирма «Август» П-3 13.03.2035 г.	0,2	Свёкла сахарная	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости 100 -300 л/га	60 (1)
Ковэр, к.э. (480 г/л) ФОРВАРД П-3 04.02.2036 г.	0,2-0,5	Горох (при выращивании на зерно)	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание до появления всходов культуры	- (1)
	0,18-0,2	Морковь (кроме для пучкового товара), свекла сахарная, рапс яровой	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание до появления всходов культуры	- (1)
	0,7-1,0	Соя	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 1-2 ветвлений (тройчатый лист) культуры и в фазе 3-5 листьев сорняков	- (1)
	0,25-0,5	Картофель	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание до появления всходов культуры	- (1)
	0,18-0,2	Рапс яровой	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание до появления всходов культуры	- (1)
	0,18-0,2	Свекла сахарная	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание до появления всходов культуры	- (1)

Мезосульфурон + йодосульфурон-метил-натрий + мефенпир-диэтил (антисорняк)

ЛАЙНЕР ЭКСТРА, в.г. (30 г/кг + 6 г/кг + 90 г/кг) ШАНДОНГ ВЕЙФАНГ РЕЙНБОУ КЕМИКАЛ КО., ЛТД., П-3 23.07.2028 г.	0,2-0,4 + ПАВ 0,6 л/га	Пшеница яровая	Однолетние злаковые и двудольные, многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам в фазу кущения культуры	-1
--	---------------------------	----------------	--	---	----

Мезосульфурон-метил + флуметсулам + флорасулам + мефенпир-диэтил (антисорняк)

Буллит, м.д. (30 г/л + 17 г/л + 12 г/л + 90 г/л) АО «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ» П-3 02.03.2036 г.	0,2-0,4	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние и некоторые многолетние двудольные и некоторые однолетние злаковые, в т.ч. овсюг, мятлик, лисохвост, метлица	Опрыскивание посевов от фазы кущения до фазы формирования второго междоузлия культуры (включительно) и ранние фазы роста сорняков	60(1)
---	---------	-------------------------------	---	---	-------

Мезотрион

ЭГИДА, с.к. (480 г/л) АО Фирма «Август» П-3 22.04.2030 г.	0,15-0,3	Кукуруза	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-7 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков (2-6 листьев у однолетних и при высоте 10-20 см у многолетних). Расход рабочей жидкости 100-300 л/га	60 (1)
04.07.2032 г.	0,2-0,3	Лен масличный	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры. Расход рабочей жидкости 100-300 л/га	-(1)

Мезотрион + никосульфурон

Концентрация д.в. (+/- 5%) ~ 75 г/л +30 г/л					
БЕСТУТАКС с.к. (75 г/л + 30 г/л) AGROBEST GRUP, Турция П-3 26.10.2032 г.	1,0-2,0	Кукуруза	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков (2-6 листьев однолетних сорняков и при высоте 10-20 см многолетних)	-(1)
ГАВАНЬ ПЛЮС, м.д. (75 г/л + 30 г/л) ШАНДОНГ ВЕЙФАНГ РЕЙНБОУ КЕМИКАЛ КО., ЛТД., П-3 03.05.2029 г.	1,0-2,0	Кукуруза	Однолетние и многолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-6 листьев культуры в ранние фазы роста сорняков (2-6 листьев у однолетних и при высоте 10-20 см у многолетних)	-1
ЭЛЮМИС 105, м.д. (75 г/л + 30 г/л) Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария П-3 10.02.2036 г.	1,0-2,0	Кукуруза	Однолетние и многолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков (2-6 листьев у однолетних и при высоте 10-20 см у многолетних)	-1
МАХАОН МД, м.д. (76 г/л + 31 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-3	1,5	Кукуруза	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание в фазе 3-8 листьев кукурузы и ранние фазы роста сорняков (2-6 листьев у однолетних и при высоте 10-20 см у многолетних сорняков). При	-1

01.07.2034 г.				необходимости пересева в год применения можно высевать только кукурузу	
МАЙСЕР ДУО, м.д. (75 г/л + 30 г/л) SHANDONG BINNONG TECHNOLOGY CO., LTD. П-3 03.03.2036 г.	1,0-2,0	Кукуруза	Однолетние и многолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-6 листьев культуры и в ранние фазы роста сорняков (2-6 листьев у однолетних и при высоте 10-20 см у многолетних)	-1
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 75 г/л +40 г/л					
Маис дуо, м.д. (75 г/л + 40 г/л) ТОО «Мивоки» П-3 19.12.2035 г.	1,5-2,0	Кукуруза	Однолетние и многолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков (2-6 листьев у однолетних и при высоте 20 см у многолетних). Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	-1
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 100 г/л +40 г/л					
ПИЛАРЛЮКС, м.д. (100 г/л + 40 г/л) Пиларквим (Шанхай) Ко., Лтд. П-3 06.01.2036 г.	1,0-1,5	Кукуруза	Однолетние и многолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков (2-6 листьев у однолетних и при высоте 10-20 см у многолетних)	60 (1)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 230 г/кг+570 г/кг					
МАХАОН, в.д.г. (570 г/кг + 230 г/кг) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-3 26.01.2023 г.	0,15-0,25 + ПАВ Пикассо 50 мл/га	Кукуруза	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание в фазе 3-6 листьев кукурузы и ранние фазы роста сорняков (2-6 листьев у однолетних и при высоте 10-20 см у многолетних сорняков). При необходимости пересева в год применения можно высевать только кукурузу	-1

Мезотрион + никосульфурон+пиклорам

ФУЛТАЙМ, м.д. (75 г/л + 37,5 г/л + 17,5) АО Фирма «Август» П-3 28.02.2034 г.	1,0-2,0	Кукуруза	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазу от 3 до 6 листьев культуры и ранние фазы роста (2-6 листьев однолетних, в фазу розетки многолетних двудольных и при высоте 10-20 см у многолетних злаковых) сорных растений. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га.	60 (1)
---	---------	----------	--	--	--------

Мезотрион + никосульфурон+тифенсульфурон-метил

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 150 г/л + 60 г/л + 11,25 г/л					
СУПЕРКОРН, м.д. (150 г/л + 60 г/л + 11,25 г/л) ООО «Агро Эксперт Групп», Россия П-3 02.07.2029 г.	0,5-1,0	Кукуруза	Однолетние и многолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков (2-6 листьев у однолетних и при высоте 10-20 см у многолетних сорняков). Расход рабочей жидкости – 100-300 л/га	-1
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 537 г/кг+ 167 г/кг + 43 г/кг					
МАХАОН ФОРТЕ, в.д.г. (537 г/кг+ 167 г/кг + 43 г/кг) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-3 20.02.2036 г.	0,15 – 0,25 + ПАВ Пикассо 50 мл/га	Кукуруза	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание в фазе 3 – 6 листьев кукурузы и ранние фазы роста сорняков (2-6 листьев у однолетних и при высоте 10-20 см у многолетних сорняков). При необходимости пересева в год применения можно высевать только кукурузу.	-1

Метазахлор + имазамокс

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 375 г/л + 25 г/л					
ДИОНИС, к.с. (375 г/л + 25 г/л) ТОО «Астана-Нан» П-3 15.06.2027 г.	1,0-1,2 + ПАВ 1,0-1,2 л/га	Рапс яровой (гибриды и сорта системы CLEARFIE LD, устойчивые к данному гербициду)	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 настоящих листьев культуры в ранние фазы роста сорняков. На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы, овощей и сортов гибридов ярового и озимого рапса, не устойчивых к данному гербициду (безопасный интервал между применением гербицида и посевом свеклы, неустойчивых к гербициду сортов и гибридов рапса и овощей – 16 месяцев)	-1
НОПАСАРАН, 40% к.с. (375 г/л + 25 г/л) БАСФ Агрокемикал Продактс Б.В., Пуэрто Рико П-4 11.02.2029 г.	1,0-1,2 + ПАВ ДАШ 1,0-1,2 л/га	Рапс яровой (гибриды и сорта, устойчивые к данному гербициду)	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев рапса в ранние фазы роста сорняков. На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы, овощей и сортов и гибридов ярового и озимого рапса, не устойчивых к данному гербициду (безопасный интервал между применением гербицида и посевом свеклы, неустойчивых к гербициду сортов и гибридов рапса и овощей – 16 месяцев)	-1
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 450 г/л + 30 г/л					
ПОЛЯРИС, к.с. (450 г/л + 30 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-3 05.12.2033	0,8 – 1,0	Сорта и гибриды рапса, устойчивые к имидазолинонам	Однолетние и многолетние двудольные сорняки, однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев рапса в ранние фазы роста сорняков. На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы, овощей и сортов и гибридов ярового и озимого рапса, не устойчивых к данному гербициду (безопасный интервал между применением гербицида и посевом свеклы, неустойчивых к гербициду сортов и гибридов рапса и овощей – 16 месяцев)	60 (1)

Метамитрон

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 700 г/л					
МИТРОН, к.с. (700 г/л) АО «Щелково Агрохим» П-3 14.04.2031 г.	1,5-2,0	Свекла сахарная	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов по всходам сорняков (в фазу семядолей у двудольных и первого листа у злаковых) с последующей обработкой через 8-14 дней при повторном отрастании сорняков	2
	1,5			Опрыскивание посевов по всходам сорняков в смеси с 1,5 л/га гербицида Батарен Экспресс АМ или его аналогами (в фазу семядолей у двудольных и первого листа у злаковых) с последующей обработкой через 8-14 дней при повторном отрастании сорняков	
	1,5-2,0	Чечевица		Опрыскивание почвы до всходов культуры Опрыскивание посевов по вегетации	
ПИЛОТ, в.с.к. (700 г/л) АО Фирма «Август» П-3 11.02.2029 г.	5,0-6,0	Свекла сахарная	Однолетние двудольные	Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости 200-300л/га	-1
	1,5-2,0	Свекла сахарная	Однолетние двудольные	Двукратное опрыскивание посевов: 1-е в стадии семядольных листьев сорняков; сорняки 2-е через 8-14 дней при повторном отрастании сорняков. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	-2

Металахлор

АКЦЕНТ ПРИМА 96%, к.э. (960 г/л) ТОО «Агрохимия» П-3 17.02.2030 г.	2,4-2,6	Подсолнечник	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание до посева или до всходов культуры	-1
	1,9-2,1	Кукуруза	Однолетние злаковые и некоторые двудольные	Опрыскивание до посева или до всходов культуры	-1

Метсульфурон-метил

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 600 г/кг					
АДАЛТ, в.д.г. (600 г/кг) ТОО «Бартонс Кемикал ГмбХ» П-3 17.02.2030 г.	0,008-0,01	Пшеница и ячмень яровые, пшеница озимая	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – до второго междоузлия культуры. На следующий год можно высевать только зерновые колосовые культуры	-1
АРБАЛЕТ 60%, с.п. (600 г/кг) Лейтон Агрио Европа КФТ Венгрия П-3 24.02.2036 г.	0,008-0,01	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – до второго междоузлия культуры. На следующий год можно высевать только зерновые колосовые культуры	60(1)
ВУЛКАН, в.д.г. (600 г/кг) Моер Кемсайенс Ко, Китай П-3 26.11.2030 г.	0,008-0,01	Пшеница и ячмень яровые, пшеница озимая	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – до второго междоузлия культуры. На следующий год можно высевать только зерновые колосовые культуры	-1
ГРЕЙЗ 60%, в.д.г. (600 г/кг) ТОО «Агро Глобал» П-3 01.11.2026 г.	0,008-0,01	Пшеница яровая	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – до второго междоузлия культуры. На следующий год можно высевать только зерновые колосовые культуры	-1
ЗИНГЕР, с.п. (600 г/кг) АО «Щелково Агрохим» П-3 10.02.2035 г.	0,01	Пшеница яровая	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста однолетних сорняков (2-4 листа) и многолетних в фазе розетки, начиная с фазы 2 листьев до конца кушения культуры. Соблюдать ограничения по севообороту. При пересеве обработанной площади можно сеять только пшеницу и ячмень. На следующий год можно сеять злаковые культуры, картофель, рапс, лен. Не следует сеять свеклу, кукурузу, гречиху, подсолнечник и овощные.	-1
19.03.2028 г.	0,008 -0,010	Лен	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные	Однолетние посевы в фазу «ёлочки» при высоте культуры 3-10 см и ранние фазы роста сорняков. Соблюдать ограничения по севообороту. При пересеве на обработанной площади можно сеять только пшеницу и ячмень. На следующий год можно сеять злаковые культуры, картофель, рапс, лен. Не следует сеять свеклу, кукурузу, гречиху, подсолнечник и овощные	-1
	0,008 -0,010	Ячмень	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2, 4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста однолетних двудольных сорняков (2-4 листа) и многолетних в фазу розетки, начиная с фазы 2 листьев и до конца кушения зерновых. Соблюдать ограничения по севообороту. При необходимости пересева обработанной площади можно сеять только пшеницу и ячмень. На следующий год можно сеять злаковые культуры, картофель, рапс, лён. Не следует сеять свеклу, кукурузу, гречиху, подсолнечник и овощные	-(1)

КАНЦЛЕР, в.д.г. (600 г/кг) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-3 02.08.2031 г.	0,008-0,01	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – до второго междоузлия культуры. На следующий год можно высевать только зерновые-колосовые культуры	-1
ЛАЗЕР 60, с.п. (600 г/кг) ООО Резерв, Россия П-3 11.07.2027 г.	0,008-0,01	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х и некоторые многолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – до второго междоузлия культуры. На следующий год можно высевать только зерновые колосовые культуры	-1
ЛЕОПАРД, в.д.г. (600 г/кг) ТОО «Agro Mark Kaz» П-3 06.01.2031 г.	0,010	Пшеница и ячмень яровые, пшеница озимая	Однолетние и многолетние двудольные сорняки, включая осоты	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – до второго междоузлия культуры. На следующий год можно высевать только зерновые колосовые культуры	-1
ЛИДЕР, с.п. (600 г/кг) ООО «Агро Эксперт Групп», Россия П-3 24.01.2027 г.	0,010	Пшеница яровая	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные, в т. ч. осот, бодяк и др.	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – до второго междоузлия культуры. На следующий год можно высевать только зерновые колосовые культуры. Расход рабочей жидкости- 200 л/га.	-1
	0,010	Ячмень яровой	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные, в т. ч. Осот, бодяк и др.	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – до второго междоузлия культуры. На следующий год можно высевать только зерновые колосовые культуры. Расход рабочей жидкости- 200 л/га	-1
	0,010	Пшеница озимая	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные, в т. Ч. Осот, бодяк и др.	Опрыскивание посевов весной в фазе 2-3 листьев – до второго междоузлия культуры. На следующий год можно высевать только зерновые колосовые культуры. Расход рабочей жидкости- 200 л/га.	-1
LERO в.д.г (600 г/кг) ТОО «Farm Agrochemical Products» П-3 27.05.2034 г.	0,008-0,01 + ПАВ	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние двудольные, в т.ч устойчивые к 2,4Д и 2М-4Х и некоторые многолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев-до второго междоузлия культуры. На следующий год можно высевать только зерновые колосовые культуры.	-(1)
МАГНУМ, в.д.г. (600 г/кг) АО Фирма «Август» П-3 27.12.2032 г.	0,010	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние и некоторые многолетние двудольные, в т.ч. осот, бодяк и другие	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста однолетних сорняков (2-4 листа) и многолетних в фазе розетки, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения культуры. Соблюдать ограничения по севообороту. При пересеве обработанной площади можно сеять только пшеницу и ячмень. На следующий год можно сеять злаковые культуры, картофель, рапс, лен. Не следует сеять свеклу, кукурузу, гречиху, подсолнечник и овощные.Расход рабочей жидкости 50-300 л/га	-1
	0,010	Пшеница озимая	Однолетние и некоторые многолетние двудольные, в т.ч. осот, бодяк и другие	Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста однолетних сорняков (2-4 листа) и фазе розетки многолетних сорняков. Соблюдать ограничения по севообороту. Расход рабочей жидкости 50-300 л/га	-1
10.09.2034 г.	0,008-0,01	Лен масличный	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к МЦПА	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» при высоте культуры 3-10 см. Расход рабочей жидкости 50-300 л/га.	-1
МЕТСУМЕТ, в.д.г. (600 г/кг) ТОО «Астана-Нан» П-3 20.12.2031 г.	0,008-0,01	Пшеница яровая Пшеница озимая	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х и некоторые многолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – до второго междоузлия культуры. На следующий год можно высевать только зерновые колосовые культуры	-1
Метафор, в.д.г. (600 г/кг) ООО «Интер Групп» П-1 20.03.2035 г.	0,008	Пшеница яровая, ячмень яровой, овес	Однолетние, в т.ч . устойчивые к 2, 4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорняки.	Опрыскивание посевов в фазе кущения зерновых и ранние фазы роста сорняков в баковой смеси с клопиралидом 45 г/га по д.в. Озимые обрабатывают весной. Соблюдать ограничения по севообороту. При пересеве обработанных площадей можно сеять только яровые зерновые. На следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу и овощи; подсолнечник и гречиху только после глубокой вспашки. Нельзя высевать подсолнечник и гречиху на следующий год, если рН почвы выше 7,5 или если была продолжительная засуха в период от применения препарата до посева этих культур. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га.	60(1)
	0,008-0,01	Пшеница яровая, ячмень яровой, овес	Однолетние, в т.ч . устойчивые к 2, 4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорняки.	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста однолетних (2-4 листа) и фазу розетки многолетних двудольных сорняков (начиная с фазы 2 листьев – до конца кущения культуры). Соблюдать ограничения по севообороту. При необходимости пересева обработанной площади можно сеять только яровые зерновые. На следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу, овощи, гречиху и подсолнечник – только после глубокой вспашки. Нельзя высевать подсолнечник и гречиху, если рН почвы выше 7,5 или если была продолжительная засуха в период от применения препарата до посева этих культур. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га.	60(1)

МЕТУРОН, в.д.г. (600 г/кг) ООО «Форвард», Россия П-3 28.01.2029 г.	0,008-0,01	Пшеница яровая и озимая	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4- Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – до второго междоузлия культуры. На следующий год можно высевать только зерновые колосовые культуры	-1
МЕЦЦО 60%, в.д.г. (600 г/кг) Нуфарм, Австрия П-3 26.02.2028 г.	0,008-0,01	Пшеница яровая и озимая	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – до второго междоузлия культуры. На следующий год можно высевать только зерновые колосовые культуры	-1
ПРАЙМЕР, в.д.г. (600 г/кг) Юнайтед Агри-Кемикал Компани ГмбХ, Швейцария П-3 12.04.2031 г.	0,008-0,01	Пшеница яровая	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – до второго междоузлия культуры. На следующий год можно высевать только зерновые колосовые культуры	-1
РОДАР 60, с.п. (600 г/кг) ТОО «Агрохимия» П-3 26.02.2030 г.	0,008-0,01	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – до второго междоузлия культуры. На следующий год можно высевать только зерновые колосовые культуры	-1
РОТЕР 60%, с.п. (600 г/кг) Стоктон Кемикал Корпорейшн, США П-3 11.02.2030 г.	0,008-0,01	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – до второго междоузлия культуры. На следующий год можно высевать только зерновые колосовые культуры	-1
СНАЙПЕР, в.д.г. (600 г/кг) ARCUS INVEST HOLDING B.V. П-3 24.01.2033 г.	0,008-0,01	Лен	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х и некоторые многолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазе «ёлочки» при высоте культуры 3- 10см и ранние фазы роста сорняков. Соблюдать ограничения по севообороту	- (1)
	0,008-0,01	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х и некоторые многолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – до второго междоузлия культуры. На следующий год высевать только зерновые колосовые культуры	- (1)
СТРАЖ, в.д.г. (600 г/кг) Агридиль Кфт П-3 05.03.2029 г.	0,008-0,01	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста однолетних (2-4 листа) и многолетних (фаза розетки) сорняков, начиная с фазы 2-3 листьев до конца кущения культуры. Следует соблюдать ограничения по севообороту	-1
	0,008-0,01	Овес, просо	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста однолетних (2-4 листа) и многолетних (фаза розетки) сорняков, начиная с фазы 2-3 листьев до конца кущения культуры. Следует соблюдать ограничения по севообороту	-1
	0,008-0,01	Лен масличный	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» при высоте культуры 3-10 см. Следует соблюдать ограничения по севообороту	-1
СУПЕРМЕТ ЭКСТРА, в.г. (600 г/кг) ШАНДОНГ ВЕЙФАНГ РЕЙНБОУ КЕМИКАЛ КО., ЛТД., П-3 25.05.2028 г.	0,008-0,01	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4- Д	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – до второго междоузлия культуры	-1
ХАЗНА 60%, в.д.г. (600 г/кг) Наньцзин Эссенс Файн- Кемикал Со., Лтд, Китай П-3 04.01.2034	0,008-0,01	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х и некоторые многолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – до второго междоузлия культуры. На следующий год высевать только зерновые колосовые культуры	-1

Метсульфурон-метил + трибенурон-метил

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 125 г/кг + 625 г/кг					
ФИНИТО ДУЭТ 750, в.д.г. (125 г/кг + 625 г/кг) DVA Agro GmbH, Германия П-3 25.01.2027 г.	0,01-0,015 + ПАВ Фаерланд 0,05 л/га	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4- Д, осоты	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – до выхода в трубку.	-1
ПЛУГГЕР, в.д.г. (125 г/кг + 625 г/кг) АО Фирма «Август» П-3 13.08.2035 г.	0,01-0,015 + ПАВ АДЬЮ, ж, 200 мл/га	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние, в. Т.ч. устойчивые к 2,4-Д виды, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости 50-300 л/га.	- (1)
	0,015 + ПАВ АДЬЮ, ж, 200 мл/га	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние, в. Т.ч. устойчивые к 2,4-Д виды, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе трубкования – флагового листа культуры. Расход рабочей жидкости 50-300 л/га.	- (1)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 391 г/кг + 261 г/кг					
АПАЧИ, в.д.г. (391 г/кг + 261 г/кг) Синтезия Кемп ГмбХ, Германия П-3 16.05.2035 г.	0,006-0,008 + ПАВ Тренд 200 мл/га	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние и многолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-д	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – до второго междоузлия культуры	-1
ГРАФ ПРЕМИУМ, в.д.г. (391 г/кг + 261 г/кг) ТОО «Агро Марк Каз» Казахстан П-3 21.04.2030 г.	0,006-0,008 + ПАВ Силат 25-50 мл/га	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние двудольные и некоторые многолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев- до фазы второго междоузлия культуры. На следующий год можно высевать только зерновые культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га.	-1

МАУЗЕР, в.д.г. (391 г/кг + 261 г/кг) ARCUS INVEST HOLDING B.V. П-3 28.10.2032 г.	0,006-0,008 + ПАВ 200 мл/га	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу 2-3 листьев культуры до второго междоузлия культуры	- (1)
ЭЛЛАЙ ЛАЙТ, в.д.г. (391 г/кг + 261 г/кг) ТОО «ЭфЭмСи Агро Казахстан», П-3 26.12.2026 г.	0,006-0,008+ Тренд 200 мл/га	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Однолетние двудольные, в т. ч. Устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – до второго междоузлия культуры.	-1
ЭЛЛАДА, в.д.г. (391 г/кг+261 г/кг) ООО «Шанс» П-3 10.01.2033 г.	0,006-0,008	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Однолетние двудольные, в т. ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2–3 листьев кукурузы и ранние фазы роста сорняков как самостоятельно, так и в баковой смеси ПАВ Шанс 90, Ж 200 мл/га. Озимые обрабатываются весной. При необходимости пересева высевать только яровые зерновые культуры. Расход рабочей жидкости 200–300 л/га	60 (1)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 391 г/кг + 359 г/кг					
ЭДВАНС 2.0, в.д.г. (391 г/кг + 359 г/кг) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия, П-3 23.02.2032 г.	0,006-0,008 + ПАВ Пикассо 50 мл/га	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – до выхода в трубку	-1
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 300 г/кг + 450 г/кг					
МАГNUM СУПЕР, в.д.г. (300 г/кг + 450 г/кг) АО Фирма «Август» П-3 21.02.2034 г.	0, 012	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние, в т.ч устойчивые к 2,4-Д виды, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе трубкования культуры (фаза 32-33 по Задоксу). Расход рабочей жидкости – 50-300 л/га.	- (1)
	0, 012+ ПАВ АДЪЮ, Ж, 200,0 мл/га	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние, в т.ч .устойчивые к 2,4-Д виды, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе трубкования культуры (фаза 32-33 по Задоксу). Расход рабочей жидкости – 50-300 л/га	- (1)
	0, 012	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние, в т.ч устойчивые к 2,4-Д виды, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кукурузы культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости 50- 300 л/га	- (1)
	0, 009 + ПАВ АДЪЮ, Ж, 200,0 мл/га	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние, в т.ч устойчивые к 2,4-Д виды, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кукурузы культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости 50- 300 л/га.	- (1)
Метсульфурон-метил+трибенурон-метил+амидосульфурон					
КАССАР ПРО, в.д.г. (390 г/кг +260 г/кг+100 г/кг) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-4 24.01.2033 г.	0,006-0,008	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе с 3-х листьев до 2-го междоузлия культуры	-(1)
Метрибузин					
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 250 г/л					
ЗОНТРАН, к.к.р. (250 г/л) АО «Щелково Агрохим» П-3 21.02.2029 г.	0,4-0,6	Пшеница яровая	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазу начало кукурузы (3-4 листа) – конец кукурузы культуры и ранние фазы роста сорняков	-1
	0,8-1,2	Картофель	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание по всходам при высоте картофеля до 5 см	-1
	0,8+0,4	Картофель	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Двукратное опрыскивание: 1 – по вегетирующим сорнякам до всходов культуры; 2 – после всходов, при высоте картофеля до 5 см. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	-1
	0,6-1,5	Соя	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков до появления всходов культуры	-(1)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 270 г/л					
ЛАЗУРИТ СУПЕР, к.н.э. (270 г/л) АО Фирма «Август» П-3 10.02.2032 г.	0,9+0,45	Картофель	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорных растений до всходов культуры с последующей обработкой при высоте ботвы 5 см	60(2)
	1,3	Картофель	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков растений при высоте ботвы до 5 см.	60(1)
	1,6	Томат рассадный	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорных растений через 15-20 дней после высадки рассады в грунт.	46(1)
	1,4	Томат посевной	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в фазе 2-4 листьев культуры.	46(1)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 600 г/л					
ЗЕНКОР УЛЬТРА, к.с. (600 г/л) ТОО «Байер КАЗ» П-3 15.04.2031 г.	0,6-0,8	Картофель	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до и после всходов	-1
	1,3-1,6	Томат рассадный	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до высадки рассады	-1
	1,2	Томат рассадный	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание сорняков через 15-20 дней после высадки рассады	-1
	0,8	Томат посевной	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев культуры	-1
	0,6	Соя (в условиях орошения)	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры	-1
02.02.2036 г.	0,3-0,5	Морковь	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Обработка с фазы 2 настоящих листьев культуры (с фазы «карандаша»)	-1
ЗЕНКОШАНС, к.с. (600 г/л)	0,5-1,1	Картофель	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60 (1)

ООО «Шанс» П-3 29.03.2029 г.	0,6-1,0	Соя	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60 (1)
	0,8-1,0	Кукуруза (на зерно)	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	60 (1)
	0,3-0,5	Кукуруза (на зерно)	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание до всходов культуры и повторно в фазе 3-4 листьев культуры. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	60 (2)
ЛАЗУРИТ УЛЬТРА, с.к. (600 г/л) АО Фирма «Август» П-3 20.06.2032 г.	0,6-0,8	Картофель	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости 100-300 л/га	60(1)
	0,35 + 0,6	Картофель	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры с последующей обработкой при высоте ботвы 5 см. Расход рабочей жидкости 100-300 л/га	60(2)
	1,3-1,6	Томат (рассадный)	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до высадки рассады. Расход рабочей жидкости 100-300 л/га	60(1)
	1,2	Томат (рассадный)	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание сорняков через 15-20 дней после высадки. Расход рабочей жидкости 100-300 л/га	60(1)
	0,8	Томат (посевной)	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев культуры. Расход рабочей жидкости 100-300 л/га	60(1)
	0,3 + 0,5	Томат (посевной)	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание посевов последовательно в фазах 1-2 и 3-5 листьев культуры. Расход рабочей жидкости 100-300 л/га	60(2)
	0,6	Соя (в условиях орошения)	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости 100-300 л/га	60(1)
	0,6	Нут	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости 100-300 л/га	60(1)
	0,5 + 0,5	Кукуруза	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры и повторно в фазе 3-4 листьев культуры. Расход рабочей жидкости 100-300 л/га	60(2)
	0,5-1,0	Кукуруза	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости 100-300 л/га	60(1)
ЛИНКОР, к.с. (600 г/л) ТОО «Астана-Нан» П-3 01.06.2036 г.	0,8	Картофель	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Однократное опрыскивание почвы до всходов культуры	-1
	0,6	Картофель	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание посевов после всходов культуры	-1
	1,3-1,6	Томат рассадный	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до высадки рассады	-1
	1,2	Томат рассадный	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание сорняков через 15-20 дней после высадки рассады	-1
	0,8	Томат посевной	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев культуры	-1
	0,6	Соя (в условиях орошения)	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры	-1
	1,5	Люцерна 2-го года вегетации (семенные посевы)	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы рано весной до начала отрастания культуры	-1
	1,2	Люцерна 2-го года вегетации (семенные посевы)	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание посевов при высоте культуры 10-15 см	-1
МЕТРИБУТ, к.с. (600 г/л) ТОО «ФМРус» П-3 22.11.2033 г.	0,4-0,8	Соя	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры	-1
	0,6-1,2 + 0,35	Картофель	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры с последующей обработкой при высоте ботвы 5 см. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)
ПРОЛАЙН, к.э. (600 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-3 19.01.2036 г.	0,6-0,8	Картофель	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Двукратное опрыскивание: 1 – до всходов культуры; 2 – по всходам культуры.	-1
	0,6-0,8	Томат	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы в фазе 2-4 листьев культуры.	-1
	0,6-0,8	Соя	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры.	-1
Концентрация д.в. (+/- 5%) ~ 700 г/кг					
ЕССЕНСЕКОР 70%, в.д.г. (700 г/кг) Наньцзин Эссенс Файн-Кемикал Со., Лтд, Китай П-3 08.01.2034	0,5-0,7	Картофель	Однолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание почвы до и после всходов культуры	-1
	0,7	Томаты	Однолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев культуры	-1
	1,0	Томаты	Однолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание растений через 10-15 дней после высадки рассады в грунт	-1
	0,5	Соя (на орошении)	Однолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание почвы до всходов культуры	-1
КАРБУЗИН 70%, с.п. (700 г/кг) ТОО «Agro Mark Kaz» П-3 01.03.2033 г.	1,1-1,4	Томаты	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание почвы до высадки рассады	-1
	0,7	Томаты	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев культуры	-1
	1,0	Томаты	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание растений через 15-20 дней после высадки рассады в грунт	-1
	0,7	Картофель	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание почвы до и после всходов культуры	-1
	0,5	Соя (в условиях орошения)	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание почвы до всходов культуры	-1
	1,4	Люцерна 2-го года вегетации (семенные посевы)	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание почвы рано весной до начала отрастания культуры	-1
ЛАЗУРИТ, с.п. (700 г/кг)	0,7-1,4	Картофель	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости 100-300 л/га	-(1)

АО Фирма «Август» П-3 20.09.2034 г.	0,5-1,0+0,3	Картофель	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры с последующей обработкой при высоте ботвы картофеля 5 см. Расход рабочей жидкости 100-300 л/га	-(1)
	0,7-0,8	Картофель	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков при высоте ботвы картофеля до 5 см. Расход рабочей жидкости 100-300 л/га	-(1)
19.01.2027 г.	0,5	Соя	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости 100-300 л/га	-(1)
Юнимарк, в.д.г. (700 г/кг) Arysta LifeScience S.A.S П-3 11.12.2035 г.	0,5–1,0	Соя	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до появления всходов культуры.	60(1)
	0,5–1,0 + 0,3	Картофель (кроме раннеспелого)	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры с последующей обработкой при высоте ботвы 5 см.	60(2)
	0,7 – 1,4	Картофель (кроме раннеспелого)	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до появления всходов культуры	60(1)
ОБСТУМ 70%, в.д.г. (700 г/кг) ТОО «А.С.К. Техник» П-3 17.03.2030 г.	0,5-0,7	Картофель	Однолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание почвы до и после всходов культуры	-1
	0,7	Томаты		Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев культуры	-1
	1,0	Томаты		Опрыскивание растений через 10-15 дней после высадки рассады в грунт	-1
	0,5	Соя (на орошении)		Опрыскивание почвы до всходов культуры	-1
ТРИБУЗИН 700, с.п. (700 г/кг) Sinochem Agro CO, Ltd П-3 27.02.2028 г.	1,0	Томаты	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание растений через 15-20 дней после высадки рассады в грунт. Расход рабочей жидкости 250-300 л/га	-(1)
	0,7-1,4	Картофель	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание почвы до и после всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 250-300 л/га	-(1)
	0,6-0,8	Соя (в условиях орошения)	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости 250-300 л/га	-(1)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 750 г/кг					
ТАЙГЕР ЭКСТРА, в.г. (750 г/кг) ШАНДОНГ ВЕЙФАНГ РЕЙНБОУ КЕМИКАЛ КО., ЛТД., П-3 21.06.2028 г.	0,45-0,65	Картофель	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание почвы после всходов культуры	-1

МЦПА
МЦПА (натриевая соль)

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 750 г/л					
СОЛЕКС, в.р. (750 г/л) Синтезия Кеми Гмбх, Германия П-3 29.05.2030 г.	0,7-1,0	Пшеница и ячмень яровой	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры	-1
	0,4	Лен масличный		Опрыскивание посевов в фазу «елочки» культуры	-1

МЦПА эфир

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 570 г/л					
СОЛЕКС ПРО, к.э. (570 г/л) Синтезия Кеми Гмбх, Германия П-3 22.02.2031 г.	0,4-0,6	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу кущения до выхода в трубку культуры	-1
	0,3-0,4			Применяется в качестве добавки к 2,4- Д при опрыскивании посевов в фазе кущения культуры	
				Применяется в качестве добавки к сульфонил-мочевинам при опрыскивании посевов в фазе кущения до выхода в трубку культуры	
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 600 г/л					
МБМ, к.э. (600 г/л) ТОО «Астана-Нан» П-3 17.03.2035 г.	0,3-0,7	Лён	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» культуры	- (1)
	0,7-1,05	Пшеница озимая	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание в период с фазы 3-х листьев и до начала выхода в трубку	(1)
	0,7-1,05	Пшеница яровая	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание в период с фазы 3-х листьев и до начала выхода в трубку -	(1)

МЦПА в виде диметиламинной соли

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 750 г/л					
2М-4Х 750, в.р.к. (75%) Нуфарм ГмбХ &Ко.КГ, Австрия П-3 06.04.2028 г.	0,4	Лен	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание в фазе «елочки» при высоте культуры 3-10 см	-1
ДЕТОКС 75%, в.р.к. (750 г/л) ТОО «HARVEST Ltd (Харвест Ltd)» П-3 23.02.2034 г.	0,4-0,6	Лен	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» при высоте культуры 3-10 см. Расход рабочей жидкости 100 -150 л/га	-1
	0,3-0,4	Горох	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры при высоте культуры 10 -15 см. Расход рабочей жидкости 100 -150 л/га	-1
АГРОКСОН, в.р. (750 г/л) Кеминова А/С, Дания П-4 18.01.2028 г.	0,7-1,0	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры до выхода в трубку	-1

МЕЦЕНАТ, в.р.к. (750 г/л) ТОО «АЙБАД-2015» П-3 10.04.2035 г.	0,7-1,0	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры	-1
	0,4	Лен масличный	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе "елочки" культуры и ранние фазы роста сорняков	-1
МОЩЬ, в.р. (750 г/л) «ШАНДОНГ ВЕЙФАНГ РЕЙНБОУ КЕМИКАЛ КО., ЛТД, П-3 10.10.2027 г.	0,75-1,2	Пшеница яровая	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры до выхода в трубку	-(1)
	0,4	Лен	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» при высоте культуры 3-10 см	-(1)
	0,3-0,4	Горох	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры (при высоте гороха 10-15 см)	-(1)
	0,75-1,2	Ячмень яровой	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку. Расход рабочей жидкости 100-300 л/га	-(1)
ЭТАЛОН, в.р.к. (750 г/л) ЛЕЙТОН АГРИО ЕВРОПА КФТ, Венгрия П-3 14.02.2032 г.	0,75-1,2	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку	-1
	0,4-0,7	Лен масличный	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе «елочки». Расход рабочей жидкости 200- 300 л/га.	-1
ЦИКЛОН, в.р. (750 г/л) ARCUS INVEST HOLDING B.V П-3 10.10.2032 г.	0,4	Лен масличный	Однолетние и многолетние двудольные сорняки, в том числе выюнок полевой	Опрыскивание в фазе «елочки» при высоте культуры 3-10 см	- (1)

МЦПА кислоты в виде смеси диметиламинной, калиевой, натриевой солей

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 300 г/л					
КОРТИК, в.р. (300 г/л) АО «Щелково Агрохим» П-3 28.02.2032 г.	0,9-1,2	Лен	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу «елочки» при высоте культуры 3-10 см	-1
	0,6-0,9	Горох	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу 3-5 настоящих листьев культуры (при высоте растений гороха 10-15 см). Запрещается обрабатывать культуру во время цветения.	-1
	0,6-1,0	Соя	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу 3-5 настоящих листьев культуры. Запрещается обрабатывать культуру во время цветения	-1
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 500 г/л					
АГРОШАНС, в.р.к. (500 г/л) ООО «Шанс» П-3 30.04.2031 г.	0,1-1,5	Пшеница озимая, яровая	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку весной. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га.	57(1)
	0,7-1,5	Пшеница, ячмень, овес яровые		Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га.	
	0,5-0,8	Горох на зерно		Опрыскивание посевов в фазе 3-5 настоящих листьев культуры (при высоте растений гороха 10-15 см). Запрещается обрабатывать культуру во время цветения. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га.	50(1)
	1,2	Картофель (среднеспелые и позднеспелые сорта)		Опрыскивание почвы до всходов культуры или при высоте ботвы картофеля 10-15 см. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га.	60(1)
	0,8-1,0	Лен долгунец		Опрыскивание посевов в фазе «елочки» при высоте культуры 3-10см. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га.	-1
ГЕРБИТОКС, в.р.к. (500 г/л) АО Фирма «Август» П-3 14.06.2031 г.	1,5	Рис	Клубнекамыш, монохория, частуха и др. сорняки болотной группы	Опрыскивание посевов в фазе полного кущения культуры. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	-1
16.01.2033 г.	1,2-1,5	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние и некоторые многолетние двудольные в т.ч. осот, бодяк и другие	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	-1
11.09.2034 г.	0,5-0,8	Горох	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры (при высоте гороха 10-15 см). Расход рабочей жидкости 50-300 л/га	-1
	0,8-1,0	Лен масличный	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» при высоте культуры 3-10 см. Расход рабочей жидкости 50-300 л/га	-1
ГЕРБИКС, в.к. (500 г/л) ООО «Интер Групп» П-3 15.10.2034 г.	0,8-1,0	Лен масличный	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» при высоте культуры 3-10 см. расход рабочей жидкости 200-300 л/га	- (1)
	1,2	Картофель (среднеспелые или позднеспелые сорта)	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов до всходов культуры или при высоте ботвы картофеля 10-15 см. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	60 (1)
Лексо, в.р.к. (500 г/л) ФОРВАРД П-3 03.02.2036 г.	0,7-1,2	Просо	Однолетние и многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры	-1
	0,7-1,5	Пшеница, ячмень, овес яровые			
	1,0-1,5	Пшеница ячмень, рожь озимые		Опрыскивание посевов в фазе «елочки» культуры	
	0,8-1,0	Лен долгунец и масличный			
	1,0-1,5	Рис		Опрыскивание посевов в фазе полного кущения риса и в фазе 3-4 листьев у клубнекамыша	
	1,0-1,5	Сенокосные угодья и пастбища		Опрыскивание вегетирующих сорняков и нежелательной растительности	

	1,2	Картофель (среднеспелые и позднеспелые сорта)		Опрыскивание почвы до всходов культуры или при высоте ботвы картофеля 10-15 см	
	0,5-0,8	Горох		Опрыскивание посевов в фазе 3-5 настоящих листьев культуры (при высоте растений гороха 10-15 см). Запрещается обрабатывать культуру во время цветения	
МОМУС, в.р.к. (500 г/л) Представительство ООО «Агро Эксперт Групп» в РК П-3 27.09.2032 г.	0,8-1,0	Лен масличный	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га.	59 (1)
	1,2-1,5	Ячмень яровой	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу кушения культуры до выхода в трубку. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га.	55 (1)
	1,2-1,5	Пшеница яровая	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу кушения культуры до выхода в трубку. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га.	55 (1)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 600 г/л					
АНТАРЕС, к.э. (300 г/л) ТОО «ФМРус» П-3 07.12.2033 г.	1,2-1,4	Пшеница яровая	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу кушения культуры до выхода в трубку. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га.	-1
	1,2-1,4	Лен	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» при высоте культуры 3-10 см. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га.	-1
	1,2-1,4	Горох	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 настоящих листьев культуры (при высоте растений гороха 10-15 см). Запрещается обрабатывать культуру во время цветения. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га.	-1

МЦПА кислоты в виде смеси калиевой, натриевой солей

ГЕРБИТОКС-Л, в.р.к. (300 г/л) АО Фирма «Август» П-3 11.02.2029 г.	1,3-1,7	Лен масличный	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» при высоте культуры 3-10 см. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	50 (1)
--	---------	---------------	-------------------------------	--	-----------

МЦПА + клопиралид

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 367 г/л +124 г/л					
СПИРИТ ЛАЙТ, в.р. (367 г/л + 124 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-3 25.02.2030 г.	0,5	Лен масличный	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» культуры.	-1
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 500 г/л + 100 г/л					
ГЕРМЕС ГРАНД, к.э. (500 г/л + 100 г/л) ТОО «Агро Глобал» П-3 31.01.2030 г.	0,5-0,6	Лен	Некоторые однолетние двудольные сорняки (ромашка непахучая, щирица запрокинутая, горец выонковый, осот полевой, молокан татарский, выюнок полевой)	Опрыскивание посевов в фазу «елочки» культуры	-1
СПИРИТ ГРАНД, к.э. (500 г/л + 100 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-3 01.03.2027 г.	0,5-0,6	Лен	Некоторые однолетние и многолетние двудольные сорняки (ромашка непахучая, щирица запрокинутая, горец выонковый, осот полевой, молокан татарский, выюнок полевой)	Опрыскивание льна в фазу «елочки» культуры	-1

МЦПА в виде диметиламинной соли +пиклорам

ГОРГОН, в.р.к. (350 г/л+150 г/л) АО Фирма «Август» П-3 21.12.2027 г.	2,5-3,5	Пары	Горчак розовый	Опрыскивание паров по вегетирующему горчаку в фазе развития «розетка»– начало цветения. Расход рабочей жидкости 50-300 л/га.	-1
14.06.2031 г.	0,15-0,3	Кукуруза	Однолетние, в том числе устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости 50-300 л/га.	-1
	0,15-0,25	Лен масличный	Однолетние, в том числе устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» культуры и в фазе розетки листьев и корнеотпрысковых сорняков Расход рабочей жидкости 50-300 л/га	-1
30.03.2033 г.	2,5-3,5	Земли несельскохозяйст венного назначени я	Горчак ползучий и другие злостные многолетние двудольные сорняки (молочай лозный, бодяк полевой)	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости 50-300 л/га.	-1
10.09.2034 г.	0,15-0,17	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние и многолетние двудольные сорняки, включая осоты	Опрыскивание посевов в фазу кушения культуры и ранние фазы развития сорняков. Расход рабочей жидкости 50- 300 л/га	-1

МЦПА-изооктил +флорасулам + мезосульфурон-метил

Тризолют, м.д. (240 г/л + 6 г/л + 9 г/л) ШАНДОНГ ВЕЙФАНГ РЕЙНБОУ КЕМИКАЛ КО., ЛТД, П-3 21.02.2035 г.	0,7-0,9	Яровая пшеница, озимая пшеница	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание пшеницы на фазе 3-х листьев или на ранних фазах развития сорняков	- (1)
--	---------	-----------------------------------	-------------------------------	--	-------

МЦПА-изооктил + флорасулам + флуорокси-пир-метил

Сангер с.к. (356 г/л + 4 г/л+ 120 г/л) Shaanxi Sunger Road Bio-Science CO., Ltd., Китай П-3 26.09.2035 г.	0,375 - 0,525	Кукуруза	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200 -300 л/га	- (1)
	0,45 - 0,75	Ячмень яровой	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу кушения культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	- (1)
	0,6 - 0,9	Пшеница яровая и озимая	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу кушения культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости 200 -300 л/га	- (1)

Никосульфурон

ХОРС, в.д.г. (750 г/кг) ООО «Агро Эксперт Групп», Россия П-3 30.01.2029 г.	0,05-0,07 + ПАВ Бит- 90, Ж 200 мл/га	Кукуруза	Однолетние и многолетние злаковые и некоторые однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в смеси с 200 мл/га ПАВ Бит-90, Ж в фазе 3-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости – 100-300 л/га	-1
---	--	----------	---	--	----

Никосульфурон + тифенсульфурон-метил

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 600 г/кг + 150 г/кг					
ДУБЛОН ГОЛД, в.д.г. (600 г/кг + 150 г/кг) АО Фирма «Август» П-3 11.09.2034 г.	0,05 + ПАВ АДЬЮ, Ж 200 мл/га	Кукуруза	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 1-4 листьев двудольных и злаковых сорняков. Расход рабочей жидкости 50-300 л/га.	-(1)
	0,07 + ПАВ АДЬЮ, Ж 200 мл/га	Кукуруза	Многолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры при высоте пырея ползучего 10-15 см. Расход рабочей жидкости 50-300 л/га.	-(1)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 700 г/кг + 125 г/кг					
КВИН, в.д.г. (700 г/кг + 125 г/кг) ТОО «Астана-Нан» П-3 19.06.2027 г.	0,05-0,07 + ПАВ 150 мл/га	Кукуруза	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры	-1

Никосульфурон + тифенсульфурон-метил + флорасулам

КРЕЙЦЕР, в.д.г. (650 г/кг + 60 г/кг 40 г/кг) АО Фирма «Август» Россия П-3 07.07.2031 г.	0,09-0,11 + ПАВ АДЬЮ, Ж(0,1% от объема рабочей жидкости, но не более 200 мл/га)	Кукуруза	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры при высоте пырея ползучего 10- 15 см, в фазе 1-4 листьев однолетних злаковых и двудольных сорняков. Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	60 (1)
--	--	----------	---	--	--------

Никосульфурон + флорасулам

ОКТАВА, м.д. (60 г/л + 3,6 г/л) АО «Щелково Агрохим» П-3 15.09.2030 г.	0,8-1,0	Кукуруза	Однолетние и многолетние злаковые, однолетние и некоторые многолетние (виды бодяка) двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков (2-6 листьев у однолетних и при высоте 10-20 см многолетних сорняков)	60 (1)
---	---------	----------	---	--	--------

Оксифлуорфен

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 240 г/л					
Босфор, к.э. (240 г/л) ООО"Шанс" П-3 25.02.2035 г.	0,6 -0,8	Соя	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-х листьев культуры. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га.	60(1)
	0,6 -0,8	Сафлор	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	60(1)
	0,8-1,0	Подсолнечник (семена, масло)	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60(1)
	1,0	Лук всех генераций (кроме лука на перо)	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-х листьев культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60(1)
	0,5	Лук всех генераций (кроме лука на перо)	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2 листьев культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га.	60(1)
ГАУР, к.э. (240 г/л) АО Фирма «Август» П-3 22.04.2030 г.	0,8-1,0	Подсолнечник	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60 (1)
	0,5	Лук	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-х листьев культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60 (1)
	1,0	Лук	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-х листьев культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60 (1)
ГОАЛ 2Е, к.э. (240 г/л) Филиал АО" Сумитомо Корпорэйшн" в Алматы П-3 25.09.2035 г.	4,2-8,4	Яблоня (сильно и среднерослые подвои)	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание весной вегетирующих сорняков высотой 10-15 см при условии защиты культуры	-(1)
	1,0	Лук всех генераций	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3 листьев культуры	-(1)
	0,5	Лук всех генераций	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2 листьев культуры	-(1)
	1,0	Подсолнечник	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры	-(1)
ГОЛ, к.э. (240 г/л) ТОО «Астана-Нан» П-3 17.04.2027 г.	1,0	Подсолнечник	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры	-1
	0,5	Лук всех генераций	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-х листьев культуры	-1
	1,0	Лук всех генераций	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-х листьев культуры	-1

	4,2-8,4	Яблоня (сильно и среднерослые подвои)	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание весной вегетирующих сорняков высотой 10- 15 см при условии защиты культуры	-1
КОНДОР 240, к.э. (240 г/л) Моер Кемсайенс, Ко., Лтд, Китай П-3 26.11.2030 г.	0,5-1,0	Лук	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев культуры	-1
	1,0	Подсолнечник	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры	-1
ОКСИФЕН 240, к.э. (240 г/л) ТОО «Агро-Хим-Лидер» П-3 14.03.2028 г.	1,0	Подсолнечник	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости 250-300 л/га	-1
	0,5	Лук (всех генераций)	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2 листьев культуры. Расход рабочей жидкости 250-300 л/га	-1
	1,0	Лук (всех генераций)	Однолетние двудольные сорняки	Повторное опрыскивание посевов в фазе 3 листьев культуры. Расход рабочей жидкости 250-300 л/га	-1
	4,2-8,4	Яблоня (сильно и среднерослые подвои)	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание весной вегетирующих сорняков высотой 10- 15 см при условии защиты культуры. Расход рабочей жидкости 500 л/га	-1
	1,0	Сафлор	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости 250-300 л/га	-1
РОКИ, к.э. (240 г/л) ШАНДОНГ ВЕЙФАНГ РЕЙНБОУ КЕМИКАЛ КО., ЛТД., П-3 04.06.2028 г.	1,0	Подсолнечник	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры	-1
	0,5-1,0	Лук всех генераций	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2 листьев культуры	-1
ФЛЮРОФЕН 240, к.э. (240 г/л) ТОО «Agro Mark Kaz» П-3 07.06.2033 г.	1,0	Подсолнечник	Однолетние двудольные	Опрыскивание почвы до всходов культуры	-1
	0,5	Лук всех генераций	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазе 2 листьев культуры	-1
	1,0	Лук всех генераций	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазе 3 листьев культуры	-1
	4,2-8,4	Яблоня (сильно и среднерослые подвои)	Однолетние двудольные	Опрыскивание весной вегетирующих сорняков высотой 10- 15 см при условии защиты культуры	-1
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 480 г/л					
ГОАЛ 480, к.с. (480 г/л) Нутрикем Компани Лимитед, Китай П-3 17.11.2030 г.	0,4-0,5	Сафлор	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры	-1
	0,4-0,5	Соя	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-х листьев культуры	-1

Пендиметалин

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 330 г/л					
ГАЙТАН, к.э. (330 г/л) АО Фирма «Август» П-3 22.04.2030 г.	2,3-4,5	Лук	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до появления всходов культуры. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	60 (1)
	3,0-6,0	Морковь	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до появления всходов культуры. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	60 (1)
ЗОРРО 330, к.э. (330 г/л) Моер Кемсайенс Ко, Китай П-3 26.11.2030 г.	2,3-4,5	Лук	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры	-1
	3,0-6,0	Табак	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры и до высадки рассады	-1
КАЛКАН, к.э. (330 г/л) ТОО «Агро-Хим-Лидер» П-3 14.03.2028 г.	3,0-6,0	Соя, хлопчатник, капуста рассадная, томаты, морковь, чеснок, подсолнечник	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры или до высадки рассады	-1
	5,0	Картофель	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание почвы за 2-3 дня до всходов культуры (после последнего окучивания)	-1
	2,3-4,5	Лук (всех генераций)	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры	-1
ЛОТОС СУПЕР, к.э. (330 г/л) ТОО «Бартонс Кемикал ГмбХ» П-3 17.02.2030 г.	3,0-6,0	Соя, табак, хлопчатник, томаты, капуста рассадная, морковь, лук, подсолнечник	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры или до высадки рассады. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га.	-1
СТОП 33%, к.э. (330 г/л) ТОО «Астана-Нан» П-3 13.12.2033	3,0-6,0	Соя, табак, хлопчатник, томаты, капуста рассадная, кукуруза, морковь чеснок, подсолнечник	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры или до высадки рассады	-1
	5,0	Картофель	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание почвы за 2-3 дня до всходов культуры (после последнего окучивания)	-1
	2,3-4,5	Лук	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры	-1
ЭСТАМП, к.э. (330 г/л) АО «Щелково Агрохим» П-3 22.04.2029 г.	3,0-6,0	Подсолнечник (на семена и масло)	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	-1
07.02.2034 г.	2,3-4,5	Лук всех генераций	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	-1

Ястар, к.э. (330 г/л) ТОО «Мивоки», П-3 26.01.2036 г.	2,3-4,5	Лук всех генераций	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов до всходов культуры. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	-1
	3,0-6,0	Томаты	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов до всходов культуры или до высадки рассады. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	
	3,0-6,0	Соя, хлопчатник, морковь	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов до всходов культуры. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 400 г/л					
ПЕНДИМЭКС, к.э. (400 г/л) SHANDONG BINNONG TECHNOLOGY CO., LTD П-3 07.11.2029 г.	3,0-6,0	Хлопчатник, томаты, капусты рассадная, чеснок	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры или до высадки рассады	60 (1)
	5,0	Картофель		Опрыскивание почвы за 2-3 дня до всходов культуры (после последнего окучивания)	
	2,3-4,5	Лук всех генераций		Опрыскивание почвы до всходов культуры	

Пеноксулам

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 25 г/л					
ОРИЕНТ 25, м.д. (25 г/л) ТОО «QADAM Group» (Кадам Групп) П-3 06.04.2028 г.	1,0-1,4	Рис	Клубнекамыш и просовидные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев - кущения по влажной почве или при слое воды 5-10 см	-(1)
РЕЙНБОУ 25 ОД, м.д. (25 г/л) Дау АгроСаенсес, США П-3 01.02.2028 г.	1,0-1,4	Рис	Клубнекамыш и просовидные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев - кущения по влажной почве или при слое воды 5-10 см	-1
Радуга, м.д. (25 г/л) ТОО «Астана-Нан» П-3 20.06.2035 г.	1,0-1,4	Рис	Клубнекамыш и просовидные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев - кущения по влажной почве или при слое воды 5-10 см	-(1)
ТАЛАНТ, м.д. (25 г/л) Лейтон Агрио Европа КФТ Венгрия П-3 21.02.2030 г.	1,0-1,4	Рис	Клубнекамыш и просовидные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев - кущения по влажной почве или при слое воды 5-10 см.	-1
ЦИТАТА, м.д. (25 г/л), ЛЕЙТОН АГРИО ЕВРОПА КФТ ВЕНГРИЯ П-3 17.03.2032 г.	1,0-1,4	Рис	Клубнекамыш и просовидные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев - кущения по влажной почве или при слое воды 5-10 см	-1

Пиритиобак натрия

Стэйпл 33,6%, в.р.к. (383 г/л) Филиал АО "Сумитомо Корпорейшн" в Алматы П-3 16.09.2035 г.	0,1 - 0,3 + ПАВ 0,1-0,3%	Хлопчатник	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание в послевсходовый период ростков (Щирица 3-5см, Ипомея 3-10см). Баковое смешивание с ПАВ 0,1-0, 3%. Интервал между обработками: 7 дней	60(2)
--	--------------------------	------------	--	--	-------

Пиклорам

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 750 г/л					
КЛИНЧ, в.д.г. (750 г/л) АО Фирма «Август» П-3 19.02.2035 г.	0,03-0,05	Ячмень яровой	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений. Озимые культуры обрабатывают весной. Расход рабочей жидкости – 50-300 л/га.	60 (1)
	0,03-0,05	Пшеница яровая	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений. Озимые культуры обрабатывают весной. Расход рабочей жидкости 50-300 л/га.	60 (1)
	0,03-0,05	Лен	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» льна, в фазе 2-4 листьев однолетних и розетки листьев многолетних сорных растений. Расход рабочей жидкости 50-300 л/га	60 (1)
	0,03-0,05	Пшеница озимая	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений. Озимые культуры обрабатывают весной. Расход рабочей жидкости – 50-300 л/га	60 (1)

Пиклорам+ аминопиралид

Эйс, в.р. (200 г/л + 18 г/л) ТОО «EcoSave» П-3 02.03.2036 г.	2,0-2,5	Пары	Горчак розовый	Опрыскивание паров по вегетирующему горчаку в фазе развития розетка - начало цветения	- (1)
--	---------	------	----------------	---	-------

Пиклорам+ трибенурон-метил +флорасулам

НордСтрим в.д.г. (350 г/кг + 200 г/кг + 80 г/кг) АО Фирма «Август» П-3 22.01.2034 г.	0,05-0,075 плюс ПАВ Адью, Ж (0,1 % от объема рабочей жидкости)	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание в фазу кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости 50-300 л/га	60 (1)
---	---	-------------------------------------	--	--	--------

Пиноксаден + клокви́нтосет-мексил (антидот)

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 45 г/л + 11,25 г/л					
АКСИАЛ 045, к.э. (45 г/л + 11,25 г/л) Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария П-3 05.09.2028 г.	0,75-1,3	Пшеница и ячмень яровые	Овсяг	Опрыскивание посевов в ранние фазы сорняков (3-4 листа)	-1
	1,0-1,3	Пшеница и ячмень яровые	Просовидные	Опрыскивание посевов в ранние фазы сорняков (3-4 листа)	-1
	1,3	Пшеница и ячмень яровые	Щетинники	Опрыскивание посевов в ранние фазы сорняков (3-4 листа)	-1
АПРОВАТОР, к.э. (45 г/л + 11,25 г/л) ООО «Шанс» П-2 23.06.2031 г.	0,7-1,3	Пшеница яровая и озимая	Однолетние злаковые (виды щетинника, посо куриное, просо сорнополевое, овсяг, метлица полевая, лисохвост и др.) сорняки	Опрыскивание посевов весной, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения однолетних злаковых сорняков (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60(1)
	0,7-1,0	Ячмень яровой	Однолетние злаковые (виды щетинника, посо куриное, просо сорнополевое, овсяг и др.) сорняки	Опрыскивание посевов начиная с фазы 2 листьев до конца кущения однолетних злаковых сорняков (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60(1)
	0,7-1,0	Ячмень озимый	Однолетние злаковые сорняки (виды щетинника, просо куриное, просо сонополевое, овсяг, метлица полевая, лисохвост)	Опрыскивание посевов весной начиная с фазы 2 листьев до конца кущения однолетних злаковых сорняков (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	60(1)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 45 г/л + 20 г/л					
МАКСИР, к.э. (45 г/л + 20 г/л) AGROBEST GRUP, Турция П-3 20.06.2032 г.	1,3	Яровая пшеница, ячмень	Щетинники	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (3-4 листа) независимо от стадии развития культуры	-1
	1,0-1,3	Яровая пшеница, ячмень	Просянки	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (3-4 листа) независимо от стадии развития культуры	-1
	0,75-1,3	Яровая пшеница, ячмень	Овсяг	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (3-4 листа) независимо от стадии развития культуры	-1
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 50 г/л + 12,5 г/л					
АКСИАЛ 050, к.э. (50 г/л + 12,5 г/л) Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария П-3 09.04.2028 г.	0,7	Пшеница и ячмень яровые	Овсяг	Опрыскивание по вегетирующим сорнякам	-1
	0,9	Пшеница и ячмень яровые	Просовидные сорняки	Опрыскивание по вегетирующим сорнякам	-1
	1,2	Пшеница и ячмень яровые	Щетинники	Опрыскивание по вегетирующим сорнякам	-1
ПИЛАРДЭН, к.э. (50 г/л + 12,5 г/л) Пиларквим (Шанхай) Ко., Лтд., Китай П-3 02.12.2032 г.	0,7- 1,2	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние злаковые сорняки (овсяг, просовидные, щетинник)	Опрыскивание посевов в период вегетации	- (1)
СТИНГРЕЙ, к.э. (50 г/л + 12,5 г/л) АО ФИРМА «АВГУСТ» П-3 19.01.2036 г.	0,7- 1,2	Пшеница и ячмень яровые	Овсяг, просовидные сорняки, щетинники	Опрыскивание посевов в период вегетации культуры. Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	60 (2)
ТЕСПИАН, к.э. (50 г/л+12,5 г/л) Представительство ООО «Агро Эксперт Групп» в РК П-3 20.02.2033 г.	0,6-1,2	Ячмень яровой	Овсяг, щетинники (виды), просо (виды), метлица обыкновенная	Опрыскивание посевов в период вегетации культуры. Расход рабочей жидкости 100- 300 л/га.	- (1)
		Пшеница яровая	Овсяг, щетинники (виды), просо (виды), метлица обыкновенная	Опрыскивание посевов в период вегетации культуры. Расход рабочей жидкости – 100- 300 л/га	- (1)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 60 г/л + 15 г/л					
Смилодон, к.э. (60 г/л + 15 г/л) ТОО «ФМРус» П-3 04.02.2035 г.	0,5-1,0	Пшеница яровая и озимая	Однолетние злаковые сорные растения (виды щетинника, просо куриное, просо сорнополевое, овсяг, метлица полевая, лисохвост)	Опрыскивание посевов по вегетирующим однолетним злаковым сорным растениям (от 2- 3 листьев до конца кущения) независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	60 (1)
	0,5-1,0	Ячмень яровой и озимый	Однолетние злаковые сорные растения (виды щетинника, просо куриное, просо сорнополевое, овсяг, метлица полевая, лисохвост)	Опрыскивание посевов по вегетирующим однолетним злаковым сорным растениям (от 2- 3 листьев до конца кущения) независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	60 (1)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 100 г/л + 25 г/л					
Серапен, к.э. (100 г/л + 25 г/л) ШАНДОНГ ВЕЙФАНГ РЕЙНБОУ КЕМИКАЛ КО., ЛТД, П-3 05.02.2035 г.	0,3-0,6	Пшеница яровая и озимая	Однолетние злаковые сорняки (виды щети́нника, просо куриное, просо сорнополевое, овсяг, метлица полевая, лисохвост)	Опрыскивание посевов, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения однолетних злаковых сорняков (независимо от фазы развития культуры).	- (1)

Пиноксаден + флорасулам + клокви́нтосет-мексил (антидот)

СЕРАПЕН ПЛЮС к.э. (45 г/л + 5 г/л + 11,25 г/л), ШАНДОНГ ВЕЙФАНГ РЕЙНБОУ КЕМИКАЛ КО., ЛТД, П-4 22.05.2033 г.	0,7-0,9	Яровая пшеница, ячмень яровой	Однолетние злаковые и однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в ранние фазы сорняков	-1
---	---------	-------------------------------------	--	--	----

Пиноксаден + клодинафоп-пропаргил + клокви́нтосет-мексил (антидот)

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 50 г/л + 50 г/л + 12.5 г/л					
БИНГОТОР, к.э. (50 г/л + 50 г/л + 12,5 г/л) Shandong Binnong Technology Co., Ltd. П-4 06.02.2036 г.	0,5-0,6	Яровая пшеница	Злаковые сорняки, в т. ч. овсюг, щетинник, куриное просо	Опрыскивание посевов в ранние фазы сорняков (3-4 листа)	- (1)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 120 г/л + 120 г/л + 60 г/л					
Ессенксаден, к.э. (120 г/л + 120 г/л + 60 г/л), Наньцин Эссенс Файн- Кемикал Со., ЛТД П-4 28.04.2036 г.	0,36	Яровая пшеница, ячмень яровой	Злаковые сорняки, в т. ч. овсюг, щетинник, куриное просо	Опрыскивание посевов в ранние фазы сорняков	60 (1)

Пироксулам + клокви́нтосет-мексил (антидот)

МЕРИТ 45, м.д. (45 г/л + 90 г/л) Дэу АгроСайенсес, США П-4 17.02.2030 г.	0,35	Пшеница яровая и озимая	Овсюг и другие злаковые сорняки, а также однолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазу кущения – до 2 междоузлия культуры	-1
---	------	----------------------------	---	---	----

Претилахлор + пирибензоксим

СОЛИТО 320, к.э. (300 г/л + 20 г/л) Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария П-4 04.01.2029 г.	1,0-1,5	Рис	Двудольные, злаковые сорняки (просовидные) и клубнекамыш	Опрыскивание посевов в фазу кущения	60 (1)
--	---------	-----	---	-------------------------------------	--------

Претилахлор + флорпирауоксифен-бензил + фенклорим (антидот)

Балорик 310, к.э. (300 г/л + 10 г/л + 75 г/л) SYNGENTA CROP PROTECTION AG П-4 02.03.2036 г.	1,5-2,0	Рис	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание в период вегетации	60 (1)
--	---------	-----	---	---------------------------------	--------

Просульфокарб

БОКСЕР 800, к.э. (800 г/л) SYNGENTA CROP PROTECTION AG П-4 04.01.2029 г.	3,0-5,0	Картофель	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание почвы после всходов культуры 5 см над почвой	-1
	2,0-3,0	Лук	Однолетние злаковые и двудольные сорняки, включая подмаренник цепкий и паслен черный	1-я обработка 2 л/га; 2- я обработка 3 л/га Опрыскивание по всходам культуры после фазы 2-х настоящих листьев с интервалом 10-14 дней	-2
	1,5-2,5	Морковь	Однолетние злаковые и двудольные сорняки, включая подмаренник цепкий и паслен черный	Опрыскивание в период вегетации после фазы 2-го настоящего листа повторная обработка в фазу 3-4-х настоящих листьев	-2
30.10.2034 г.	3,0-5,0	Картофель	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры	-1

Просульфурон

ПИК 75, в.д.г. (750 г/кг) Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария П-4 16.06.2027 г.	0,005-0,01	Лен	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание в фазе «елочки» (3-10 см) культуры и ранние фазы роста сорняков	-1
--	------------	-----	--	---	----

Прометрин

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 500 г/л					
БРИГ, к.с. (500 г/л) АО «Щелково Агрохим» П-4 14.04.2031 г.	1,5-3,5	Картофель, морковь, нут, фасоль, подсолнечник, соя, сафлор, кукуруза, хлопчатник, чечевица, горох	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание почвы до всходов культуры	-1
ГАМБИТ, с.к. (500 г/л) АО Фирма «Август» П-3 03.06.2031 г.	2,5-3,0	Нут	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости 100-300 л/га	-1
	2,0-3,5	Подсолнечник			
	1,5-3,0	Морковь			
	2,0-3,5	Картофель			
ГЕЗАДЕКС, к.с., (500 г/л) SHANDONG BINNONG TECHNOLOGY CO., LTD П-3 12.07.2033	4,0-5,0	Хлопчатник	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до посева или до всходов культуры	-1
	2,0-4,0	Подсолнечник, кукуруза	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до посева, одновременно с посевом или до всходов культуры	-1
	3,0-4,0	Картофель	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры. Реализация клубней разрешается не ранее, чем через 3 месяца после обработки	-1

	2,0-3,0	Морковь	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до посева, до всходов культуры или в фазе 1- 2 настоящих листьев. Реализация корнеплодов разрешается не ранее, чем через 4 месяца после обработки	-1
ГЕЗАГАРД 500, с.к. (500 г/л) Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария П-4 22.01.2034	4,0-5,0	Хлопчатник	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание почвы до посева или до всходов культуры	-1
	2,0-4,0	Подсолнечник, кукуруза	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание почвы до посева, одновременно с посевом или до всходов культуры	-1
	3,0-5,0	Горох на зерно, соя, чеснок	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание почвы до посева или до всходов культуры	-1
	3,0	Фасоль	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание почвы за 2-3 дня до появления всходов культуры	-1
	3,0-4,0	Картофель	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание почвы до посева, до всходов культуры. Реализация клубней разрешается не ранее, чем через 3 месяца после обработки	-1
	2,0-3,0	Морковь	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание почвы до посева, до всходов культуры или в фазе 1- 2 настоящих листьев. Реализация корнеплодов разрешается не ранее, чем через 4 месяца после обработки	-1
	3,0-4,0	Нут	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание почвы до всходов культуры	-1
	3,0-4,0	Бобы кормовые	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание почвы до посева или до всходов культуры	-1
ГЕЗАТРИН 500, с.к. (500 г/л) ТОО «Agro Mark Kaz» П-3 22.11.2033 г.	4,0-5,0	Хлопчатник	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до посева или до всходов культуры. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га.	-1
	2,0-4,0	Подсолнечник, кукуруза	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до посева, одновременно с посевом или до всходов культуры. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га.	-1
	3,0-5,0	Соя, чеснок	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до посева или до всходов культуры. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га.	-1
	3,0-4,0	Картофель	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до посева, до всходов культуры. Реализация клубней разрешается не ранее, чем через 3 месяца после обработки. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га.	-1
	2,0-3,0	Морковь	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до посева до всходов культуры или в фазе 1- 2 настоящих листьев. Реализация корнеплодов разрешается не ранее, чем через 4 месяца после обработки. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га.	-1
	3,0-4,0	Нут	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га.	-1
ОМЕГА 50%, с.к. (500 г/л) ТОО «QADAM Group» (Кадам Групп) П-3 06.04.2028 г.	2,0-4,0	Подсолнечник	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры	-1
	2,0-3,0	Морковь	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры или в фазе 1-2 настоящих листьев. Реализация корнеплодов разрешается не ранее, чем через 4 месяца после обработки	-1
	3,0-4,0	Картофель	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры. Реализация корнеплодов разрешается не ранее, чем через 3 месяца после обработки	-1
РУБИКОН, к.с. (500 г/л) Жеджянг Жонгшан Кемикал Груп Сток Ко., Лтд, Китай П-4 12.06.2027 г.	3,5	Картофель	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры	20 (1)
	3,5	Подсолнечник	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы одновременно с посевом или до всходов культуры	-1
	2,0-3,5	Кукуруза	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы одновременно с посевом или до всходов культуры	-1
	2,0-3,0	Морковь	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры или в фазе 1-2 настоящих листьев	-1
	4,0-5,0	Хлопчатник	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до посева или до всходов культуры	-1
САРМАТ, к.с. (500 г/л) ООО «Агро Эксперт Групп», Россия П-3 30.01.2029г.	2,0-4,0	Подсолнечник	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до посева, одновременно с посевом или до всходов культуры. Расход рабочей жидкости 100-300 л/га	-1
	2,0-4,0	Кукуруза	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до посева, одновременно с посевом или до всходов культуры. Расход рабочей жидкости 100-300 л/га	-1
	3,0-4,0	Картофель	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до посева, до всходов культуры. Реализация клубней разрешается не ранее, чем через 3 месяца после обработки. Расход рабочей жидкости 100-300 л/га	-1
	3,0-5,0	Соя, горох на зерно	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до посева или до всходов культуры. Расход рабочей жидкости 100-300 л/га	-1
ШАНСГАРД, к.с. (500 г/л) ООО «Шанс» П-3 29.03.2029 г.	1,5-3,0	Морковь (кроме пучкового товара)	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до посева, до всходов культуры или в фазе 1- 2 настоящих листьев. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	60 (1)
	2,0-3,5	Подсолнечник	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до посева, одновременно с посевом или до всходов культуры. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	60 (1)
	2,5-3,5	Соя, горох на зерно	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	60 (1)
	3,0	Нут	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	60 (1)
	2,0-3,5	Картофель (кроме раннего)	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	60 (1)

Пропизохлор

АЦЕТАЛ ПРО, к.э. (720 г/л) АО «Щелково Агрохим» П-3 14.04.2031 г.	2,0-3,0	Подсолнечник	Однолетние злаковые и некоторые двудольные	Опрыскивание почвы до всходов культуры.	60 (1)
		Соя, кукуруза, сафлор		Опрыскивание вегетирующих растений в фазу от 2 до 4 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков в условиях орошения или при наличии достаточной влажности	
				Опрыскивание почвы до всходов культуры	

Пропизохлор + кломазон

ПРОПОНИТ ДУО, к.э. (720 г/л + 30 г/л) ArystaLifeScience S.A.S П-3 10.10.2032 г.	2,0-2,8	Соя	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до посева, во время посева, сразу после посева, после появления всходов культуры	60(1)
	2,0 -2,8	Рапс яровой	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до посева, во время посева, сразу после посева, но до появления всходов культуры	60(1)

Римсульфурон

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 250 г/кг					
КАССИУС, в.р.п. (250 г/кг) АО «Щелково Агрохим» П-3 19.03.2028 г.	0,04-0,05 + ПАВ Сателлит, Ж 200 мл/га	Кукуруза	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу 2-6 листьев культуры, ранние фазы роста однолетних сорняков, при высоте злаковых сорняков (пырей) 10-15 см и в фазу розетки осотов в смеси с ПАВ	
30.12.2032 г.	0,04-0,05 + ПАВ Сателлит, Ж 200 мл/га	Картофель	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание при высоте картофеля 5-25 см, в фазу 2-4 листьев двудольных сорняков, высоте пырея ползучего 10-15 см	-1
	0,03 + ПАВ Сателлит, Ж 200 мл/га			Двукратное опрыскивание первое – при высоте картофеля 5-25 см, в фазу 2-4 листьев двудольных сорняков и высоте пырея ползучего 10-15 см; второе – не позднее 14 дней после первого	
	0,02 + ПАВ Сателлит, Ж 200 мл/га				
Ромул, в.д.г. (250 г/кг) ФОРВАРД П-3 03.02.2036 г.	0,04	Кукуруза	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением 200 мл/га ПАВ Неон 99	-1
	0,03+0,02	Картофель	Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посадок после окулировки по первой и второй волне сорных растений (интервал 10-20 дней) с добавлением 200 мл/га ПАВ Неон 99 (отдельно для каждой обработки)	60 (2)
	0,05	Картофель	Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посадок после окулировки, в ранние фазы развития (1-4 листа) однолетних сорных растений и при высоте пырея ползучего 10-15 см с добавлением 200 мл/га ПАВ Неон 9	60 (1)
	0,03+0,02	Кукуруза	Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры. Двукратное опрыскивание по первой и второй волне сорных растений (интервал 10-20 дней) с добавлением 200 мл/га ПАВ Неон 99 (отдельно для каждой обработки)	60 (2)
	0,05	Кукуруза	Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры при высоте злаковых сорных растений 10-15 см и в фазе розетки осотов с добавлением 200 мл/га ПАВ Неон 99	60 (1)
РИМУС 25%, в.д.г. (250 г/кг) ТОО «Агро-Хим-Лидер» П-3 28.03.2028 г.	0,07-0,08 + Тренд 90, 200 мл/га	Кукуруза (на зерно)	Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры (в период начала кущения однолетних злаковых) при высоте злаковых сорняков 10-15 см и в фазе розетки осотов. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60 (1)
	0,08 + Тренд 90, 200 мл/га	Картофель	Многолетние (пырей), однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	Опрыскивание посадок после окулировки, при высоте культуры 5-20 см, в ранние фазы развития (1-4 листа) однолетних сорняков и при высоте пырея 10- 15 см. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	-1
РИМКОРН, в.г. (250 г/кг) «DVA Agro GmbH», Германия «Jiangsu Repont Pesticide Factory Co., Ltd.», Китай П-3 16.03.2030 г.	0,04-0,05 + ПАВ Тренд 90, 200 мл/га	Кукуруза	Однолетние и многолетние злаковые сорняки и некоторые двудольные	Опрыскивание посевов в фазу 3-5 листьев (в период начала кущения однолетних злаковых и высоте многолетних сорняков 15-20 см)	-1
ТИТУС 25%, с.т.с. (250 г/кг) ТОО «Кортева Агрисаенс Казахстан» П-4 17.02.2030 г.	0,05 + ПАВ Тренд 90, 200 мл/га	Картофель	Однолетние и многолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	Опрыскивание посадок после окулировки, при высоте культуры 5-20 см, в ранние фазы развития (1-4 листа) однолетних сорняков, при высоте пырея 10- 15 см, осота – в фазу розетки	-1
ШАНТУС, в.д.г. (250 г/кг) ООО «Шанс» П-3 19.03.2029 г.	0,04 + ПАВ Шанс-90, Ж, 200 мл/га	Кукуруза	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков в смеси с ПАВ Шанс-90, Ж ООО «Шанс» двудольные (200 мл/га). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60 (1)

	0,05 + ПАВ Шанс-90, Ж, 200 мл/га	Кукуруза	Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры при высоте злаковых 10-15 см и в фазе розетки осотов в смеси с ПАВ Шанс- 90, Ж (200 мл/га). Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	60 (1)
	0,02-0,03 + ПАВ Шанс- 90, Ж, 200 мл/га	Кукуруза	Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры. Дробное опрыскивание по первой и второй волне сорняков (интервал 10- 20 дней) в смеси с ПАВ Шанс-90, Ж (200 мл/га). Расход рабочей жидкости 200- 300 л/га	60 (2)
	0,05 + ПАВ Шанс-90, Ж, 200 мл/га	Картофель	Многолетние (пырей), однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	Опрыскивание посадок после окучивания в ранние фазы развития (1-4 листа) однолетних сорняков и при высоте пырея 10-15 см в смеси с ПАВ Шанс-90, Ж (200 мл/га). Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	60 (1)
	0,02-0,03 + ПАВ Шанс- 90, Ж, 200 мл/га	Картофель	Многолетние (пырей), однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	Опрыскивание посадок после окучивания по первойволне и повторно по второй волне сорняков в смеси с ПАВ Шанс-90, Ж (200 мл/га). Расход рабочей жидкости 200- 300 л/га	60 (2)

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 500 г/кг

ЭСКУДО, в.д.г. (500 г/кг) АО Фирма «Август» П-3 17.09.2034 г.	0,020-0,025 + ПАВ АДЬЮ, Ж200 мл/га	Кукуруза	Однолетние и многолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки (пырей ползучий)	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости 50-300 л/га.	-(1)
	0,025 + ПАВ АДЬЮ, Ж 200 мл/га	Картофель	Однолетние и многолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки (свиной пальчатый)	Опрыскивание посадок после окучивания, в ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости 50-300 л/га.	-(1)
	0,025 + ПАВ АДЬЮ, Ж 200 мл/га	Томат посевной	Однолетние и многолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки (марь белая)	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости 50-300 л/га.	-(1)
	0,025+ ПАВ АДЬЮ, Ж 200 мл/га	Томат рассадный	Однолетние и многолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки (щирца запрокинутая)	Опрыскивание посевов через 15-20 дней после высадки рассады в грунт. Расход рабочей жидкости 50-300 л/га.	-(1)

Римсульфурон + никоссульфурон + мезотрион

МАХАОН ПРО, в.д.г. (35 г/кг + 120 г/кг + 370 г/кг) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия, П-3 25.01.2032 г.	0,3-0,35 + ПАВ Пикассо 50 мл/га	Кукуруза	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание в фазе 3-6 листьев кукурузы и ранние фазы роста сорняков (2-6 листьев у однолетних и при высоте 10-20 см у многолетних сорняков). При необходимости переосева в год применения можно высевать только кукурузу	60 (1)
---	------------------------------------	----------	---	--	--------

С-метолахлор

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 960 г/л

АВАНГАРД, к.э. (960 г/л) SHANDONG BINNONG TECHNOLOGY CO., LTD. П-3 16.09.2032 г.	1,0-1,5	Картофель	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры	60 (1)
	1,3-1,6	Подсолнечник, хлопчатник , соя, кукуруза, рапс	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	Опрыскивание до посева или до всходов культуры	60 (1)
ДОАЛ, к.э. (960 г/л) ТОО «Астана-Нан» П-3 17.04.2027 г.	1,0-1,5	Сафлор	Однолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание до посева или до всходов культуры	-1
	1,6-2,0	Свекла сахарная	Однолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание до посева или до всходов культуры	-1
	1,3-1,6	Подсолнечник, хлопчатник, соя, кукуруза, рапс	Однолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание до посева или до всходов культуры	-1
	1,0-1,5	Картофель	Однолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание почвы до всходов культуры.	-1
	1,0-1,5	Томаты	Однолетние злаковые и двудольные	Внесение препарата до высадки рассады культуры.	-1
ДУАЛ ГОЛД 960, к.э. (960 г/л) Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария П-3 12.11.2035 г.	1,0-1,5	Сафлор	Однолетние злаковые и некоторые двудольные	Опрыскивание до посева или до всходов культуры	-1
	1,6-2,0	Свекла сахарная			
	1,3-1,6	Подсолнечник, хлопчатник, соя, кукуруза, рапс			
27.10.2030 г.	1,0-1,5	Картофель	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры. В засушливых условиях рекомендуется мелкая заделка препарата (на глубину не более 5 см)	-1
	1,0-1,5	Томаты	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	Внесение препарата до высадки рассады культуры. В засушливых условиях рекомендуется мелкая заделка препарата (на глубину не более 5 см)	-1
09.03.2033 г.	1,5	Капуста	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	Внесение препарата до высадки рассады культуры. В засушливых условиях рекомендуется мелкая заделка препарата (на глубину не более 5 см).	-1
ДУШАНС, к.э. (960 г/л) ООО «Шанс» П-3 14.07.2031 г.	1,3-1,6	Кукуруза (на зерно) соя, подсолнеч ник, свекла сахарная	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до посева или до всходов культуры. В засушливых регионах рекомендуется мелкая заделка препарата (на глубину не более 5 см). Расход рабочей жидкости 200-400 л/га.	60 (1)

	1,3-1,6	Хлопчатник	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание до посева или до всходов культуры Расход рабочей жидкости 200-400 л/га.	- (1)
ДИФИЛАЙН, м.д., (960 г/л) ТОО «ФМРус» П-3 12.07.2033 г.	1,3-1,6	Подсолнечник, рапс яровой, соя, кукуруза	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости 200 -400 л/га	60(1)
МАЧЕТЕ, к.э. (960 г/л) ШАНДОНГ ВЕЙФАНГ РЕЙНБОУ КЕМИКАЛ КО., ЛТД, П-3 02.11.2027 г.	1,3-1,6	Подсолнечник	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	Опрыскивание до посева или до всходов культуры	-1
МЕТАЛ ПЛЮС 960, к.э. (960 г/л) ТОО «Agro Mark Kaz» П-3 17.03.2033 г.	1,0-1,5	Сафлор	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание до посева или до всходов культуры	-1
	1,6-2,0	Свекла сахарная	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание до посева или до всходов культуры	-1
	1,3-1,6	Подсолнечник, хлопчатник, соя, кукуруза, рапс	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание до посева или до всходов культуры	-1
НАВИЕТ, к.э. (960 г/л) ФОРВАРД П-3 02.09.2034 г.	1,3-1,6	Рапс, соя, подсолнечник	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до посева или до всходов культуры. В засушливых условиях рекомендуется мелкая заделка препарата (на глубину не более 5 см). Расход рабочей жидкости 200-400 л/га.	-(1)
СИМБА, к.э. (960 г/л) АО Фирма «Август» П-3 31.01.2029 г.	1,3-1,6	Соя, кукуруза, подсолнечник, рапс	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости 100-400 л/га	60 (1)
	1,6-2,0	Свекла сахарная	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости 100-400 л/га	60 (1)

С-метолахлор + тербутилазин

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 312,5 г/л + 187,5 г/л					
ГАРДО ГОЛД 500, с.э. (312,5 г/л + 187,5 г/л) SYNGENTA CROP PROTECTION AG П-3 28.02.2034 г.	3,0-4,0	Картофель, подсолнечник	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры	- (1)
ИРВИН, с.э. (312,5 г/л + 187,5 г/л) Представительство ООО «Агро Эксперт Групп» в РК П-3 30.05.2032 г.	3,0-4,0	Соя, подсолнечник	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до посева или до всходов культуры. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га.	60 (1)
СТАУТ, к.с. (312,5 г/л + 187,5 г/л) ШАНДОНГ ВЕЙФАНГ РЕЙНБОУ КЕМИКАЛ КО., ЛТД, П-3 13.06.2029 г.	3,0-4,0	Подсолнечник	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры	-1
	3,0-4,0	Кукуруза	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до посева, до всходов или после всходов культуры (до фазы 3 листьев). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60(1)
ЭРУДИТ, с.э. (312,5 г/л + 187,5 г/л) АО Фирма «Август» П-3 11.02.2029 г.	3,0-4,0	Подсолнечник, картофель	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60 (1)
	3,0-4,0	Кукуруза	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до всходов или после всходов культуры (до фазы 3-го листа). Расход рабочей жидкости 200- 300 л/га	60 (1)

С-метолахлор + тербутилазин + мезотрион

ФОРСАЖ, к.с. (375 г/л + 125 г/л + 37,5 г/л) Жеджанг Жонгшан Кемикал Групп Сток Ко., Лтд, Китай П-3 21.05.2028г.	3,0-4,0	Кукуруза	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов или после всходов культуры (до достижения фазы Злиста)	60 (1)
--	---------	----------	--	--	--------

Сетоксидим

Сарацин, к.э. (450 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-3 20.09.2034 г.	0,35-0,5	Лен масличный, рапс, горчица, подсолнечник	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев сорняков, независимо от фазы развития культуры	60 (1)
	0,6-0,8	Лен масличный, рапс, горчица, подсолнечник	Многолетние злаковые сорняки, в том числе пырей ползучий	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-20 см., независимо от фазы развития культуры	60 (1)

Тербутилазин + 2,4-Д кислота в виде сложного 2-этилгексилового эфира + никосульфурон

КОРНЕГИ, с.э. (250 г/л + 80 г/л + 30 г/л) АО «Щелково Агрохим» П-3 19.04.2032 г.	1,5-2,0	Кукуруза	Однолетние и многолетние двудольные и однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазу 3-5 листьев культуры	50 (1)
---	---------	----------	---	--	--------

Тербутилазин + топрамезон

Bang Topazine, к.с. (370 г/л + 30 г/л) Jiangxi Huihe Chemical Co. Ltd П-3 29.11.2034 г.	1,5-2,0	Кукуруза	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов	60 (1)
--	---------	----------	--	-------------------------------	--------

Тифенсульфурон-метил

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 750 г/кг					
АЛЛЕРТ, с.т.с. (750 г/кг) Представительство ООО «Агро Эксперт Групп» в РК П-3 27.08.2032 г.	0,006-0,008	Соя	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к МЦПА, сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 1 – 2 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков в смеси с ПАВ Бит-90, Ж (200 мл/га). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60(1)
	0,025	Лён масличный	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к МЦПА, сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе «ёлочки» культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60(1)
	0,01	Кукуруза	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4- Д и триазинам, сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков в смеси с ПАВ Бит-90, Ж (200 мл/га). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60(1)
АЛСИОН, в.д.г. (750 г/кг) АО Фирма «Август» П-3 20.06.2032 г.	0,01-0,015 + ПАВ Адыо, Ж (0,1% от объёма рабочей жидкости)	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев кущения культуры и ранние фазы роста сорняков	-(1)
	0,006-0,008 + ПАВ Адыо, Ж (0,1% от объёма рабочей жидкости)	Соя	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4- Д сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 1-2 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости 50-300 л/га	-(1)
	0,01-0,025 + ПАВ Адыо, Ж (0,1% от объёма рабочей жидкости)	Лен	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4- Д сорняки	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» культуры. Расход рабочей жидкости 50-300 л/га	-(1)
КАНОНИР, с.т.с. (750 г/кг) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-3 02.08.2031 г.	0,015-0,020 + ПАВ 200 мл/га	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2 листьев до конца кущения культуры.	-1
	0,010 + ПАВ 200 мл/га	Кукуруза	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры	-1
	0,010-0,025	Лен	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» культуры.	-1
КУПАЖ, в.д.г. (750 г/кг) АО «Щелково Агрохим» П-3 09.04.2031 г.	0,006-0,008	Соя	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4- Д и триазинам	Опрыскивание посевов в фазу 1-2 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков	-1
	0,01-0,025	Лен		Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам в фазу «елочки» культуры	-1
	0,01-0,015	Кукуруза		Опрыскивание посевов в фазу 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков	-1
Олвин, в.д.г. (750 г/кг) ФОРВАРД П-3 05.02.2036 г.	0,01-0,025 -	Лен долгунец и масличный	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4 -Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов льна в фазе «ёлочки» в смеси с Неон-99, 200 мл/га	- (1)
	0,015-0,02 -	Пшеница озимая	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4 -Д и МЦПА, и многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры в смеси с Неон-99, 200 мл/га	- (1)
	0,01-0,015	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4 -Д и МЦПА, и многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2 листьев до конца кущения культуры в смеси с Неон-99, 200 мл/га	- (1)
	0,01	Кукуруза	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4 -Д и триазинам, сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков в смеси с Неон-99, 200 мл/га	- (1)
	0,006-0,008	Соя	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 1 – 2 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков в смеси с Неон-99, 200 мл/га	- (1)
	0,02-0,025	Пшеница озимая	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4 -Д и МЦПА, и многолетние двудольные сорные растения -	Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры	(1)
	0,015-0,02	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4 -Д и МЦПА, и многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2 листьев до конца кущения культуры	- (1)
ТИФИ, в.д.г. (750 г/кг) ТОО «ФМРус» П-3 21.12.2033 г.	0,005-0,008 + ПАВ Эко РизоСпрей 50 мл/га	Соя	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 1-2 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости – 200- 300 л/га.	60(1)
	0,01-0,025	Лен	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к МЦПА	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» культуры. Расход рабочей жидкости 50-300 л/га.	-1
	0,01-0,025	Пшеница яровая	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к МЦПА	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости 200- 300 л/га.	-1
ХАРМОНИ ПРО, в.д.г. (750 г/кг) ТОО «ЭфЭмСи Агро Казахстан» П-3 17.02.2031 г.	0,006-0,008+ ПАВ Тренд 90, 150мл/га	Соя	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков в фазе 1-2 настоящих листьев культуры	-1
07.02.2034 г.	0,015	Кукуруза	Однолетние двудольные сорняки	Обработка поля в фазе 3-5 листьев культуры, ранние фазы развития сорняков	-1
	0,010+ Тренд 90, 200 мл/га	Кукуруза	Однолетние двудольные сорняки	Обработка поля в фазе 3-5 листьев культуры, ранние фазы развития сорняков	-1

	0,010-0,025	Лен	Однолетние двудольные сорняки	Обработка поля в фазе елочки льна, ранние фазы развития сорняков	-1
ШАНСТИ, в.д.г. (750 г/кг) ООО «Шанс» П-3 19.03.2029 г.	0,01 + ПАВ Микс, Ж, 200 мл/га	Кукуруза на зерно	Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4-Д и триазилам	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 культуры и ранние фазы роста сорняков в баковой смеси с ПАВ Микс, Ж (200 мл/га). Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	60 (1)
	0,015 + ПАВ Микс, Ж, 200 мл/га	Пшеница озимая	Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4-Д	Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры в смеси с ПАВ Микс, Ж (200 мл/га). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60(1)
	0,02-0,025	Пшеница озимая	Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4-Д	Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60 (1)
	0,01-0,015 + ПАВ Микс, Ж, 200 мл/га	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4-Д	Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры в смеси с ПАВ Микс, Ж (200 мл/га). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60 (1)
	0,015-0,02	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4-Д	Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	60 (1)
	0,006-0,008 + ПАВ Микс, Ж, 200 мл/га	Соя	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 1-2 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков в смеси с ПАВ Микс, Ж (200 мл/га). Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	60 (1)
	0,01-0,015 + ПАВ Микс, Ж, 200 мл/га	Лен- долгунец (только семенные посевы)	Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к МЦПА	Опрыскивание посевов весной -1 в фазе «елочки» культуры в смеси с ПАВ Микс, Ж (200 мл/га). Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	-1
	0,01-0,025	Лен- долгунец	Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к МЦПА	Опрыскивание посевов весной в фазе «елочки» культуры. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	-1
	0,025	Лен масличный	Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к МЦПА	Опрыскивание посевов весной в фазе «елочки» культуры. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	-1

Тифенсульфурон-метил + метсульфурон-метил

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 375 г/кг + 135 г/кг					
СПАРТА, в.д.г. (375 г/кг + 135 г/кг) ООО «Шанс» П-3 07.03.2029 г.	0,01–0,02	Лен масличный	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к МЦПА и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» культуры с добавлением ПАВ Шанс-90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	61(1)
	0,01–0,02	Пшеница яровая и озимая	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4 Д и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры с добавлением ПАВ Шанс-90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	61(1)
	0,01–0,02	Ячмень яровой и озимый	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4- Д и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры с добавлением ПАВ Шанс-90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	61(1)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 533 г/кг + 217 г/кг					
СТАНИС в.д.г. (533 г/кг + 217 г/кг) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-3 29.05.2034 г.	0,01 – 0,025	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе с 3-х листьев до 2-го междоузлия культуры	-(1)
	0,01 – 0,015	Лен масличный	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу «елочки» культуры	-(1)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 545 г/кг + 164 г/кг					
ГАРМОНИЯ, в.д.г. (545 г/кг + 164 г/кг) ТОО «Астана-Нан» П-3 20.12.2031 г.	0,015-0,018	Лён	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам в фазу ёлочки культуры	-1
РЕСТРИКТ, в.д.г. (545 г/кг + 164 г/кг) ТОО «ЭфЭмСи агро Казахстан», П-4 12.04.2033 г.	0,015-0,018	Лён	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам в фазу елочки культуры	-1
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 680 г/кг + 70 г/кг					
АККУРАТ ЭКСТРА, в.д.г. (680 г/кг + 70 г/кг) Кеминова А/С, Дания П-3 18.01.2028 г.	0,025-0,035	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х и некоторые многолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – до второго междоузлия культуры. На следующий год можно высевать только зерновые колосовые культуры	-1
КАНОНИР ДУО, с.т.с. (680 г/кг + 70 г/кг) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-3 20.04.2028 г.	0,015-0,020	Лен масличный	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов льна в фазу елочки культуры	-1
02.08.2031 г.	0,025-0,035	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – до второго междоузлия культуры. На следующий год можно высевать только зерновые-колосовые культуры	-1

СТРАЖ ДУО, в.д.г. (680 г/кг + 70 г/кг) ЛЕЙТОН АГРИО ЕВРОПА КФТ, Венгрия -3 25.02.2032 г.	0,025-0,035	Лен масличный	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов льна масличного в фазе «ёлочки». Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	-1
	0,025-0,035	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – до второго междоузлия культуры. На следующий год можно высевать только зерновые колосовые культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	-1

Тифенсульфурон –метил + флуметсулам + флорасулам.

ТАМПИЕР, м.д. (90 г/л + 24 г/л + 18 г/л) АО «Щелково Агрохим» П-3 12.03.2034 г.	0,25-0,3	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Однолетние и многолетние двудольные сорняки, включая виды осота, бодяка	Опрыскивание посевов от фазы кущения культуры до фазы формирования второго междоузлия (включительно) и ранние фазы роста сорняков. После весеннего применения препарата, осенью того же года на том же поле можно высевать озимые зерновые, озимый рапс и злаковые травы. Весной следующего года ограничения отсутствуют. В случае необходимости пресева, на том же поле можно высевать яровые зерновые, кукурузу, сорго. Не применять препарат на посевах зерновых с подсевом клевера, люцерны или других бобовых культур.	60 (1)
---	----------	--	---	---	--------

Трибенурон-метил

Концентрация д.в. (+/- 5%) ~ 750 г/кг					
АГРАСТАР, в.д.г. (750 г/кг) Hangzhou Ruijiang Crop Science Co., Ltd., Китай П-3 08.02.2029 г.	0,010-0,020 + ПАВ Тренд 90, 150 мл/га	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Обработка поля в ранние фазы развития сорняков до посева культуры	-1
	0,010-0,020 + ПАВ Тренд 90, 150 мл/га	Пары	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Ранние фазы развития сорняков	-1
	0,010-0,020 + ПАВ Тренд 90, 150 мл/га	Пшеница яровая	Однолетние и многолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д, осоты	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам (независимо от фазы развития культуры)	-(1)
	0,025-0,05 + ПАВ Самгау 0,03-0,05 л	Подсолнечник, устойчивый к препарату	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе от 2-4 до 6-8 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков (2-4 листа) в чистом виде или в смеси с ПАВ САМГАУ (30-50 мл). В случае необходимости пресева высевать зерновые культуры	-(1)
АРГАМАК, в.д.г. (750 г/кг) АО «ФМРус» П-3 18.02.2029 г.	0,015-0,020	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – начала кущения культуры и ранние фазы роста сорняков (2-4 листа). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60 (1)
	0,020-0,025	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х и бодяк полевой	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков (однолетние – 2-4 листа, бодяк полевой – розетка). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60 (1)
АЙТРИБУМ, в.д.г., (75%) (750 г/кг) Представительство Nanjing Rinchen International Trading Co., Ltd., в РК П-2 07.06.2033 г.	0,01-0,02 + ПАВ Тренд 90, 150 мл/га	Пшеница и ячмень яровые/Пшеница озимая. Ячмень яровой.	Однолетние и многолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и осоты	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам независимо от фазы развития культуры	-(1)
БАРОН ГОЛД, в.д.г. (750 г/кг) ОО «QADAM Group (КАДАМ Групп)» П-3 24.01.2034 г.	0,03 + ПАВ Тренд 90 – 150 мл/га	Подсолнечник, устойчивый к препарату	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу культуры от 2-8 листьев и ранние фазы роста сорняков	-1
	0,01-0,02 + ПАВ Тренд 90-150 мл/га	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Однолетние, многолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д, осоты	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости – 250-300 л/га	-(1)
БАРОН 750, в.д.г. (750 г/кг) Sinochem Agro CO, Ltd П-4 14.03.2028 г.	0,01-0,02 + ПАВ Тренд 90, 150 мл/га	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Однолетние, многолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д, осоты	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости – 250-300 л/га	-(1)
Богдэн, в.д.г. (750 г/кг) ФОРВАРД П-3 02.02.2036 г.	0,02-0,05	Подсолнечник (сорта и гибриды, устойчивые к трибенурон -метилу)	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 до 6-8 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков (2-4 листа)	-(1)
	0,015-0,025 0,015-0,025 (А)	Пшеница и ячмень яровые и озимые, овес	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения, в том числе устойчивые к 2,4-Д, МЦПА, бодяк полевой, виды осотов	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры (с фазы 2-3 листьев до начала формирования второго междоузлия культуры) и ранние фазы роста сорняков (однолетние – 2-4 листа, бодяк полевой – розетка). Расход рабочей жидкости 200-300 л/га, авиа – 25-50 л/га	-(1)

Бен Гур, в.д.г. (750 г/кг) Arysta LifeScience S.A.S П-3 05.02.2035 г.	0,01-0,02 + ПАВ 0,2 % от объема рабочей жидкости	Пшеница яровая	Однолетние и многолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4Д и 2М-4Х, осоты	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, независимо от фазы развития культуры	-(1)
	0,01-0,02 + ПАВ 0,2% от объема рабочей жидкости	Пшеница яровая	Однолетние и многолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4Д и 2М-4Х, осоты	Опрыскивание поля в ранние фазы развития сорняков до посева культуры	-(1)
	0,03 ПАВ 0,2% от объема рабочей жидкости	"Подсолнечник (сорта и гибриды, устойчивые к трибенурон-метилу)""	Однолетние и многолетние двудольные сорняки""	Опрыскивание посевов в фазу от 2-8 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков."	-(1)
DARINA, в.д.г. (750 г/кг) ТОО "Farm Agrochemical Products" П-3 04.05.2034 г.	0,01-0,02+ ПАВ	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч устойчивые к 2,4- Д	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев- до выхода в трубку.	60(1)
ГАЛЛАНТНЫЙ 75%, с.т.с. (750 г/кг) ТОО «Астана-Нан» П-4 13.12.2033 г.	0,01-0,02 + ПАВ Тренд 0,15 л/га	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4- Д, осоты	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев-до выхода в трубку	-1
ГАРПУН СУПЕР, в.д.г. (750 г/кг) ARCUS INVEST HOLDING B.V. П-3 04.03.2030 г.	0,01-0,02 + ПАВ 0,15л/га	Пшеница яровая, ячмень яровой и пшеница озимая	Однолетние и многолетние двудольные сорняки в т.ч. устойчивые к 2,4- Д	Опрыскивание в период вегетации	60(1)
	0,03 + ПАВ 0,15 л/га	Подсолнечник (устойчивый к трибенурон-метилу)	Однолетние и многолетние двухдольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу культуры от 2-8 листьев и ранние фазы роста сорняков	30(1)
ГОЛД ГРАНД, в.д.г. (750 г/кг) «Траст Кроп Протекшен Технологии Ко., Лтд», Китай П-4 31.01.2030 г.	0,01-0,02 + ПАВ Тренд 90, 150 мл/га	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние и многолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4- Д, осоты	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам (независимо от фазы развития культуры)	-1
	0,01-0,02 + ПАВ Тренд 90, 150 мл/га	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Обработка поля в ранние фазы развития сорняков до посева культуры	-1
	0,01-0,02 + ПАВ Тренд 90, 150 мл/га	Пары	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Ранние фазы развития сорняков	1
ГРАНАТ, в.д.г. (750 г/кг) АО «Щелково Агрохим» П-3 01.02.2034 г.	0,01- 0,02 + 150 мл/га ПАВ Сателлит, Ж.	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние и многолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4- Д сорняки, осоты	Опрыскивание посевов по вегетирующим (независимо от фазы развития культуры)	-1
	0,015-0,020	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние и многолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д сорняки, осоты	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам. (независимо от фазы развития культуры)	-1
	0,01- 0,02 + 150 мл/га ПАВ Сателлит, Ж.	Пшеница озимая	Однолетние и многолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4- Д сорняки, осоты	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам (независимо от фазы развития культуры)	-(1)
	0,015-0,020	Пшеница озимая	Однолетние и многолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д сорняки, осоты	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам (независимо от фазы развития культуры)	-(1)
ГРАНСТАР ПРО, в.д.г. (750 г/кг) ТОО «ЭфЭмСи Агро Казахстан», П-3 17.02.2031 г.	0,01-0,02 + ПАВ Тренд 90, 150 мл/га	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Однолетние и многолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д, осоты	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам (независимо от фазы развития культуры)	-1
13.01.2033 г.	0,01-0,02 + ПАВ Тренд 90, 150 мл/кг	Пшеница яровая и озимая	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Обработка поля в ранние фазы развития сорняков до посева культуры	-1
	0,01-0,02 + ПАВ Тренд 90, 150 мл/кг	Ячмень яровой и озимый	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Обработка поля в ранние фазы развития сорняков до посева культуры	-1
	0,01-0,02 + ПАВ Тренд 90, 150 мл/га	Пары	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Ранние фазы развития сорняков	-1
ГРИНСТАР ГОЛД, в.д.г. (750 г/кг) ТОО «GOOD JOB INDUSTRY KAZAKHSTAN» («ГУД ДЖОБ ИНДАСТРИ КАЗАХСТАН») П-3 28.02.2032 г.	0,015-0,020 + ПАВ 200 мл/га	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – начала кушения культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	-1
Гран-при, в.д.г. (750 г/кг) ООО «Интер Групп», П-3 17.03.2035 г.	0,015-0,020	Пшеница и ячмень яровые, овес	Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4- Д и 2М-4Х	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – начала кушения культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости 200- 300 л/га.	60 (1)
	0,020-0,025	Пшеница и ячмень яровые, овес	Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4- Д и 2М-4Х, и бодяк полевой	Опрыскивание посевов в фазе кушения культуры и ранние фазы роста сорняков. Озимые обрабатывают весной. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га.	60 (1)
	0,015-0,025	Подсолнечник, среднеустойчивый к гербициду Гран-При, ВДГ	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе от 2-4 до 6- 8 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков (2-4 листа) в чистом виде или в смеси с ПАВ ЛИП, Ж (200 мл/га). В случае необходимости пересева	60 (1)
	0,025-0,05	Подсолнечник, устойчивый к гербициду Гран-При, ВДГ	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе от 2-4 до 6- 8 настоящих листьев культуры и ранние	60 (1)

				фазы роста сорняков (2-4 листа) в чистом виде или в смеси с ПАВ ЛИП, Ж (200 мл/га). В случае необходимости пересева высевать зерновые культуры.	
ГРАФ, в.д.г. (750 г/кг) ТОО «Agro Mark Kaz» П-4 22.11.2033 г.	0,01-0,02 + ПАВ Тренд 90 150 мл/га	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Однолетние и многолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4- Д и осоты	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, независимо от фазы развития культуры. -1 (трибенурон-метил, 750 г/кг) Тренд 90 Расход рабочей жидкости 200- 300 л/га	-1
ГРОЗНЫЙ, в.д.г (750 г/кг) ТОО «AGRIANT» П-3 03.03.2036 г.	0,015-0,020 + ПАВ Твин 0,15 л/га	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4- Д и 2М-4Х сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – начала кушения культуры и ранние фазы роста сорняков	-1
	0,015-0,020 + ПАВ Твин 0,15 л/га	Пшеница озимая	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4- Д и 2М-4Х сорняки и бодяк полевой	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – начала кушения культуры и ранние фазы роста сорняков	-1
ГРОМСТОР 75%, в.д.г. (750 г/кг) ТОО «A.S.K. Technik» (А.С.К.Техник) Казахстан П-3 02.06.2027 г.	0,01-0,02	Пшеница яровая	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые 2,4-Д и 2М-4Х	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев до выхода в трубку. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	-1
	0,01-0,02	Пшеница озимая	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4- Д и 2М-4Х	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев до выхода в трубку. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	-1
	0,01-0,02	Ячмень яровой	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4- Д и 2М-4Х	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев до выхода в трубку. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	-1
19.01.2031 г.	0,030 + ПАВ 150 мл	Подсолнечник, устойчивый к данному гербициду	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу 2-8 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков	-(1)
ЕССЕНСТАР, в.д.г. (750 г/кг) НАНЬЦЗИН ЭССЕНС ФАЙН-КЕМИКАЛ КО. ЛТД П-3 26.03.2036 г.	10,0-20,0 г/га + ПАВ Тренд 90 150 мл/га	Пшеница яровая, озимая и ячмень яровые	Однолетние и многолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д сорняки, осоты	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам (независимо от фазы развития культуры)	-(1)
	15,0-25,0 г/га	Пшеница яровая, озимая и ячмень яровые	Однолетние и многолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д сорняки, осоты	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам (независимо от фазы развития культуры)	-(1)
КАСКАД, в.д.г. (750 г/кг) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-3 22.02.2033 г.	0,030 + ПАВ 150 мл/га	Подсолнечник (устойчивый к трибенурон-метилу)	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу культуры от 2-8 листьев и ранние фазы роста сорняков	-1
	0,010-0,020 + ПАВ Тренд 150 мл/га	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Однолетние и многолетние двудольные сорняки в т.ч устойчивые к 2,4-Д	Опрыскивание посевов в фазу культуры от 2-8 листьев и ранние фазы роста сорняков	-1
МАДЖЕСТИК, в.д.г. (750 г/кг) «Шандонг Биннонг Технолдж Ко., ЛТД», Китай П-3 06.11.2034 г.	0,01-0,02	Пшеница яровая и озимая, ячмень	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч устойчивые к 2,4- Д осоты	Опрыскивание посевов фазу культуры 2- 3 листьев до выхода в трубку	-1
	0,03	Подсолнечник	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу культуры 2- 8 листьев и ранние фазы роста сорняков	-1
МУСТАНГ 75%, в.д.г. (750 г/кг) ТОО «Дегеш Агро ЛТД», П-3 08.02.2027 г.	0,01-0,02 + ПАВ Тренд 90, 150 мл/га	Пшеница и ячмень яровые, пшеница озимая	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х и некоторые многолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев до выхода в трубку (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	-1
МОЕРСТАР 75%, с.т.с. (750 г/кг) «МОЕР Кемсайенс Ко., Лтд.», Китай П-3 14.03.2029 г.	0,01-0,02	Пшеница яровая	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4- Д и 2М-4Х и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов фазе 2-3 листьев – до выхода в трубку (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	-1
	0,01-0,02	Пшеница озимая	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4- Д и 2М-4Х и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – до выхода в трубку (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	-1
МОРТИРА, в.д.г. (750 г/кг) АО Фирма «Август» П-3 07.02.2029 г.	0,01-0,02 + ПАВ АДЬЮ 150 мл/га	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в период вегетации в ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости -50-300 л/га	60 (1)
14.06.2031 г.	0,025-0,05	Подсолнечник, устойчивый трибенурон-метилу	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 до 6-8 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков (2-4 листа). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	-1
	0,025-0,075			Опрыскивание в ранние фазы развития сорняков. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	
Премиум в.д.г. (750 г/кг) ТОО «Айбад-2015» П-3 16.06.2031 г.	0,015- 0,02+ПАВ 150 мл/га	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев- начало кушения культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	30(1)
	0,025- 0,05+ПАВ 150 мл/га	Подсолнечник, устойчивые к гербициду Гранд-Стар, в.д.г. (трибенурон-метил 750г/кг)	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе от 2-4 до 6-8 настоящих листьев- культуры и ранние фазы роста сорняков (2-4 листа) в чистом виде или в смеси с ПАВ Тренд 90, Ж (20 мл/га). В случае необходимости пересева высевать	30(1)
ПРОМЕТЕЙ, в.д.г. (750 г/кг) ООО «Ярило», Россия П-3 11.03.2036 г.	0,015-0,020 + ПАВ Дар- 90, 200мл/га	Пшеница и ячмень яровые и пшеница озимая	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4- Д и 2М-4Х	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – начала кушения культуры и ранние фазы роста сорняков в смеси с ПАВ ДАР-90 (200 мл/га)	60(1)
	0,02-0,025+ ПАВ Дар- 90, 200 мл/га	Пшеница и ячмень яровые и пшеница озимая	Однолетние и многолетние двудольные сорняки, в.т.ч. устойчивые к 2,4- Д и 2М-4Х, бодяк полевой, осоты	Опрыскивание посевов в фазе кушения культуры и ранние фазы роста сорняков в смеси с ПАВ ДАР-90 (200 мл/га). Озимые обрабатывают весной.	60(1)

	0,015 + ПАВ Дар-90, Ж, 200 мл/га	Подсолнечник, среднеустойчивый к препарату	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Последовательное опрыскивание посевов в фазе от 2-4 до 6-8 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков (2-4 листа) в чистом виде или в смеси с ПАВ Дар-90, Ж (200 мл/га). В случае необходимости пересева высевать зерновые культуры.	60(2)
	0,025-0,050 + ПАВ Дар- 90, Ж, 200 мл/га	Подсолнечник, устойчивый к препарату	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе от 2-4 до 6-8 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков (2-4 листа) в чистом виде или в смеси с ПАВ Дар-90, Ж (200 мл/га). В случае необходимости пересева высевать зерновые культуры.	60(1)
21.02.2030 г.	0,01–0,02	Поля, предназначенные под посев с/х культур	Однолетние двудольные и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной, применяется в качестве добавок к глифосат – содержащим гербицидам	-1
Ранер, в.д.г. (750 г/кг) ТОО «EcoSave» П-3 16.04.2036 г.	0,01-0,02 + ПАВ 150 мл/га	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние и многолетние двудольные сорные растения, в т.ч. устойчивые к 2,4 –Д, осоты	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам (независимо от фазы развития культуры)	-1
РЕСПЕКТ, в.д.г. (750 г/кг) Юнайтед Агри-Кемикал Компани ГмБХ, Швейцария П-3 12.04.2031 г.	0,01-0,02 + ПАВ Тренд 0,15 л/га	Пшеница яровая, ячмень яровой и пшеница озимая	Однолетние и многолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4- Д	Опрыскивание в период вегетации	-1
САЛЬВО, в.д.г. (750 г/кг) Жеджянг Жонгшан Кемикал ГрупСток Ко., Лтд, Китай П-3 18.01.2028 г.	0,02	Пшеница яровая	Однолетние и многолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4- Д, осоты	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам (независимо от фазы развития культуры)	-1
САННИ, в.д.г. (750 г/кг) ТОО «Астана-Нан» П-3 02.06.2036 г.	0,030 + ПАВ Тренд 90, 150 мл/га	Подсолнечник (устойчивый к гербициду Санни)	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу культуры от 2-8 листьев и ранние фазы роста сорняков	-1
САНФЛО, в.д.г. (750 г/кг) АО «Щелково Агрохим» П-3 09.04.2031 г.	0,03-0,035 + ПАВ Сателлит, Ж 150 мл/га	Подсолнечник (сорта и гибриды, устойчивые к трибенурон -метилу)	Однолетние и некоторые многолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазу от 2-4 до 6-8 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков (2-3 листа) в смеси с ПАВ	-1
Турбо Голд, в.д.г. (750 г/кг) ТОО «Golden Agro Plant» П-3 14.04.2036 г.	0,025–0,035 кг/га + ПАВ 0,15 л/га	Пшеница озимая	Однолетние и многолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д, осоты	Опрыскивание в период вегетации	-(1)
	0,025–0,035 кг/га + ПАВ 0,15 л/га	Ячмень яровой	Однолетние и многолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д, осоты	Опрыскивание в период вегетации	-(1)
	0,025–0,035 кг/га + ПАВ 0,15 л/га	Пшеница яровая	Однолетние и многолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д, осоты	Опрыскивание в период вегетации	- (1)
Трибун, с.т.с. (750 г/кг) ООО «Агро Эксперт Груп», Россия П-3 31.01.2035 г.	0,025-0,05	Подсолнечник (гибриды, устойчивые к трибенурон-метилу)	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2 – 8 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков (2-4 листа) в смеси с ПАВ Бит-90, Ж (0,2 л/га). Расход рабочей жидкости 200-300 л/га.	60(1)
	0,01-0,015	Пшеница и ячмень яровые, пшеница озимая	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры, озимых – весной в смеси с 200 мл/га ПАВ БИТ-90, ж в ранние фазы роста сорняков (2-4 листа). Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	60(1)
	0,015-0,02	Пшеница и ячмень яровые, пшеница озимая	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА и бодяк полевой	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры, озимых – весной в смеси с 200 мл/га ПАВ БИТ-90, ж в ранние фазы роста сорняков (2-4 листа) и розетки листьев бодяка полевого. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	60(1)
Трибин 750, в.д.г. (750 г/кг) ТОО «Достык-Агро 2012» П-3 30.05.2032 г.	0,01-0,02 + ПАВ Адьюгейт н 10%- 0,2 л/га	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние и многолетние двудольные сорняки в т.ч. устойчивые к 2,4Д, осоты	Опрыскивание посевов по вегетирующими сорнякам (независимо от фазы развития культуры)	-1
	0,03-0,04 + ПАВ Адьюфит в .э. 0,05 л/га	Подсолнечник, устойчивые к препарату	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе от 2-4 до 6-8 настоящих листьев культуры в ранние фазы роста сорняков (2-4 листьев). В чистом виде или в смеси с ПАВ Адьюфит в.э. (0,05 л/га)	-1
	0,01-0,02	Поля предназначенные под посев сельскохозяйстве нных культур	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной, применяется в качестве добавок к глифосатосодержащим гербицидам	-1
	0,05	Пары	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание в ранние развития сорняков	-1

ФИНИТО 750, в.д.г. (750 г/кг) «ДВА Агро ГмбХ», Германия П-3 13.01.2031 г.	0,01-0,02 + ПАВ Фаерланд 0,05 л/га	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4- Д, осоты	Опрыскивание в фазе 2-3 листьев – до выхода в трубку	-1
ФЛЮЕНС, в.д.г. (750 г/кг) П-3 ТОО «ЭфЭмСи Агро Казахстан» 10.03.2033 г.	0,03 + ПАВ Тренд 90, 150 мл/га	Подсолнечник, сорта и гибриды устойчивые к гербициду Флюенс	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе культуры от 2-8 листьев и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости 200 - 300 л/га.	60 (1)
ШАНСТАР, в.д.г. (750 г/кг) ООО «Шанс» П-3 20.03.2029 г.	0,02-0,025	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4- Д и 2М-4Х, и бодяк полевой	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков (однолетние – 2-4 листа, бодяк полевой – розетка). Озимые обрабатываются весной. Расход рабочей жидкости-200- 300л/га	60(1)
	0,025-0,05	Подсолнечник устойчивый к гербициду Шанстар в.д.г. (750 г/кг трибенурон - метила)	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе от 2–4 до 6–8 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков (2–4) лист. В случае необходимости пересева высевать зерновые культуры. Расход рабочий жидкости – 200–300 л/га	60(1)
ХАЙПРО ЭКСТРА, в.д.г. (750 г/кг) ШАНДОНГ ВЕЙФАНГ РЕЙНБОУ КЕМИКАЛ КО., ЛТД, П-3 25.12.2034 г.	0,01-0,02 + ПАВ 0,15 л/га	Яровая и озимая пшеница	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4- Д и 2М-4Х, и бодяк полевой	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – до выхода в трубку	- (1)
	0,03 + ПАВ 150 мл/га	Подсолнечник	Однолетние и многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазу 2-8 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков	- (1)
ЭНТОСТАР 75% в.д.г. (750 г/кг) IFODA AGRO KIMYO NIMOYA, Узбекистан П-3 30.01.2035 г.	0,01 - 0,02 + ПАВ Тренд 90 150 мл/га	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние и многолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, осоты	Опрыскивание посевов с фазы 2-3 листьев до выхода в трубку	- (1)
ЭКСПРЕСС, в.д.г. (750 г/кг) ТОО «ЭфЭмСи Агро Казахстан» П-3 13.01.2031 г.	0,03 + ПАВ Тренд 90 150 мл/га	Подсолнечник (устойчивый к гербициду Экспресс)	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу культуры от 2-8 листьев и ранние фазы роста сорняков	-1

Трибенурон-метил + амидосульфурон

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 350 г/кг + 350 г/кг					
ГЕРСОТИЛ ЭКСТРА, в.д.г. (350 г/кг + 350 г/кг) ООО «ХИМАГРОМАРКЕТИНГ.РУ», Россия П-3 18.01.2028 г.	0,035-0,055	Пшеница яровая	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов от фазы 2-3 листа до флагового листа культуры	30 (1)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 500 г/кг + 250 г/кг					
МАГЕЛЛАН, в.д.г. (500 г/кг + 250 г/кг) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-3 19.03.2029 г.	0,01-0,02 + ПАВ Пикассо, 150 мл/га	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние и многолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4-Д	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры. Расход рабочей жидкости– 200-300 л/га	-1

Трибенурон-метил + амидосульфурон + флорасулам

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 450 г/кг + 210 г/кг + 90 г/кг					
МАГЕЛЛАН ФОРТЕ, в.д.г. (450 г/кг + 210 г/кг + 90 г/кг) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-3 25.02.2030 г.	0,015-0,025 + ПАВ 150 мл/га	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры	-1
Ранер Топ, в.д.г. (450 г/кг + 210 г/кг + 90 г/кг) ТОО «EcoSave» П-3 27.03.2036 г.	0,015-0,025 + ПАВ 150 мл/га	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры	-1

Триасульфурон

Логран 750, в.д.г. (750 г/кг) SYNGENTA CROP PROTECTION AG П-3 21.05.2035 г.	0,01-0,02	Яровой ячмень	Однолетние двудольные, в т.ч . устойчивые к 2, 4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов до фазы выхода в трубку (1–2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста однолетних сорняков и в фазе розетки (диаметром до 5 см) многолетних сорняков в случае крайней необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока (позднее появление однолетних сорняков, слабое засорение многолетними). Применять на почвах с рН не выше 7,5. При необходимости пересева высевать только озимую и яровую пшеницу. Не применять на зерновых с подсевом бобовых или в тех случаях, когда растения находятся в стрессовом состоянии (неблагоприятные погодные условия, избыточное переувлажнение).	-1
--	-----------	---------------	---	--	----

	0,01-0,02	Яровая пшеница	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2, 4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов до фазы выхода в трубку (1–2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста однолетних сорняков и в фазе розетки (диаметром до 5 см) многолетних сорняков в случае крайней необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока (позднее появление однолетних сорняков, слабое засорение многолетними). Применять на почвах с рН не выше 7,5. При необходимости пересева высевать только озимую и яровую пшеницу. Не применять на зерновых с подсевом бобовых или в тех случаях, когда растения находятся в стрессовом состоянии (неблагоприятные погодные условия, избыточное переувлажнение)..	-1
--	-----------	----------------	---	--	----

Трибенурон-метил + МЦПА

БРАНДЕР, с.п. (50 г/кг + 680 г/кг) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-4 29.05.2030 г.	0,3	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры	-1
--	-----	-------------------------	---	--	----

Трибенурон-метил + тифенсульфурон-метил

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 225 г/л + 76 г/л					
Полиан, м.д. (225 г/л + 76 г/л) Представительство ООО «Агро Эксперт Групп» в РК П-3 16.09.2034 г.	0,05-0,08	Пшеница яровая	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу 2-3 листа – выхода в трубку (1-2 междоузлия культуры) и ранние фазы роста сорняков или в фазу появления флагового листа при позднем прорастании многолетних двудольных сорняков в смеси с 0,2 л/га ПАВ Бит-90, Ж. Расход рабочей жидкости 100- 300 л/га.	-(1)
	0,05-0,08	Пшеница яровая	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу 2-3 листа – выхода в трубку (1-2 междоузлия культуры) и ранние фазы роста сорняков или в фазу появления флагового листа при позднем прорастании многолетних двудольных сорняков. Расход рабочей жидкости – 100-300 л/га.	-(1)
	0,05-0,08	Ячмень яровой	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу 2-3 листа – выхода в трубку (1-2 междоузлия культуры) и ранние фазы роста сорняков или в фазу появления флагового листа при позднем прорастании многолетних двудольных сорняков в смеси с 0,2 л/га ПАВ Бит-90, Ж. Расход рабочей жидкости – 100-300 л/га.	-(1)
	0,05-0,08	Ячмень яровой	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу 2-3 листа – выхода в трубку (1-2 междоузлия культуры) и ранние фазы роста сорняков или в фазу появления флагового листа при позднем прорастании многолетних двудольных сорняков. Расход рабочей жидкости 100-300 л/га.	-(1)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 375 г/кг + 375 г/кг					
КАСКАД ФОРТЕ, в.д.г. (375 г/кг + 375 г/кг) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-3 26.02.2035.	0,025-0,035 + ПАВ Тренд 150 мл/га	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Однолетние и многолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д	Опрыскивание посевов фазе 2-3 листьев – до выхода в трубку.	-1
РЕСПЕКТ ФОРТЕ, в.д.г. (375 г/кг + 375 г/кг) Юнайтед Агри-Кемикал Компани ГмбХ, Швейцария П-4 12.04.2031 г.	0,025-0,035 + ПАВ Тренд 0,15 л/га	Пшеница яровая, ячмень яровой и пшеница озимая	Однолетние и многолетние двудольные сорняки к 2,4-Д	Опрыскивание в период вегетации	-1
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 500 г/кг + 250 г/кг					
ГРАНСТАР МЕГА, в.д.г. (500 г/кг + 250 г/кг) ТОО «ЭфЭмСи Агро Казахстан», П-3 13.01.2033 г.	0,009-0,027 +Тренд 90, 150 мл/га	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Ранние фазы развития сорняков, независимо от фазы развития культуры	-(1)
	0,009-0,027 + 150 мл/га ПАВ Тренд 90, Ж	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Обработка поля в ранние фазы развития сорняков до посева культуры.	60(1)
	0,009-0,027 + 150 мл/га ПАВ Тренд 90, Ж	Пары	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Ранние фазы развития сорняков	60(1)
РАЙЗЕН, в.д.г. (500 г/кг + 250 г/кг) ТОО «QADAM Group» (Кадам Групп) П-3 04.03.2036 г.	0,015-0,025	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Ранние фазы развития сорняков, независимо от фазы развития культуры	-(1)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 670 г/кг + 80 г/кг					
Каскад Экспресс, в.д.г. (670 г/кг+80 г/кг) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-3 27.12.2034	0,03 + ПАВ 0,15 л/га	Подсолнечник (устойчивый к трибенурон – метилу и тифенсульфурон – метилу)	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу культуры от 2-8 листьев и ранние фазы роста сорняков	- 1
МОСКИТ ФОРТЕ, в.д.г. (670 г/кг + 80 г/кг) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-3 13.03.2028 г.	0,01-0,02+ ПАВ Пикассо 150 мл/га	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние и многолетние двудольные сорняки к 2,4-Д	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам независимо от фазы развития культуры	-1

Трибенурон-метил + тифенсульфурон-метил + флорасулам

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 310 г/кг + 300 г/кг + 103 г/кг					
ТРИБЬЮТ, в.д.г. (310 г/кг + 300 г/кг + 103 г/кг) ЛЕЙТОН АГРИО ЕВРОПА КФТ ВЕНГРИЯ П-3 09.03.2032 г.	0,03-0,05 + ПАВ 0,2 л/га	Пшеница яровая и ячмень яровой	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов от фазы кушения культуры до фазы формирования второго междоузлия и ранние фазы роста сорняков в смеси с 200 мл/га ПАВ. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	-1
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 410 г/кг + 140 г/кг + 200 г/кг					
Ранер Форте, в.д.г. (410 г/кг + 140 г/кг + 200 г/кг) ОО «EcoSave» П-3 27.03.2036 г.	0,010-0,020 кг/га + ПАВ 150 мл/га	Пшеница яровая и ячмень яровой	Однолетние и многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кушения культуры	-1
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 597 г/кг + 103 г/кг + 75 г/кг					
РИАНОН, в.д.г. (597 г/кг + 103 г/кг + 75 г/кг) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-3 27.01.2036 г.	0,01-0,02 + ПАВ Пикассо 50 мл/га	Пшеница яровая и ячмень яровой	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе с 3 -х листьев до 2-го междоузлия культуры	-1

Трибенурон-метил + флорасулам

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 500 г/кг + 104 г/кг					
СТАТУС ГРАНД, в.д.г. (500 г/кг + 104 г/кг) Филиал «ЗЕМЛЯКОФФ КРОП ПРОТЕКШЕН» в РК П-3 17.03.2032 г.	0,03-0,04	Пшеница и ячмень яровые и озимые.	Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4- Д и 2М- 4Х и некоторые многолетние двудольные сорняки.	Опрыскивание посевов от фазы кушения культуры до фазы формирования второго междоузлия и ранние фазы роста сорняков. Озимые культуры обрабатываются весной. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	-1
ШАНСТАР ПЛЮС, в.д.г. (500 г/кг + 104 г/кг) ООО «Шанс» П-3 09.01.2033 г.	0,03–0,04	Пшеница, ячмень яровые и озимые	Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4Д и 2М-4Х и некоторые многолетние двудольные сорняки.	Опрыскивание посевов от фазы кушения культуры до фазы формирования второго междоузлия и ранние фазы роста сорняков. Озимые обрабатываются весной. Расход рабочей жидкости – 200–300 л/га.	60(1)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 563 г/кг + 187 г/кг					
БОМБА, в.д.г. (563 г/кг + 187 г/кг) АО Фирма «Август» П-3 29.01.2028 г.	0,015-0,025 + ПАВ АДЬЮ 200 мл/га	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов от фазы кушения до фазы формирования второго междоузлия и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости – 50-300 л/га	-1
МОСКИТ ПРЕМИУМ, в.д.г. (563 г/кг + 187 г/кг) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-3 26.01.2027 г.	0,015-0,02 + ПАВ 150 мл/га	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу кушения культуры	-1
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 600 г/кг + 150 г/кг					
КАСКАД ПРО, в.д.г. (600 г/кг + 150 г/кг) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-3 10.10.2033 г.	0,01-0,02 + ПАВ Пикассо 50 мл/га	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе с 3-х листьев до 2- го междоузлия культуры	-(1)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 600 г/кг + 200 г/кг					
КАЙМАН, в.д.г. (600 г/кг + 200 г/кг) ТОО «ЭфЭмСи Агро Казахстан» П-3 07.02.2035 г.	0,015-0,025	Пшеница, ячмень яровые и озимые	Однолетние двудольные, в т.ч . устойчивые к 2, 4-Д и МЦПА и некоторые многолетние двудольные сорняки.	Наземное опрыскивание посевов от фазы кушения культуры до фазы формирования второго междоузлия и ранние фазы роста сорняков в смеси с 150 мл/га ПАВ Тренд 90. Озимые культуры обрабатываются весной. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га.	-(1)

Трибенурон-метил + флорасулам + тифенсульфурон-метил

КАСКАД ПРЕМИУМ, в.д.г. (410 г/кг + 200 г/кг + 140 г/кг) Синтезия Кеми ГмбХ», Германия П-3 13.03.2028 г.	0,01-0,02 + ПАВ Пикассо 150 мл/га	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу кушения культуры	-1
--	---	----------------------------	--	---	----

Трифлусульфурон-метил

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 500 г/кг					
КАЗУАР, в.д.г. (500 г/кг) АО «Щёлково Агрохим», Россия П-3 11.04.2029 г.	0,03 + ПАВ Сателлит, Ж 200 мл/га	Свекла сахарная	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу семядоли – 2 настоящих листа сорняков в смеси с 200 мл/га ПАВ Сателлит, Ж. Расход рабочей жидкости 200- 300 л/га	-1

КАРИШАНС, в.д.г. (500 г/кг) ООО «Шанс» П-3 26.07.2032 г.	0,03	Свекла сахарная	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе семядоли – 2 настоящих листа у сорняков и при необходимости по второй волне сорняков в смеси с 200 мл/га ПАВ Шанс-90, Ж при каждой обработке. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	60(2)
Флурон, в.д.г. (500 г/кг) ТОО «Агро-Хим-Лидер» П-3 29.08.2034 г.	0,05	Свекла сахарная	Однолетние двудольные, в том числе марь белая, щирица	Опрыскивание посевов в фазе сорняков семядоли – 2 настоящих листа и при необходимости повторно через 7-15 дней по второй волне сорняков в фазе 2 настоящих листьев в смеси с 1,5-2 л/га препаратов на основе десмедифама, фенмедифама и 200 мл/га Тренд 90, Ж. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	60(2)
	0,03	Свекла сахарная	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе сорняков семядоли - 2 настоящих листа и при необходимости повторно через 7-15 дней по второй волне сорняков в фазе 2 настоящих листьев в смеси с 200 мл/га Тренд 90, Ж. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 750 г/кг					
ТРИЦЕПС, в.д.г. (750 г/кг) АО Фирма «Август» П-3 29.01.2028 г.	0,02 + ПАВ АДЬЮ 200 мл/га	Свекла сахарная	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе семядоли – 2 настоящих листа сорняков и при необходимости повторно через 7- 15 дней по второй волне сорняков в фазе 2-х настоящих листьев. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	-(2)

Феноксапроп-п-этил

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 90 г/л					
ФЕРЕНЦ, к.э. (90 г/л) Лейтон Агрио Европа КФТ Венгрия П-3 12.04.2028 г.	0,6-0,9	Подсолнечник, рапс, соя	Однолетние злаковые сорняки (овсюг, просо куриное и сорнополевое, виды щетинника)	Опрыскивание по вегетирующим сорнякам в фазе 2-4 листьев	-1
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 110 г/л					
ФЕНОВА ЭКСТРА 11%, в.э. (110 г/л) Кеминова А/С Дания П-3 17.02.2030 г.	0,5-0,75	Рапс	Однолетние злаковые сорняки (овсюг, просо куриное, виды щетинника, метлица)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2-3 листьев до конца кущения сорных злаков (независимо от фазы развития культуры). Норма расхода рабочей жидкости 200 л/га	-1
	0,5-0,75	Свекла сахарная, столовая, кормовая, соя	Однолетние злаковые сорняки (овсюг, просо куриное, виды щетинника, метлица)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2-3 листьев до конца кущения сорных злаков (независимо от фазы развития культуры). Норма расхода рабочей жидкости 200 л/га	-1
ФУРОРЕ УЛЬТРА, э.м.в. (110 г/л), Байер КропСайенс АГ, Германия П-4 15.04.2031 г.	0,5-0,75	Подсолнечник, соя (на зерно и масло), рапс (на семена и масло), горох (на зерно), лен	Однолетние злаковые сорняки (овсюг, виды щетинника, просо куриное)	Опрыскивание в период вегетации	-1
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 120 г/л					
ОРЕОЛ 12%, к.э. (120 г/л) ТОО «Агрохимия» П-3 15.11.2027 г.	0,75-1,5	Свекла сахарная, соя, картофель, лук, рапс	Однолетние, многолетние злаковые сорняки, в т.ч. пырей ползучий, гумай	Опрыскивание посевов с фазы 2-х листьев до стеблевания у сорняков	-1
17.02.2030 г.	0,75-1,5	Подсолнечник	Однолетние и многолетние злаковые сорняки, в т.ч. пырей ползучий, гумай	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам	-1

Феноксапроп-п-этил + 2,4-Д эфир + флоквентосет-мексил (антимет)

СКАУТ КОМБИ, к.э. (95 г/л + 381 г/л + 24 г/л) «Синтезия Кеми ГмбХ», Германия П-3 27.03.2029 г.	0,75-0,85	Пшеница яровая	Однолетние злаковые и однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов с фазы 3-х листьев до 2-го междоузлия культуры. Расход рабочей жидкости – 150-200 л/га.	-1
---	-----------	----------------	---	--	----

Феноксапроп-п-этил + клодинафоп-пропаргил + флоквентосет-мексил (антимет)

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 48,5 г/л +170 г/л + 57 г/л					
ЛЕГГЕРО ЭКСТРИМ, к.э. (48,5 г/л +170 г/л + 57 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-3 07.04.2032 г.	0,3-0,35	Пшеница яровая	Просянки, щетинники, овсюг	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков независимо от фазы развития культуры	-(1)
	0,2-0,3	Пшеница яровая	Овсюг	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков независимо от фазы развития культуры	-(1)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 50 г/л+ 80 г/л + 25 г/л					
ЛЕГГЕРО ПРО, к.э. (50 г/л+ 80 г/л + 25 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-3 16.11.2032 г.	0,5	Пшеница яровая	Просянки, щетинники, овсюг	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков независимо от фазы развития культуры	-(1)
	0,3 – 0,4	Пшеница яровая	Овсюг	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков независимо от фазы развития культуры	-(1)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 90 г/л + 45 г/л + 34,5 г/л					
ЗИОНИС, к.э. (90 г/л + 45 г/л + 34,5 г/л) ТОО «QADAM Group» (Кадам Групп) П-3	0,33-0,5	Пшеница яровая	Однолетние злаковые сорняки (овсюг, просо куриное,	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам,	-(1)

04.03.2036 г.					
МАЭСТРО 135, к.э. (90 г/л + 45 г/л + 34,5 г/л) ТОО «Бартонс Кемикал ГмбХ» П-3 16.03.2031 г.	0,3-0,35	Пшеница яровая	Однолетние злаковые сорняки, (овсюг, куриное просо, виды щетинника, метлица обыкновенная)	Опрыскивание посевов в ранние фазы сорняков (3-4 листа)	-(1)
	0,3-0,43	Пшеница яровая	Однолетние злаковые сорняки (овсюг, просо куриное, виды щетинника, метлица обыкновенная)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2-3 листьев до конца кущения сорных злаков (независимо от фазы развития культуры)	-(1)
ПЕГАС 13,5 %, к.э. (90 г/л + 45 г/л + 34,5 г/л) ТОО «Агро Глобал» Казахстан П-3 08.01.2029 г.	0,33-0,45	Пшеница яровая и озимая	Однолетние злаковые сорняки (овсюг, просо куриное, виды щетинника, метлица)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2-3 листьев до конца кущения сорных злаков (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости – 200 л/га	-1
Рекорд М, к.э. (90 г/л + 45 г/л + 34,5 г/л) ТОО «Бартонс Кемикал ГмбХ» П-3 16.01.2036 г.	0,3-0,43	Пшеница яровая	Однолетние злаковые сорняки (овсюг, просо куриное, виды щетинника, метлица обыкновенная)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2-3 листьев до конца кущения сорных злаков (независимо от фазы развития культуры).	-1
Фаялит, к.э. (90 г/л + 45 г/л + 34,5 г/л) ТОО «Астана-Нан» П-3 16.01.2036 г.	0,33-0,45	Пшеница яровая и озимая	Однолетние злаковые сорняки (овсюг, просо куриное, виды щетинника, метлица)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2-3 листьев до конца кущения сорных злаков (независимо от фазы развития культуры).	60 (1)
ФОКСТРОТ ЭКСТРА 13,5%, к.э. (90 г/л + 45 г/л + 34,5 г/л) Кеминова А/С, Дания П-3 14.12.2032 г.	0,33-0,45	Пшеница яровая и озимая	Однолетние злаковые сорняки (овсюг, просо куриное, виды щетинника, метлица)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2-3 листьев до конца кущения сорных злаков (независимо от фазы развития культуры). Норма расхода рабочей жидкости 200 л/га	-1
ЭРЛИКОН, к.э. (90 г/л + 45 г/л + 34,5 г/л) Синтезия Кемп ГмбХ, Германия П-3 13.03.2029 г.	0,33-0,45	Пшеница яровая	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости – 150-200 л/га	-(1)
	0,33 – 0,55	Пшеница яровая	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам (независимо от фазы развития культуры)	-(1)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 90 г/л + 45 г/л + 40 г/л					
ЭКСПИБРИС. микромульсия (90 г/л + 45 г/л + 40 г/л) АО «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ» П-3 01.03.2034	0,4 – 0,5	Пшеница яровая и озимая	Однолетние злаковые сорняки (в том числе виды щетинника, просо куриное, просо сорополе вое, овсюг, метлица полевая).	Опрыскивание посевов по вегетирующим злаковым сорнякам (от 2-3 листьев до конца кущения) независимо от фазы развития культуры. Озимая пшеница обрабатывается весной.	60(1)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 90 г/л + 60 г/л + 40 г/л					
ЛАСТИК ТОП, м.к.э. (90 г/л + 60 г/л + 40 г/л) АО Фирма «Август» П-4 10.02.2033 г.	0,4-0,5	Пшеница яровая	Однолетние злаковые сорняки (овсюг, щетинники, просянки).	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2 – 3 листа) сорняков независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости – 50-200 л/га	60(1)
	0,4-0,5	Пшеница озимая	Однолетние злаковые сорняки (овсюг, щетинники, просянки).	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2 – 3 листа) сорняков независимо от фазы развития культуры. Озимая пшеница обрабатывается весной. Расход рабочей жидкости – 50-200 л/га	60(1)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 90 г/л + 60 г/л + 60 г/л					
ОРИКС, к.э. (90 г/л + 60 г/л + 60 г/л) ООО «Агро Эксперт Групп», Россия П-3 24.01.2027 г.	0,4-0,6	Пшеница яровая	Однолетние злаковые сорняки, в т.ч. овсюг, виды щетинника, просо куриное и др.	Опрыскивание посевов по вегетирующим злаковым сорнякам (от 2-3 листьев до конца кущения) независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости – 150-200 л/га	-1
19.08.2029 г.	0,4-0,6	Тритикале	Однолетние злаковые сорняки, в т.ч. овсюг, виды щетинника, просо куриное и др.	Опрыскивание посевов по вегетирующим злаковым сорнякам (от 2-3 листьев до конца кущения) независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости 150-200 л/га	-1
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 140 г/л + 90 г/л + 60 г/л					
Грамот Голд, к.э. (140 г/л + 90 г/л + 60 г/л) ТОО «Golden Agro Plant» П-3 17.04.2036 г.	0,3-0,4	Пшеница яровая	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры	-(1)
Кловит Плюс к.э. (140 г/л + 90 г/л + 60 г/л) ШАНДОНГ ВЕЙФАНГ РЕЙНБОУ КЕМИКАЛ КО., ЛТД, П-3 18.05.2033 г.	0,4-0,6	Озимая пшеница	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорняков независимо от фазы развития культуры	-1
	0,3-0,4	Яровая пшеница	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорняков независимо от фазы развития культуры	-1
КУГАР, к.э. (140 г/л + 90 г/л + 60 г/л) Юнайтед Агри-Кемикал Компани ГмбХ, Швейцария П-4 12.04.2031 г.	0,3-0,4	Пшеница яровая	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры	-1
МОДЕРН СУПЕР 230 к.э. (140 г/л + 90 г/л + 60 г/л) Филиал "Hangzhou Ruijiang Crop Science Co.,Ltd., Казахстан" П-3 12.04.2033 г.	0,3-0,4	Пшеница яровая	Однолетние злаковые (овсюг, виды щетинника, просо куриное, метлица обыкновенная) сорняки	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам (независимо от фазы развития культуры)	-(1)
	0,3-0,5	Пшеница озимая	Однолетние злаковые (овсюг, виды щетинника, просо куриное, метлица обыкновенная) сорняки	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам (независимо от фазы развития культуры)	-(1)

Пегас Экстра, к.э. (140 г/л + 90 г/л + 60 г/л) ТОО «Агро Глобал» П-3 29.12.2035 г.	0,3-0,4	Пшеница яровая	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры	-1
ПОЛГАР, к.э. (140 г/л + 90 г/л + 60 г/л) Лейтон Агрио Европа КФТ Венгрия П-3 14.03.2027 г.	0,3-0,4	Пшеница яровая	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры	-1
СУПЕР АЛЪЯНС, к.э., (140 г/л + 90 г/л + 60 г/л) ТОО "Еco Harvest Group П-3 07.04.2033 г.	0,3-0,4	Пшеница яровая	Однолетние злаковые (овсюг, виды щетинника а, просо куриное, метлица обыкновенная) сорняки	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам (независимо от фазы развития культуры)	-1
ТРИБЬЮТ, к.э. (140 г/л + 90 г/л + 60 г/л) ТОО «Айбад-2015» П-3 16.06.2031 г.	0,3 – 0,4	Пшеница и ячмень яровые	Комплекс однолетних злаковых сорняков (овсюг обыкновенный, просянки виды, щетинники виды)	Опрыскивание посевов по вегетирующим злаковым сорнякам (от 2-3 листьев до конца кущения) независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости – 150-300 л/га	-1
ТРИМИКС КОМБИ, к.э. (140 г/л + 90 г/л + 60 г/л) ТОО «Достык-Агро 2012» П-3 27.11.2030 г.	0,3-0,4	Пшеница яровая	Однолетние злаковые сорняки (овсюг, проса куриное и виды щетинника)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам (независимо от фазы развития культуры)	-1
ФЕНОКС ЭКСТРА, к.э. (140 г/л + 90 г/л + 60 г/л) ТОО «Agro Mark Kaz» П-3 21.04.2030 г.	0,3-0,4	Пшеница яровая	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2-го листа до конца кущения (независимо от фазы развития культуры). Норма расхода рабочей жидкости 200-300 л/га	-1
Фокстер, к.э. (140 г/л + 90 г/л + 60 г/л) ШАНДОНГ ВЕЙФАНГ РЕЙНБОУ КЕМИКАЛ КО., ЛТД, П-3 11.03.2036 г.	0,3-0,4	Пшеница яровая	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры	-1

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 140 г/л + 90 г/л + 72 г/л

БОТАКАН СУПЕР, к.э. (140 г/л + 90 г/л + 72 г/л) Наньцзин Эссенс Файн-Кемикал Со., Лтд, Китай П-3 09.09.2029 г.	0,4-0,6	Пшеница яровая	Однолетние злаковые сорняки (овсюг, виды щетинника, просо куриное, метлица обыкновенная)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га	-1
	0,4-0,6	Пшеница озимая	Однолетние злаковые сорняки (овсюг, виды щетинника, просо куриное, метлица обыкновенная)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2-го листа до конца кущения (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости 100-200 л/га	-1
Кросс Фит, к.э. (140 г/л + 90 г/л + 70 г/л) ТОО «ЕcoSave» П-3 17.04.2036 г.	0,35	Пшеница яровая	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2 -го листа до конца кущения (независимо от фазы развития культуры)	-(1)
LIVRO, к.э. (140 г/л + 90 г/л + 72 г/л) ТОО « Farm Agrochemical Products» П-3 11.06.2034 г.	0,3-0,4	Пшеница яровая	Однолетние злаковые сорняки (овсюг, куриное просо, виды щетинника, метлица обыкновенная)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам. (не зависимо от фазы развития культуры)	60 (1)
СКАУТ ФОРТЕ, к.э. (140 г/л + 90 г/л + 72 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-3 01.03.2027 г.	0,3–0,4	Пшеница яровая	Однолетние злаковые сорняки (овсюг, просо куриное, виды щетинника)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам независимо от фазы развития культуры	-1
СКАУТ, э.м.в. (140 г/л + 90 г/л + 72 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-3 02.08.2031 г.	0,3-0,4	Пшеница яровая	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам (независимо от фазы развития культуры)	-1
	0,4-0,6	Пшеница озимая	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам (независимо от фазы развития культуры)	-1

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 162 г/л + 80 г/л + 50 г/л

СКАУТ Про, к.э. (162 г/л + 80 г/л + 50 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-3 27.12.2034 г.	0,3-0,4	Пшеница яровая	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам независимо от фазы развития культуры	-1
---	---------	----------------	-----------------------------	--	----

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 170 г/л + 48,5 г/л + 57 г/л

СКАУТ УЛЬТРА, к.э. (170 г/л + 48,5 г/л + 57 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-3 13.03.2029 г.	0,3-0,45	Пшеница яровая	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости – 150-200 л/га	-1
--	----------	----------------	-----------------------------	--	----

Феноксапроп-п-этил + клодинафоп-пропаргил + мефенпир-диэтил (антисорняк)

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 90 г/л + 90 г/л + 44 г/л

ТАЙПАН, к.э. (90 г/л + 90 г/л + 44 г/л) ООО «Форвард», Россия П-3 23.04.2028 г.	0,25	Пшеница яровая	Овсяг	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков независимо от фазы развития культуры	-1
	0,3	Пшеница яровая	Просовидные, виды щетинника	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков независимо от фазы развития культуры	-1
	0,3-0,35	Пшеница яровая	Однолетние злаковые сорняки (овсюг, виды щетинника, просо куриное, просо сорнополевое, метлица полевая)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры)	-1

Феноксапроп-п-этил + клокви́нтосет-мексил (антидот)

Концентрация д.в. (+/- 5%) ~ 69 г/л + 34,5 г/л					
ОЦЕЛОТ ПЛЮС, к.э. (69 г/л + 34,5 г/л) ООО «Агро Эксперт Групп», Россия П-3 14.04.2031 г.	0,8-1,2	Пшеница яровая	Однолетние злаковые сорняки (виды щетинника, просо куриное, просо сорнополевое, овсюг, метлица полевая)	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорняков независимо от фазы развития культуры (с учетом чувствительности сортов)	1
	0,6-1,0	Ячмень яровой			
РЫСЬ УЛЬТРА, э.м.в. (69 г/л + 34,5 г/л) «МОЕР Кемсайенс Ко., Лтд.», Китай П-3 14.03.2029 г.	0,8-1,0	Пшеница яровая	Однолетние злаковые сорняки (овсюг, виды щетинника, просо куриное)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2-го листа до конца кушения (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости 100-300 л/га	-1
	0,8-1,0	Ячменьяро вой	Однолетние злаковые сорняки (овсюг, виды щетинника, просо куриное)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2-го листа до конца кушения (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости 100-300 л/га	-1
СМАРАГД, к.э. (69 г/л + 35 г/л) Синтезия Кемп ГмбХ, Германия П-3 26.01.2027 г.	0,8–1,2	Пшеница яровая	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам независимо от фазы развития культуры	-1
	0,6–0,9	Ячмень яровой	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам независимо от фазы развития культуры	-1
Тайгер, э.м.в. (69 г/л + 34,5 г/л) ООО «Интер Групп» П-3 06.12.2034 г.	0,8-1,0 л/га	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние злаковые сорняки (виды щетинника, просо куриное, просо сорное, овсюг, метлица полевая)	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорняков независимо от фазы развития культуры (с учетом чувствительности сортов). Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га.	60 (1)
ФАБРИС, э.м.в. (69 г/л + 34,5 г/л) ООО «Форвард», Россия П-3 29.03.2027 г.	0,8-1,0	Пшеница и ячмень ярово1	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорняков независимо от фазы развития культуры (с учетом чувствительности сортов)	-1
ФОКСТРОТ, в.э. (69 г/л + 34,5 г/л) Кеминова А/С, Дания П-3 24.02.2027 г.	0,8-1,2	Пшеница яровая	Однолетние злаковые (овсюг, виды щетинника, просо куриное)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2-го листа до конца кушения (независимо от фазы развития культуры)	-1
	0,6-0,9	Ячмень яровой	Однолетние злаковые (овсюг, виды щетинника, просо куриное)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2-го листа до конца кушения (независимо от фазы развития культуры)	-1
ШАНСЮГЕН, в.э. (69 г/л + 34,5 г/л) ООО «Шанс» П-3 07.03.2029 г.	0,8-1,0	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Однолетние злаковые сорняки (виды щетинника, просо куриное, просо сорнополевое, овсюг, метлица обыкновенная)	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорняков независимо от фазы развития культуры (с учетом чувствительности сортов). Озимая пшеница обрабатывается весной. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60(1)
Концентрация д.в. (+/- 5%) ~ 70 г/л + 40 г/л					
ЛАСТИК ЭКСТРА, к.э. (70 г/л + 40 г/л) АО Фирма «Август» П-3 04.07.2032 г.	0,8-1,0	Рис	Однолетние злаковые (виды щетинника, просо куриное, просо сорнополевое, овсюг, метлица полевая) сорняки	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорняков независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости 50-200 л/га	60(1)
13.09.2034 г.	0,8-1,0	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние злаковые сорняки.	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорняков независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости 50-300 л/га	-1
Концентрация д.в. (+/- 5%) ~ 100 г/л + 27 г/л					
БОТАКАН, 10% к.э. (100 г/л + 30 г/л) Наньцзин Эссенс Файн-Кемикал Со., Лтд, Китай П-4 02.02.2034 г.	0,6-0,9	Пшеница яровая и озимая	Однолетние злаковые (овсюг, виды щетинника, просо куриное)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2-го листа до конца кушения (независимо от фазы развития культуры)	-1
ЗЛАКОФОРТЕ 100, к.э. (100 г/л + 27 г/л) ТОО Агро-Хим-Лидер П-3 28.03.2028г.	0,6-0,9	Пшеница яровая и озимая	Однолетние злаковые сорняки (овсюг, виды щетинника, просо куриное)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2-го листа до конца кушения (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	-1
ОЦЕЛОТ, к.э. (100 г/л + 27 г/л) ООО «Агро Эксперт Групп», Россия П-3 28.11.2034 г.	0,6-0,9	Пшеница яровая и озимая	Однолетние злаковые (овсюг, виды щетинника, просо куриное)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2-го листа до конца кушения (независимо от фазы развития культуры). Озимые культуры обрабатывают весной. Расход рабочей жидкости 150-200 л/га	60 (1)
Тайгер 100, к.э. (100 г/л + 27 г/л) ООО «Интер Групп» П-3 19.03.2035 г.	0,4-0,6	Пшеница яровая	Однолетние злаковые сорняки (виды щетинника, просо куриное, просо сорно -полевое)	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорняков независимо от фазы развития культуры (с учетом чувствительности сортов). Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га.	60 (1)
	0,5-0,7	Пшеница яровая	Овсюг	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорняков независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости 150-200 л/га	60 (1)
	0,6-0,9	Пшеница яровая	Однолетние злаковые сорняки (овсюг, щетинники, просо куриное)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2-х листьев до конца кушения (независимо от фазы развития культуры). При использовании и максимальной нормы применения гербицида на селекционных	60 (1)

				и семеноводческих посевах пшеницы учитывать устойчивость сортов. Расход рабочей жидкости 150-200 л/га	
ФЕРЕНЦ ПЛЮС, к.э. (100 г/л + 27 г/л) Лейтон Агрио Европа Кфт, Венгрия П-3 14.03.2027 г.	0,6-0,9	Пшеница яровая	Однолетние злаковые (овсюг, виды щетинника, просо куриное)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2-го листа до конца кущения (независимо от фазы развития культуры)	-1
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 100 г/л + 50 г/л					
Формуляр, к.э. (100 г/л + 50 г/л) ТОО «ФМРус» П-3 25.12.2035 г.	0,4-0,9	Пшеница яровая	Однолетние злаковые сорные растения (виды щетинника, просо куриное, просо сорнополевое, овсюг, метлица полевая, лисохвост)	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2 -3 листа) сорных растений, независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости – 150-200 л/га	60(1)
	0,5-0,7	Ячмень яровой	Однолетние злаковые сорные растения (виды щетинника, просо куриное, просо сорнополевое, овсюг, метлица полевая, лисохвост)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорным растениям, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения (в фазе кущения культуры). Расход рабочей жидкости – 150-200 л/га	
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 120 г/л + 23 г/л					
БЕЛЛИСИМО ЛАЙТ, к.э. (120 г/л + 23 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-3 11.04.2032 г.	0,3-0,5	Пшеница яровая	Просянки, щетинники	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков независимо от фазы развития культуры	-1
	0,5-0,75	Пшеница яровая	Овсюг, просянки, щетинники	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков независимо от фазы развития культуры	-1
ФОКСТРОТ ТУРБО, к.э. (120 г/л + 23 г/л) Кеминова А/С П-3 17.06.2031 г.	0,3-0,5	Пшеница яровая	Просо куриное	Опрыскивание по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2-3 листьев до конца кущения сорных злаков (независимо от фазы развития культуры).	-1
	0,4-0,6		Овсюг		
	0,6-0,75		Овсюг, виды щетинника, просо куриное, метлица		
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 140 г/л+ 40 г/л					
КУГАР ФОРТЕ, к.э. (140 г/л + 40 г/л) Юнайтед Агри-Кемикал Компани ГмбХ, Швейцария П-4 12.04.2031 г.	0,3-0,4	Пшеница яровая	Однолетние злаковые сорняки (овсюг, просо куриное, виды щетинника)	Опрыскивание по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2-го листа до конца кущения (независимо от фазы развития культуры)	-1
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 140 г/л+ 47 г/л					
БЕЛЛИСИМО, э.м.в. (140 г/л + 50 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-4 02.08.2031 г.	0,4-0,6	Пшеница яровая	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам (независимо от фазы развития культуры)	-1
	0,4-0,6	Пшеница озимая	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам (независимо от фазы развития культуры)	-1
ОВСЮГЕН СУПЕР, к.э. (140 г/л + 47 г/л) АО «Щелково Агрохим» П-4 17.02.2030 г.	0,3-0,5	Ячмень яровой	Однолетние злаковые (овсюг обыкновенный, просо куриное, щетинник зеленый)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2-го листа до конца кущения (независимо от фазы развития культуры)	-1
	0,3-0,4 + ПАВ Сателли т 200 мл/га	Ячмень яровой	Однолетние злаковые (овсюг обыкновенный, просо куриное, щетинник зеленый)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2-го листа до конца кущения (независимо от фазы развития культуры)	-1
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 140 г/л+ 70 г/л					
АРИЛОКС к.э. (140 г/л+ 70 г/л) ТОО «HARVEST Ltd (Харвест Ltd)» П-3 20.03.2034 г.	0,4-0,5	Яровой ячмень	Однолетние злаковые сорняки (овсюг обыкновенный, просо куриное, виды щетинника)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2-го листа до конца кущения (не зависимо от фазы развития культуры)	60(1)
	0,4-0,6	Озимая пшеница	Однолетние злаковые сорняки (овсюг обыкновенный, просо куриное, виды щетинника, метлица полевая)	Опрыскивание посевов весной, начиная с фазы 2 -го листа до конца кущения (не зависимо от фазы развития культуры)	60(1)
	0,4-0,6	Яровая пшеница	Однолетние злаковые сорняки (овсюг обыкновенный, просо куриное, виды щетинника)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2-го листа до конца кущения (не зависимо от фазы развития культуры)	60(1)
БАРЫС ФОРТЕ, к.э. (140 г/л + 70 г/л) ТОО «Достык-Агро 2012» П-3 07.04.2032 г.	0,5-0,6	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние злаковые сорняки (овсюг, просо куриное и виды щетинника)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам (независимо от фазы развития культуры)	-1
ИРБИС, к.э. (140 г/л + 70 г/л) ARCUS INVEST HOLDING B.V. П-4 12.10.2032 г.	0,5-0,6	Пшеница яровая	Однолетние злаковые сорняки (овсюг, щетинники, просо куриное, просо сорнополевое)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам (независимо от фазы культуры)	- (1)
	0,5-0,6	Ячмень яровой	Однолетние злаковые сорняки (овсюг, щетинники, просо куриное, просо сорнополевое)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам (независимо от фазы культуры)	- (1)
СМАРАГД ФОРТЕ, к.э. (140 г/л + 70 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-3 02.03.2028 г.	0,5-0,6	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков независимо от фазы развития культуры	-1
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 200 г/л + 40 г/л					
БЕЛИССИМО 2.0, к.э. (200 г/л + 40 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-3 13.03.2029 г.	0,3-0,45	Пшеница яровая	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости 150-200 л/га	-1
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 200 г/л + 100 г/л					

СМАРАГД УЛЬТРА, к.э. (200 г/л + 100 г/л) Синтезия Кемп ГмбХ, Германия П-3 24.07.2035 г.	0,3 – 0,4	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам независимо от фазы развития культуры	-1
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 260 г/л + 55 г/л					
ФИОРИН, к.э. (260 г/л + 55 г/л) Синтезия Кемп ГмбХ, Германия П-3 28.01.2036 г.	0,3 – 0,35	Пшеница яровая	Однолетние злаковые сорняки (овсюг, просянки, щетинники)	Опрыскивание вегетирующих сорняков независимо от фазы развития культуры	-1

Феноксапроп-п-этил + мефенпир-диэтил (антидот)

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 69 г/л + 75 г/л					
АВЕСТАР ГРАНТ, к.э. (69 г/л + 75 г/л) ТОО «А.С.К. Technik» (А.С.К.Техник) П-3 11.01.2029 г.	0,8-1,2	Пшеница яровая	Однолетние злаковые сорняки (овсюг, виды щетинника, просо куриное)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2-го листа до конца кущения (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости – 100-300 л/га	-1
	0,8-0,9	Ячмень озимая	Однолетние злаковые сорняки (овсюг, виды щетинника, просо куриное, метлица обыкновенная)	Опрыскивание посевов рано весной по вегетирующим сорнякам. Расход рабочей жидкости – 100-300 л/га	-1
	0,6-0,9	Ячмень яровой	Однолетние злаковые сорняки (овсюг, виды щетинника, просо куриное)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2-го листа до конца кущения (независимо от фазы развития культуры)	-1
АРМАН СУПЕР, э.м.в. (69 г/л + 75 г/л) Nanjing Rinchen International Trading Co.LTD П-4 12.08.2032 г.	0,8 – 1,2	Пшеница яровая	Однолетние злаковые (овсюг, щетинники, просянки) сорняки	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам с фазы 2 – го листа до конца кущения (независимо от фазы развития культуры)	(1)
	0,8 – 1, 0	пшеница озимая			
	0,6 – 0,9	ячмень яровой			
ВИТЯЗЬ, к.э. (69 г/л + 75 г/л) Лейтон Агрио Кфт., Венгрия П-3 05.03.2029 г.	0,6-0,9	Ячмень яровой	Однолетние злаковые сорняки (овсюг, виды щетинника, просо куриное)	Опрыскивание по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2-го листа до конца кущения (независимо от фазы развития культуры)	-1
ЗЛАКОСУПЕР 7,5%, э.м.в. (69 г/л + 75 г/л) ТОО «Агро-Хим-Лидер» П-3 28.03.2028 г.	0,8-1,2	Пшеница яровая, озимая	Однолетние злаковые сорняки (овсюг, виды щетинника, просо куриное)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2-го листа до конца кущения (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	-1
	0,6-0,9	Ячмень яровой	Однолетние злаковые сорняки (овсюг, виды щетинника, просо куриное)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2-го листа до конца кущения (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	-1
Кросс, э.м.в. (69 г/л + 75 г/л) ТОО «EcoSave» П-3 17.04.2036 г.	0,6-0,9	Ячмень яровой	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2-го листа до конца кущения (независимо от фазы развития культуры)	-1
ПЕГАС СУПЕР 7,5%, э.м.в. (69 г/л + 75 г/л) ТОО «Агро Глобал» П-3 31.01.2030 г.	0,8-1,2	Пшеница яровая	Однолетние злаковые сорняки (овсюг, виды щетинника, просо куриное)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2-го листа до конца кущения (независимо от фазы развития культуры)	-1
	0,6-0,9	Ячмень яровой	Однолетние злаковые сорняки (овсюг обыкновенный, щетинник зеленый, просо куриное)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2-го листа до конца кущения (независимо от фазы развития культуры)	-1
ПУМА-СУПЕР 7,5%, э.м.в. (69 г/л + 75 г/л) Байер кропсайенс АГ, Германия П-4 15.04.2031 г.	0,8-1,2	Пшеница яровая	Однолетние злаковые (овсюг, виды щетинника, просо куриное)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2-го листа до конца кущения (независимо от фазы развития культуры)	-1
	0,8-1,0	Пшеница озимая	Метлица обыкновенная	Опрыскивание посевов рано весной по вегетирующим сорнякам	-1
	0,6-0,9	Ячмень яровой	Однолетние злаковые (овсюг обыкновенный, просо куриное, щетинник зеленый)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2-го листа до конца кущения (независимо от фазы развития культуры)	-1
ЯГУАР, э.м.в. (69 г/л + 75 г/л) ТОО «Астана-Нан» П-4 01.06.2036 г.	0,8-1,2	Пшеница яровая	Однолетние злаковые (овсюг, виды щетинника, просо куриное)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2-го листа до конца кущения (независимо от фазы развития культуры).	-1
	0,6-0,9	Ячмень яровой	Однолетние злаковые (овсюг, виды щетинника, просо куриное)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2-го листа до конца кущения (независимо от фазы развития культуры).	-1
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 75 г/л + 75 г/л					
ЭНТО СУПЕР, 7,5 %, э.м.в. (75 г/л + 75 г/л) IFODA AGRO KIMYO HIMOYA, Узбекистан П-3 16.07.2029 г.	0,8-1,0	Пшеница яровая и озимая	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	-1
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 100 г/л + 27 г/л					
БАГИРА СУПЕР 100, к.э. (100 г/л + 27 г/л) ТОО «QADAMGroup (КАДАМГрупп)» П-4 04.07.2032 г.	0,6-0,9	Пшеница яровая	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2-го листа до конца кущения (независимо от фазы развития культуры)	-1

БАРС СУПЕР 10%, к.э. (100 г/л + 27 г/л) Байер Кропсайдс АГ П-3 15.04.2031 г.	0,6-0,9	Пшеница яровая и озимая	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов По вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2-го листа до конца кущения (независимо от фазы развития культуры)	-1
ГРАМИ СУПЕР, к.э. (100 г/л + 27 г/л) ТОО «Астана-Нан» П-3 02.10.2030 г.	0,6-0,8	Пшеница яровая	Однолетние злаковые (овсюг, виды щетинников, просо куриное)	Опрыскивание в период вегетации	-1
Кросс Пауэр, к.э. (100 г/л + 27 г/л) ТОО «EcoSave» П-3 19.03.2036 г.	0,6-0,9	Пшеница яровая	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2-го листа до конца кущения (независимо от фазы развития культуры)	-1
ПУМА СУПЕР 100 10%, к.э. (100 г/л + 27 г/л) Байер Кропсайдс АГ П-4 15.04.2031 г.	0,6-0,9	Пшеница яровая и озимая	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов По вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2-го листа до конца кущения (независимо от фазы развития культуры)	-1
СОБОЛЬ, в.э. (100 г/л + 27 г/л) ШАНДОНГ ВЕЙФАНГ РЕЙНБОУ КЕМИКАЛ КО., ЛТД., П-3 30.03.2028 г.	0,6-0,9	Пшеница яровая и озимая	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2-го листа до конца кущения (независимо от фазы развития культуры)	-1
ТАЛАКА 100, к.э. (100 г/л + 27 г/л) ООО «Франдеса», Беларусь П-3 05.04.2029 г.	0,6-0,9	Пшеница яровая	Однолетние злаковые сорняки (овсюг, виды щетинника, просо куриное)	Опрыскивание посевов По вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2-го листа до конца кущения (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости 150-200 л/га	-1

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 120 г/л + 33 г/л

БАГИРА ГОЛД 120, к.э. (120 г/л + 33 г/л) ТОО «QADAMGroup (КАДАМГрупп)» П-3 17.07.2032 г.	0,45-0,75	Пшеница яровая, озимая	Однолетние злаковые сорняки (овсюг, просовидные, щетинники)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2-го листа до конца кущения (независимо от фазы развития культуры)	-1
ПРОКСИМУС, к.э. (120 г/л + 33 г/л) Жеджянг Жонгшан Кемикал Индастри Груп Ко., Лтд, Китай П-3 27.02.2030 г.	0,5-0,75	Пшеница яровая	Однолетние злаковые (овсюг обыкновенный, просо куриное, виды щетинника)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам начиная с фазы 2-го листа до конца кущения (независимо от фазы кущения культуры)	-1

Феноксапроп-п-этил + тиенкарбазон-метил + мефенпир-диэтил (антисорняк)

ВЕЛОСИТИ СУПЕР, к.э. (80 г/л + 7,5 г/л + 30 г/л) Байер Кропсайдс АГ, Германия П-3 19.04.2028 г.	0,5-0,7	Пшеница яровая и озимая	Однолетние злаковые сорняки (овсюг, просо куриное)	Опрыскивание посевов в фазе с 3-х листьев до 2-го междоузлия культуры	-1
	0,75-1,0	Пшеница яровая и озимая	Однолетние злаковые сорняки (овсюг, просовидные, щетинники) при многоярусной засоренности сорняками. Некоторые однолетние и многолетние двудольные сорняки (вьюнок полевой, горец вьюнковый)	Опрыскивание посевов в фазе с 3-х листьев до 2-го междоузлия культуры	-1

Феноксапроп-п-этил + фенклодазол-этил (антисорняк)

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 100 г/л + 27 г/л					
ГЕПАРД, к.э. (100 г/л + 27 г/л) ООО Резерв, Россия П-4 11.07.2027 г.	0,6-0,9	Пшеница яровая	Однолетние злаковые (овсюг, виды щетинника, просо куриное)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2-го листа до конца кущения (независимо от фазы развития культуры)	-1
КЛИНЧ 100, 10%, к.э. (100 г/л + 30 г/л) ТОО «Агро Глобал» П-4 01.11.2026 г.	0,6-0,9	Пшеница яровая	Однолетние злаковые (овсюг, виды щетинника, просо куриное)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2-го листа до конца кущения (независимо от фазы развития культуры)	-1
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 100 г/л + 50 г/л					
АВЕСТАР 10%, к.э. (100 г/л + 50 г/л) AGROBEST GRUP, Турция П-4 17.02.2030 г.	0,6-0,9	Пшеница яровая и озимая	Однолетние злаковые сорняки (овсюг, просо куриное, виды щетинника)	Опрыскивание по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2-го листа до конца кущения (независимо от фазы развития культуры)	-1
ВИЛЛАН СУПЕР 10%, к.э. (100 г/л + 50 г/л) ТОО «Бартонс Кемикал ГмбХ» П-4 17.02.2030 г.	0,6-0,9	Пшеница яровая и озимая	Однолетние злаковые сорняки (овсюг, просо куриное и сорнополевое, виды щетинника)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2-го листа до конца кущения (независимо от фазы развития культуры)	-1
РЫСЬ СУПЕР 10%, к.э. (100 г/л + 50 г/л) Моер Кемсайенс Ко.Лтд., Китай П-4 10.12.2028 г.	0,6-0,9	Пшеница яровая и озимая	Однолетние злаковые сорняки (овсюг, просо куриное, виды щетинника)	Опрыскивание по вегетирующим сорнякам в фазе 2-4 листьев	-1
Супервилл, к.э. (100 г/л + 50 г/л) ТОО «Бартонс Кемикал ГмбХ» П-4 25.12.2035 г.	0,6-0,9	Пшеница яровая	Однолетние злаковые (овсюг, просо куриное, виды щетинника)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2-го листа до конца кущения (независимо от фазы развития культуры)	-1
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 120 г/л + 60 г/л					

АВЕЦИД СУПЕР 12%, к.э. (120 г/л + 60 г/л) ТОО «Дегеш Агро ЛТД», П-4 18.11.2035 г.	0,5-0,75	Пшеница яровая	Однолетние злаковые (овсюг, виды щетинника, просо куриное)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2-го листа до конца кущения (независимо от фазы развития культуры)	-1
ТОО «Агрохимия» 06.12.2028 г.	0,4-0,8	Ячмень яровой	Однолетние злаковые (овсюг, виды щетинника, просо куриное)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2-го листа до конца кущения (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости: 200-300 л/га	-1
Концентрация д.в. (+/- 5%) ~ 140 г/л + 35 г/л					
ОВСЮГЕН ЭКСТРА, к.э. (140 г/л + 35 г/л) АО «Щелково Агрохим» П-4 10.02.2027 г.	0,45-0,65	Пшеница яровая	Однолетние злаковые (овсюг, виды щетинника, просо куриное)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2-го листа до конца кущения (независимо от фазы развития культуры)	-1

Феноксапроп-п-этил + пиноксаден+ клокви́нтосет-мексил (антидот)

Bang Fenoxaden, э.к. (27,5 г/л + 55,1 г/л+13,8 г/л) Jiangxi Huihe Chemical Co. Ltd П-3 18.12.2034 г.	0,7–1,2	Пшеница яровая	Однолетние злаковые (виды щетинника, просо куриное, просо сорнополевое, овсюг, метлица полевая, лисохвост и др.) сорняки	Опрыскивание посевов, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения однолетних злаковых сорняков (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости – 200–300 л/га	60 (1)
---	---------	-------------------	---	---	--------

Флорпираукифен-бензил+пенокси́лам

БАКСИГА 32, м.д., (12,5 г/л+20 г/л) ТОО «Кортева Агрисаенс Казахстан» П-3 10.01.2033 г.	1,8-2,0	Рис	Целевые объекты: ежовники, клубнекамыш, сыть рассеченная, другие болотные и двудольные сорняки	Опрыскивание в фазу 8 листьев начало кущения культуры, фаза злаковых сорняков 2-6 листа	60 (1)
	1,8-2,0	Рис	Целевые объекты: ежовники, клубнекамыш, сыть рассеченная, другие болотные и двудольные сорняки	Опрыскивание в фазу окончания кущения начало трубкования культуры, в фазу кущения злаковых сорняков	60 (1)

Флукарбазон натрия

Концентрация д.в. (+/- 5%) ~ 700 г/кг					
КУДЕСНИК, 70% в.д.г. (700 г/кг) ЛЕЙТОН АГРИО ЕВРОПА КФТ. П-3 23.02.2034 г.	0,028-0,042	Пшеница яровая	Овсюг и другие однолетние злаковые	Опрыскивание посевов по вегетирующим злаковым сорнякам (в фазу 1-3 листьев, начало кущения), ранние фазы роста двудольных сорных растений. Оптимальная фаза развития культурных растений – от одного листа до середины кущения для пшеницы яровой. Соблюдать ограничения по севообороту: пшеницу можно высевать не ранее чем через 4 месяца после применения препарата, ячмень, сою, рапс – через 9 месяцев; горчицу – через 24 месяца. Расход рабочей жидкости – 50- 100 л/га	-1
КЕНТАВР, в.д.г. (700 г/кг) АО Фирма «Август» П-3 14.03.2034 г.	0,025+ПАВ Адью, Ж (0,1 % от объема рабочей жидкости)	Пшеница яровая	Однолетние злаковые (овсюг, метлица обыкновенная, щетинник зеленый) и некоторые двудольные (ширица запрокинутая, горчица полевая, гречишка выюнковая, пастушья сумка, неслия метельчатая) сорные растения	Опрыскивание посевов по вегетирующим растениям, начиная с фазы 2-3 листьев до конца кущения культуры в ранние фазы роста двудольных сорных растений. Озимые обрабатывают весной. Расход рабочей жидкости – 50-300 л/га	60 (1)
	0,042-0,07	Пшеница яровая	Однолетние злаковые (овсюг, метлица обыкновенная, щетинник зеленый) и некоторые двудольные (ширица запрокинутая, горчица полевая, гречишка выюнковая, пастушья сумка, неслия метельчатая) сорные растения	Опрыскивание посевов по вегетирующим растениям, начиная с фазы 2-3 листьев до конца кущения культуры в ранние фазы роста двудольных сорных растений. Озимые обрабатывают весной. Расход рабочей жидкости – 50-300 л/га	60 (1)
	0,025+ПАВ Адью, Ж	Пшеница озимая	Однолетние злаковые (овсюг, метлица обыкновенная, щетинник зеленый) и некоторые двудольные (ширица запрокинутая, горчица полевая, гречишка выюнковая, пастушья сумка, неслия метельчатая) сорные растения	Опрыскивание посевов по вегетирующим растениям, начиная с фазы 2-3 листьев до конца кущения культуры в ранние фазы роста двудольных сорных растений. Озимые обрабатывают весной. Расход рабочей жидкости – 50-300 л/га	60 (1)
	0,042-0,07	Пшеница озимая	Однолетние злаковые (овсюг, метлица обыкновенная, щетинник зеленый) и некоторые двудольные (ширица запрокинутая, горчица полевая, гречишка выюнковая, пастушья сумка, неслия метельчатая) сорные растения	Опрыскивание посевов по вегетирующим растениям, начиная с фазы 2-3 листьев до конца кущения культуры в ранние фазы роста двудольных сорных растений. Озимые обрабатывают весной. Расход рабочей жидкости – 50-300 л/га	60 (1)
ЭВЕРЕСТ 70%, в.д.г. (700 г/кг) Ариста ЛайфСайенс САС, Франция П-3 17.03.2030 г.	0,025 -0,04	Поля предназна ченные под посев пшеницы, кроме твердой пшеницы	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	Опрыскивание полей перед посевом пшеницы, кроме твердой	-(1)
12.04.2033 г.	0,028-0,042	Пшеница яровая	Овсюг и другие однолетние злаковые	Опрыскивание в фазу кущения культуры	-1

Флукарбазон натрия + феноксапроп-п-этил + клокви́нтосет-мексил (антидот)

МОНБЛАНК, м.д. (42 г/л + 72 г/л + 40 г/л) Arysta LifeScience S.A.S П-3 27.08.2032 г.	0,4-0,7	Пшеница озимая и яровая	Однолетние злаковые сорняки (овсюг, виды щетинника, просо куриное) и некоторые двудольные сорняки	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2-го листа до конца кущения культуры	-1
---	---------	-------------------------------	---	--	----

Флуметсулам

ФАРГО в.д.г. (800 г/кг) Синтезия Кеми Гмбх, Германия П-3 29.07.2031 г.	0,025-0,050	Чечевица	Однолетние злаковые и однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (1-3 настоящих листьев) и 1-3 настоящих листа у культуры	-1
	0,025-0,050	Горох		Опрыскивание в фазу 2-6 узлов, не позднее 6 недель с момента прорастания	-1

Флумиоксазин

Флазер, к.с.. (250 г/л) ТОО «ФМРУС» П-3 25.12.2034 г.	0,2-0,25	Хлопчатник	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста (фаза 2-3 листьев). В течение 12 месяцев после применения препарата не рекомендуется высевать свеклу сахарную, столовую, кормовую. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га.	60(1)
	0,2-0,25	Хлопчатник	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры (сразу после посева или в течение 2-3 дней после него). В течение 12 месяцев после применения препарата не рекомендуется высевать свеклу сахарную, столовую, кормовую. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га.	-(1)
	0,2-0,25	Соя	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры (сразу после посева или в течение 2-3 дней после него). В течение 12 месяцев после применения препарата не рекомендуется высевать свеклу сахарную, столовую, кормовую. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га.	60(1)

Флумиоксазин + пироксасульффон

ЛОКСУФОН ПЛЮС, к.с. (150 г/л + 345 г/л) ШАНДОНГ ВЕЙФАНГ РЕЙНБОУ КЕМИКАЛ КО., ЛТД П-3 06.01.2036 г.	0,4-0,5	Соя	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы перед посадкой или появлением всходов	21(1)
	0,2-0,4	Подсолнечник	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы перед посадкой или появлением всходов	-(1)
	0,2-0,4	Кукуруза	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы перед посадкой или появлением всходов	60(1)

Флорасулам

ФЛОРАН, к.с. (150 г/л) ООО «Форвард» П-3 29.05.2034 г.	0,033-0,04	Яровая пшеница	Однолетние двудольные сорные растения, в т.ч. подмаренник цепкий и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов с фазы 3-х листьев культуры до появления флагового листа в ранние фазы роста развития сорняков (2-6 листьев у однолетних, фаза 6-8 мутовок у подмаренника цепкого). Норма расхода рабочей жидкости 200-300 л/га.	-(1)
	0,033-0,04	Яровой ячмень	Однолетние двудольные сорные растения, в т.ч. подмаренник цепкий и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов с фазы 3-х листьев культуры до появления флагового листа в ранние фазы роста развития сорняков (2-6 листьев у однолетних, фаза 6-8 мутовок у подмаренника цепкого). Норма расхода рабочей жидкости 200-300 л/га.	-(1)

Форамсульфурон + тиенкарбазон-метил

КОНВИЗО 1, м.д. (50 г/л + 30 г/л) ТОО «Байер КАЗ» П-4 18.11.2034 г.	1,5	Свекла сахарная (гибриды, устойчивые к гербициду Конвизо 1).	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 6 настоящих Листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений. В случае пересева в Год применения можно высевать кукурузу, сахарную свеклу (гибриды, устойчивые к гербициду Конвизо 1). Осенью в год применения высевать только пшеницу озимую. Весной следующего года сев чувствительных культур: свекла (сахарная, столовая и кормовая), рапс, подсолнечник, гречиха, бобовые и овощные культуры разрешен при условии достаточного увлажнения почвы. При посеве чувствительных культур обязательна глубокая вспашка. Нельзя высевать чувствительные культуры, если сумма осадков за период от применения гербицида до посева менее 350 мм. На почвах с pH 7,5 и выше ограничения срока посева указанных чувствительных культур увеличивается до двух лет после применения препарата. При севе ячменя ярового в условиях недостатка влаги (если сумма осадков за период от применения до посева менее 300 мм) возможно незначительное отставание в росте. Расход рабочей жидкости- 150-300 л/га	85 (1)
	0,75	Свекла сахарная (гибриды, устойчивые к гербициду Конвизо 1)	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорные растения	Последовательное опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорных растений (по первой и второй волне). В случае пересева в год применения можно высевать кукурузу, сахарную свеклу (гибриды, устойчивые к гербициду Конвизо 1). Осенью в год применения высевать только пшеницу озимую. Весной следующего года сев чувствительных культур: свекла (сахарная, столовая и кормовая), рапс, подсолнечник, гречиха, бобовые и овощные культуры разрешен при условии достаточного увлажнения почвы. При посеве чувствительных культур обязательна глубокая вспашка. Нельзя высевать чувствительные культуры, если сумма осадков за период от применения гербицида до посева менее 350 мм. На почвах с pH 7,5 и выше ограничения срока посева указанных чувствительных культур увеличивается до двух лет после применения препарата. При севе ячменя ярового в условиях недостатка влаги (если сумма осадков за период от применения до посева менее 300 мм) возможно незначительное отставание в росте. Расход рабочей жидкости 150-300 л/га	85 (2)
	0,5	Свекла сахарная (гибриды, устойчивые к гербициду Конвизо 1)	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорные растения	Последовательное опрыскивание посевов в фазе от семядолей до 2 листьев сорных растений (по первой, второй и третьей волне). В случае пересева в год применения можно высевать кукурузу, свеклу сахарную (гибриды, устойчивые к гербициду Конвизо 1). Осенью в год применения высевать только пшеницу озимую. Весной следующего года сев чувствительных культур: свекла (сахарная, столовая и кормовая), рапс, подсолнечник, гречиха, бобовые и	85 (3)

				овощные культуры разрешен при условии достаточного увлажнения почвы. При посеве чувствительных культур обязательна глубокая вспашка. Нельзя высевать чувствительные культуры, если сумма осадков за период от применения гербицида до посева менее 350 мм. На почвах с pH 7,5 и выше ограничения срока посева указанных чувствительных культур увеличивается до двух лет после применения препарата. При севе ячменя ярового в условиях недостатка влаги (если сумма осадков за период от применения до посева менее 300 мм) возможно незначительное отставание в росте. Расход рабочей жидкости - 150-300 л/га	
--	--	--	--	---	--

Форамсульфурон + йодосульфурон-метил-натрий + тиенкарбазон-метил + ципросульфамид (антидот)

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 31,5 г/л + 1,0 г/л + 10 г/л + 15 г/л					
Буриза м.д. (31,5 г/л + 1,0 г/л + 10 г/л + 15 г/л) ТОО «Астана-Нан» П-3 25.01.2034 г.	1,0-1,5	Кукуруза	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание в фазе 3-5 листьев кукурузы и ранние фазы роста сорняков	-1
МАИСТЕР ПАУЭР, м.д. (31,5 г/л + 1,0 г/л + 10 г/л + 15 г/л) Байер КрокСайенс АГ П-3 15.04.2031 г.	1,0-1,5	Кукуруза	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание в фазе 3-5 листьев кукурузы и ранние фазы роста сорняков	-1
ФОРИНДО МИКС м.д. (31,5 г/л + 1 г/л + 10 г/л + 15г/л) ШАНДОНГ ВЕЙФАНГ РЕЙНБОУ КЕМИКАЛ КО., ЛТД, П-4 05.03.2034 г.	1,0-1,5	Кукуруза	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание в фазе 3-5 листьев культуры и в ранние фазы роста сорняков	- (1)

Форамсульфурон + йодосульфурон-метил-натрий +изоксадифен-этил (антидот)

КАССАД в.д.г. 300 г/кг + 10 г/кг + 300 г/кг Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-4 29.07.2031 г.	0,125-0,15 ПАВ 0,3 л/га	Кукуруза (зеленая масса, зерно и силос)	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев кукурузы и ранние фазы роста сорняков в смеси с ПАВ 0,3 л/га	60 (1)
---	----------------------------	--	--	--	--------

Флуазифоп-п-бутил

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 150 г/л					
БИНГО, к.э. (150 г/л) SHANDONG BINNONG TECHNOLOGY CO., LTD П-3 31.07.2033 г.	2,0	Лен	Однолетние и многолетние злаковые сорняки, в т.ч. пырей ползучий	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста	60(1)
	1,0-2,0	Подсолнечник, соя, рапс	Однолетние и многолетние злаковые сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста	60(1)
СОЛЯРИС, к.э. (150 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-4 02.08.2031 г.	1,0	Лен	Однолетние злаковые	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста	-1
	2,0	Лен	Однолетние и многолетние злаковые, в том числе пырей ползучий	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста	-1
	1,0-2,0	Подсолнечник, соя, рапс	Однолетние и многолетние злаковые	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста	-1
ФЮЗИЛАД ФОРТЕ 150, к.э. (150 г/л) Сингента Крок Протекшн АГ, Швейцария П-3 17.03.2027 г.	0,75-1,0	Рапс	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков	-1
	0,75-1,0	Рапс	Многолетние злаковые	Опрыскивание посевов при высоте сорняков 10-15 см	-1
08.09.2030 г	0,75-1,0	Чечевица	Однолетние злаковые	Опрыскивание в период вегетации	-1
	1,0-1,5		Многолетние злаковые		
16.11.2032 г.	0,75-1,0	Картофель	Однолетние злаковые	Опрыскивание при высоте ботвы картофеля 10-15 см (фаза 3-5 листьев у сорняков)	-1
	1,0-1,5	Картофель	Многолетние злаковые (пырей ползучий)	Опрыскивание при высоте ботвы картофеля и пырея 10-15 см	-1
	2,0	Картофель	Многолетние злаковые при сильной засоренности	Опрыскивание при высоте ботвы картофеля и пырея 10-15 см	-1
	0,75-1,0	Лук	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев у сорняков	-1
	1,0-1,5	Лук	Многолетние злаковые (пырей ползучий)	Опрыскивание посевов при высоте сорняков 10-15 см	-1
	2,0	Лук	Многолетние злаковые при сильной засоренности	Опрыскивание посевов при высоте сорняков 10-15 см	-1
	0,75-1,0	Хлопчатник	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 настоящих листьев у сорняков	-1
	1,0-1,5	Хлопчатник	Многолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 настоящих листьев у сорняков	-1
30.01.2033 г.	0,75-1,5	Лен	Однолетние и многолетние злаковые сорняки	Опрыскивание по вегетации	-1
	0,75-1,5	Арбуз	Однолетние и многолетние злаковые сорняки	Опрыскивание по вегетации	-1
	0,75-1,5	Огурцы	Однолетние и многолетние злаковые сорняки	Опрыскивание по вегетации	-1
	0,75-1,5	Горох	Однолетние и многолетние злаковые сорняки	Опрыскивание по вегетации	-1
	0,75-1,5	Нут	Однолетние и многолетние злаковые сорняки	Опрыскивание по вегетации	-1
21.02.2034	1,0-1,5	Морковь	Однолетние и многолетние злаковые сорняки	Опрыскивание в период вегетации	-1
	1,0-1,5	Томаты	Однолетние и многолетние злаковые сорняки	Опрыскивание в период вегетации	-1

11.06.2034 г.	0,75-1,0	Подсолнечник, свекла сахарная	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков	-1
	1,5-2,0	Подсолнечник, свекла сахарная	Многолетние злаковые	Опрыскивание посевов при высоте сорняков 10-15 см	-1
	0,75-1,0	Соя	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков	-1
	1,5-2,0	Соя	Многолетние злаковые	Опрыскивание посевов при высоте сорняков	-1
ФЛЕКСАЙД, к.э. (150 г/л) ШАНДОНГ ВЕЙФАНГ РЕЙНБОУ КЕМИКАЛ КО., ЛТД, П-3 05.02.2035 г.	1,0-2,0	лен	Однолетние и многолетние злаковые сорные растения, в том числе пырей ползучий	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста	- (1)
	1,0-2,0	Подсолнечник	Однолетние и многолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста	- (1)
	1,0-2,0	Соя	Однолетние и многолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста	- (1)
	1,0-2,0	Рапс	Однолетние и многолетние злаковые сорные растения, в том числе пырей ползучий	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста	- (1)

Флуроксипир

Концентрация д.в. (+/- 5%) ~ 200 г/л					
Минстрел, к.э. (200 г/л) Arysta LifeScience S.A.S П-3 10.01.2035 г.	0,75-1,1	Пшеница яровая	однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2, 4-Д сорняки и многолетние корнеотпрысковые (выюнок полевой)	опрыскивание посевов в фазе кущения культуры – до выхода в трубку	-1
Концентрация д.в. (+/- 5%) ~ 250 г/л					
ДЕЛИТ 250, к.э. (250 г/л) DVAAgro GmbH, Германия П-3 13.03.2030 г.	0,5-0,7	Пшеница яровая	Однолетние двудольные сорняки, устойчивые к 2,4- Д и многолетние корнеотпрысковые (в т.ч. выюнок полевой)	Опрыскивание посевов в фазу кущения – до выхода в трубку	-1
Концентрация д.в. (+/- 5%) ~ 333 г/л					
ДЕМЕТРА, к.э. (350 г/л) АО Фирма «Август» П-3 10.02.2033 г.	0,4-0,5	Лук	Однолетние и многолетние двудольные сорняки, в т.ч. подмаренник цепкий, горец выюнный, выюнок полевой	Опрыскивание в фазе 1 – 2 настоящих листьев культуры. Расход рабочей жидкости 50-300 л/га.	-1
Катранатир, к.э. (333 г/л) ТОО «Астана-Нан» П-3 20.06.2035 г.	0,3-0,4	Пшеница яровая	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и многолетние корнеотпрысковые(выюнок полевой)	Опрыскивание посевов в фазе кущения зерновых культур до выхода в трубку. Норма расхода рабочей жидкости 200 л/га	- (1)
	0,3-0,4	Пшеница озимая	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и многолетние корнеотпрысковые(выюнок полевой)	Опрыскивание в фазе Кущения культуры – до выхода в трубку. Норма расхода рабочей жидкости 200 л/га	- (1)
	0,5-0,6	Пшеница яровая и озимая	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и многолетние корнеотпрысковые(выюнок полевой)	Опрыскивание посевов в Фазу флагового листа. Норма расхода рабочей жидкости 200л/га	- (1)
СТАРАНЕ ПРЕМИУМ 330, к.э. (333 г/л) ТОО «Кортева Агрисаенс Казахстан» П-4 17.02.2030 г.	0,3-0,4	Пшеница яровая	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4- Д и многолетние корнеотпрысковые (выюнок полевой)	Опрыскивание посевов в фазе кущения зерновых до выхода в трубку	-1
	0,3-0,5	Лук	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4- Д и многолетние корнеотпрысковые (выюнок полевой)	Опрыскивание в фазе 1-2 настоящих листьев культуры (3-5 листьев сорняков)	-1
	0,3-0,4	Пшеница озимая	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4- Д и многолетние корнеотпрысковые (выюнок полевой)	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры – до выхода в трубку	-1
ТВИСТ, к.э. (333 г/л) ШАНДОНГ ВЕЙФАНГ РЕЙНБОУ КЕМИКАЛ КО., ЛТД., П-3 04.06.2028 г.	0,3-0,4	Пшеница яровая и озимая	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д, и многолетние корнеотпрысковые сорняки (выюнок полевой)	Опрыскивание посевов в фазе кущения зерновых до выхода в трубку	-1
	0,3-0,5	Лук	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и многолетние корнеотпрысковые (выюнок полевой)	Опрыскивание в фазе 1-2 настоящих листьев культуры (3-5 листьев сорняков)	40 (1)

Флуроксипир + 2,4-Д кислоты в виде сложного эфира

ПРОГРЕСС УЛЬТРА, к.э. (90 г/л + 510 г/л) Синтезия Кемп ГмбХ, Германия П-3 02.03.2028 г.	0,3-0,5	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры	-1
--	---------	-------------------------	---	--	----

Флуроксипир + флорасулам

УНИКО, к.к.р. (100 г/л + 2,5 г/л) АО «Щелково Агрохим» П-3 09.04.2031 г.	0,8-1,5	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние, в.т.ч. устойчивые к 2,4- Д и 2М-4Х, многолетние двудольные сорняки, в.т.ч. подмаренник цепкий, гречишка выюнная, выюнок полевой	Опрыскивание посевов от фазы кущения культуры по фазу появления флагового листа и ранние фазы роста сорняков	40(1)
	0,8-1,5	Пшеница озимая	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2, 4-Д и 2М-4Х, и многолетние двудольные сорняки, в т.ч. подмаренник цепкий, гречишка выюнная, выюнок полевой	Опрыскивание посевов весной от фазы кущения культуры по фазу появления флагового листа и ранние фазы роста сорняков	40(1)

Флорасулам + изоктил 2,4 дихлорфеноксиуксусной кислоты

Концентрация д.в. (+/- 5%) ~ 7,4 г/л + 540 г/л					
ЭКСКАЛИБУР, с.э. (7,4 г/л + 540 г/л) Жеджанг Жоншан Кемикал ГрупСток Ко., Лтд, Китай П-3 18.01.2028 г.	0,3-0,5	Пшеница яровая	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА и некоторые многолетние корнеотпрысковые	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры – выхода в трубку	-1

Герон Про, р. (7,4 г/л + 540 г/л) Sinochem Agro CO, Ltd П-4 28.10.2034 г.	1,0-1,5	Пшеница яровая	Однолетние и многолетние сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков	60 (1)
---	---------	-------------------	----------------------------------	--	--------

Флорасулам + йодосульфурон-метил-натрий + мефенпир-диэтил (антидот)

Глок, в.д.г. (150 г/кг + 60 г/кг + 60 г/кг) АО «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ» П-3 02.03.2036 г.	0,025-0,035	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние и многолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, сорняки	Опрыскивание посевов от фазы кущения до фазы формирования второго междоузлия культуры (включительно) и ранние фазы роста (2-4 листа) сорняков. Препарат применяется самостоятельно или с добавлением 200 мл/га ПАВ Сателлит, Ж	-(1)
--	-------------	----------------------------------	--	--	------

Флорасулам + флуметсулам

Концентрация д.в. (+/- 5%) ~ 36 г/л + 50 г/л					
ПИНТА, м.д. (36 г/л + 50 г/л) АО «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ» П-3 10.06.2035 г.	0,1- 0,15	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние и многолетние двудольные сорняки, в т.ч. виды осота, бодяка.	Опрыскивание посевов от фазы кущения до фазы формирования второго междоузлия культуры (включительно) и ранние фазы роста (всходы-2-4 листа однолетних и розетки у многолетних) двудольных сорняков	60 (1)
Концентрация д.в. (+/- 5%) ~ 75 г/л + 100 г/л					
Бисульда Плюс 175, к.с. (75 г/л + 100 г/л) ШАНДОНГ ВЕЙФАНГ РЕЙНБОУ КЕМИКАЛ КО., ЛТД., П-3 25.02.2035 г.	0,05-0,07	Яровая и озимая пшеница	Однолетние и многолетние двудольные сорняки, включая виды осота, бодяка	Опрыскивание вегетирующих растений весной от фазы кущения до фазы формирования второго междоузлия культуры (включительно) и ранние фазы роста (всходы – 2-4 листа однолетних и розетки листьев многолетних) двудольных сорных растений. Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании – 200-300 л/га	-(1)

Хизалофоп-п-тефурил

Концентрация д.в. (+/- 5%) ~ 40 г/л					
ГЛАДИАТОР 4%, к.э. (40 г/л) ТОО «Агро Глобал» П-3 24.01.2029 г.	0,75-1,0	Рапс	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2 листьев культуры	-1
	1,25-1,5	Рапс	Многолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-4 листьев культуры	-1
	0,75-1,5	Свекла сахарная, картофель, капуста, лук, хлопчатник	Однолетние и многолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе от 2-3 листьев до стеблевания у сорняков	30 (1)
	0,75-1,0	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков перед посевом культуры	30 (1)
	1,25-1,5	Пшеница и ячмень яровые	Многолетние злаковые сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков перед посевом культуры	30 (1)
	0,75-1,0	Лен	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов с фазы от 2-3 листьев до стеблевания у сорняков	30 (1)
	1,25-1,5	Лен	Многолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов с фазы от 2-3 листьев до стеблевания у сорняков	30 (1)
ЕССЕНЗЛАК, 4 % к.э. (40 г/л) Наньцзин Эссенс Файн- Кемикал Ко., Лтд., Китай П-4 09.09.2029 г.	0,75-1,5	Подсолнечник, соя, сахарная свекла, картофель, капуста, лук, хлопчатник	Однолетние и многолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе от 2-3 листьев до стеблевания у сорняков. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	30 (1)
	0,75-1,0	Рапс	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе от 2 листьев культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	1
	1,25-1,5	Рапс	Многолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе от 3-4 листьев культуры. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	1
	0,75-1,0	Лен	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе от 2 листьев культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	30 (1)
	1,25-1,5	Лен	Многолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе от 3-4 листьев культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	30 (1)
ЛЕМУР, к.э. (40 г/л) ООО «Ярило», Россия П-3 11.03.2036 г.	0,75-1,5	Подсолнечник	Однолетние и многолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе от 2-3 листьев до стеблевания у сорняков	30 (1)
11.03.2029 г.	0,75-1,0	Рапс, горчица	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2 листьев культуры	60 (1)
	1,25-1,5	Рапс, горчица	Многолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-4 листьев культуры	60 (1)
	0,75-1,0	Лен масличный, сафлор	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов с фазы от 2-3 листьев до стеблевания у сорняков	-1
	1,25-1,5	Лен масличный, сафлор	Многолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов с фазы от 2-3 листьев до стеблевания у сорняков	-1
ПАНТЕРА 4%, к.э. (40 г/л) Ариста ЛайфСайенс Грейт Британ Лтд., Великобритания П-3 23.02.2028 г.	0,75-1,0	Рапс	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазе 2 листьев культуры	-1
	1,25-1,5	Рапс	Многолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазе 3-4 листьев культуры	-1
16.03.2028 г.	0,75-1,5	Подсолнечник, соя	Однолетние и многолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе от 2-3 листьев до стеблевания у сорняков. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	30 (1)
01.08.2034 г.	0,75-1,0	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние злаковые	Опрыскивание вегетирующих сорняков перед посевом культуры	30 (1)
	1,25-1,5	Пшеница и ячмень яровые	Многолетние злаковые	Опрыскивание вегетирующих сорняков перед посевом культуры	30 (1)

	0,75-1,0	Лен	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов с фазы от 2-3 листьев до стеблевания у сорняков	30 (1)
	1,25-1,5	Лен	Многолетние злаковые	Опрыскивание посевов с фазы от 2-3 листьев до стеблевания у сорняков	30 (1)
РАПИРА, 4%, к.э. (40 г/л) ТОО «Бартонс Кемикал ГмбХ» П-3 10.03.2031 г.	0,75-1,5	Свекла сахарная, картофель, лук, капуста, морковь	Однолетние и многолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев до стеблевания у сорняков	-1
ТЕРРА, 4%, к.э. (40 г/л) ТОО «Астана-Нан» П-4 27.06.2033 г.	0,75-1,5	Свекла сахарная, картофель, капуста, лук	Однолетние и многолетние злаковые сорняки в т.ч. пырей ползучий	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев до стеблевания у сорняков	-1
	0,75-1,5	Подсолнечник, соя	Однолетние и многолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев до стеблевания у сорняков	-1
	0,75-1,0	Рапс	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазе 2 листьев культуры	-1
	1,25-1,5	Рапс	Многолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазе 3-4 листьев культуры	-1
	0,75-1,0	Хлопчатник	Однолетние и многолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе от 2-3 листьев до стеблевания у сорняков	- (1)
	1,25-1,5	Лен масличный	Многолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе от 2-3 листьев до стеблевания у сорняков	- (1)
	0,75-1,0	Лен масличный	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе от 2-3 листьев до стеблевания у сорняков	- (1)
ХИЛЕР, мас.к.э. (40 г/л) АО «Щелково Агрохим» П-3 19.03.2028 г.	0,75-1,5	Лен	Однолетние и многолетние злаковые, в т.ч. пырей ползучий	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листа однолетних сорняков и при высоте пырея ползучего 10-15 см независимо от фазы развития культуры	-1
22.04.2029 г.	0,75-1,5	Соя, лук, морковь	Однолетние и многолетние злаковые сорняки, в т.ч. пырей ползучий	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листа однолетних сорняков и при высоте пырея ползучего 10-15 см независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	30 (1)
05.04.2032 г.	0,75-1,0	Свекла сахарная, подсолнечник	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков независимо от фазы развития культуры	30 (1)
	0,75-1,0	Рапс	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков независимо от фазы развития культуры	-1
	1,0-1,5	Свекла сахарная, подсолнечник	Многолетние злаковые сорняки, в т.ч. пырей ползучий	Опрыскивание посевов при высоте сорняков 10-15 см независимо от фазы развития культуры	30 (1)
	1,0-1,5	Рапс	Многолетние злаковые сорняки, в т.ч. пырей ползучий	Опрыскивание посевов при высоте сорняков 10-15 см независимо от фазы развития культуры	-1
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 70 г/л					
Панамера,к.э. (70 г/л) ТОО «ФМРус» П-3 28.02.2034	0,75-1,0	Соя	Однолетние и многолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев до стеблевания у сорняков	-(1)
	0,75-1,0	Лен	Однолетние и многолетние злаковые сорняки, в т.ч. пырей ползучий	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев однолетних сорняков и при высоте пырея ползучего 10-15 см	-(1)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 80 г/л					
НИКА к.э. (80 г/л) ТОО «HARVEST Ltd (Харвест Ltd)» П-3 20.03.2034 г.	0,8	Поля предназначенные под посев различных сельскохозяйственных культур	Однолетние и многолетние злаковые сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков перед посевом культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	30 (1)
	0,4-0,8	Рапс	Однолетние злаковые сорняки (просо куриное, виды щетинника, овсюг обыкновенный) и многолетние злаковый сорняки (пырей ползучий)	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев культуры против однолетних злаковых сорняков. Опрыскивание посевов при высоте сорняков 10-15 см не зависимо от фазы развития культуры против многолетних злаковых сорняков. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	60 (1)
	0,8	Подсолнечник, соя, лен, сафлор, горох, чечевица	Однолетние злаковые сорняки (просо куриное, виды щетинника, овсюг обыкновенный) и многолетние злаковый сорняки (пырей ползучий)	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев культуры против однолетних злаковых сорняков. Опрыскивание посевов при высоте сорняков 10-15 см не зависимо от фазы развития культуры против многолетних злаковых сорняков. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	60 (1)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 120 г/л					
БАГИРА, м.к.э. (125 г/л) ARCUS INVEST HOLDING B.V. П-4 03.03.2035 г.	0,4-0,5	Лен, подсолнечник, чечевица, горох	Многолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам	30(1)
СОЛЬВЕР, к.э. (120 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-3 13.03.2028 г.	0,25-0,35	Лен масличный, рапс яровой, подсолнечник	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам	30 (1)
	0,4-0,5	Лен масличный, рапс яровой, подсолнечник	Многолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам	30 (1)

Хизалофоп-п-этил

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 60 г/л					
ФОРВАРД, мас.к.э. (60 г/л) АО «Щелково Агрохим» П-3 01.10.2030 г.	0,6-1,8	Подсолнечник, гречиха, чечевица	Однолетние и многолетние злаковые, в т.ч. пырей ползучий	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листа однолетних сорняков и при высоте пырея ползучего 10-15 см	-1
17.03.2031 г.	0,6-1,8	Соя, сафлор, морковь, капуста, лук	Однолетние и многолетние злаковые, в т.ч. пырей ползучий	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листа однолетних сорняков и при высоте пырея ползучего 10-15 см	-1

05.04.2032 г.	0,6-1,2	Свекла сахарная	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание в фазе 2-4 листьев сорняков независимо от фазы развития культуры	30 (1)
	1,2-1,8	Свекла сахарная	Многолетние злаковые сорняки, в т.ч. пырей ползучий	Опрыскивание посевов при высоте сорняков 10-15 см независимо от фазы развития культуры	30 (1)
	0,6-1,2	Рапс	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание в фазе 2-4 листьев сорняков независимо от фазы развития культуры	-1
	1,2-1,8	Рапс	Многолетние злаковые сорняки, в т.ч. пырей ползучий	Опрыскивание посевов при высоте сорняков 10-15 см независимо от фазы развития культуры	-1
28.10.2032 г.	0,6-1,2	Картофель	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание в фазу 2-4 листьев однолетних злаковых сорняков независимо от фазы развития культуры	-1
	1,2-1,8	Картофель	Многолетние злаковые сорняки, том числе пырей ползучий	Опрыскивание посевов при высоте сорняков 10-15 см независимо от фазы развития культуры	-1
	0,6-1,8	Томаты, огурцы	Однолетние и многолетние злаковые сорняки, в т.ч. пырей ползучий	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев у однолетних злаковых сорняков и при высоте многолетних 10-15 см.	-1
10.02.2035 г.	0,6-1,2	Горох, лен-долгунец, нут	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га.	-1
	1,2-1,8	Горох, лен-долгунец, нут	Многолетние злаковые, в т.ч. пырей ползучий	Опрыскивание посевов при высоте сорняков 10-15 см независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	-1
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 125 г/л					
Кумпарсита к.э. (125 г/л) ТОО «ФМРус» П-3 28.02.2034 г.	0,6-1,2	соя	Однолетние и многолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев у однолетних злаковых сорняков при высоте многолетних сорняков 10-15 см	60 (1)
	0,6-1,2	Картофель	Однолетние и многолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев у однолетних злаковых сорняков при высоте многолетних сорняков 10-15 см	-1
	0,6-1,2	Рапс	Однолетние и многолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев у однолетних злаковых сорняков при высоте многолетних сорняков 10-15 см. Расход рабочей жидкости 100-300 л/га	-1
	0,6-1,2	Гречиха	Однолетние и многолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев у однолетних злаковых сорняков при высоте многолетних сорняков 10-15 см. Расход рабочей жидкости 50-300 л/га	-1
МИУРА, к.э. (125 г/л) АО Фирма «Август» П-3 02.03.2036 г.	0,4-0,8	Соя, свекла сахарная	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га.	-(1)
	0,8-1,2	Соя, свекла сахарная	Многолетние злаковые	Опрыскивание посевов при высоте сорняков 10-15 см. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га.	-(1)
29.01.2028 г.	0,8-1,2	Лен масличный	Однолетние и многолетние злаковые сорняки, в т.ч. пырей ползучий	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев однолетних сорняков и при высоте пырея ползучего 10-15 см (в фазе «елочки» льна). Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	-(1)
17.10.2028 г.	0,4-1,2	Лук, морковь, капуста, рапс, картофель	Однолетние и многолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев у однолетних злаковых сорняков при высоте многолетних сорняков 10-15 см Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	-1
18.10.2029 г.	0,4-1,2	Подсолнечник	Однолетние и многолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев у однолетних злаковых сорняков и при высоте многолетних сорняков 10-15 см. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	-1
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 150 г/л					
АМИРА, к.э. (15%/150 г/л) Nanjing Rinchen International Trading Co.LTD П-3 20.06.2032 г.	0,4-1,2	Соя, сахарная свекла, картофель	Однолетние и многолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов фазе роста 2-4 листьев сорняков	(1)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 200 г/л					
ДРАГУН, к.э. (200 г/л) ШАНДОНГ ВЕЙФАНГ РЕЙНБОУ КЕМИКАЛ КО., ЛТД., П-3 25.05.2028 г.	0,25-0,75	Подсолнечник	Однолетние и многолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев у однолетних злаковых сорняков при высоте многолетних сорняков 10-15 см	-1
29.01.2029 г.	0,2-0,4	Рапс, лен	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев у сорняков	-1
	0,4-0,6	Рапс, лен	Многолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов при высоте сорняков 10-15 см	-1
СОЛЬВЕР ПРО, к.э. (200 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ, Германия П-3 25.07.2035 г.	0,25 - 0,35	Гречиха, соя, чечевица, горох, подсолнечник	Однолетние и многолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев у однолетних злаковых растений и высоте пырея ползучего 10-15 см независимо от фазы развития культуры.	30(1)

	0,25 - 0,35	Лен масличный	Однолетние и многолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев у однолетних сорных растений и высоте пырея ползучего 10-15 см в фазе "ёлочки" льна масличного	60(1)
	0,25-0,35	Горчица, рапс	Однолетние и многолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев у однолетних сорных растений и высоте пырея ползучего 10-15 см независимо от фазы развития культуры.	60(1)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 250 г/л					
ЗАЛП, к.э. (250 г/л) ООО «Агро Эксперт Групп», Россия П-3 27.03.2029 г.	0,4-0,8	Картофель	Однолетние и многолетние злаковые сорняки (в т.ч. пырей ползучий)	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев у однолетних сорняков и при высоте многолетних сорняков 10-15 см. Расход рабочей жидкости– 200-300 л/га	-1
	0,4-0,8	Люпин	Однолетние и многолетние злаковые сорняки (в т.ч. пырей ползучий)	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-300л/га	-1

Хизалофоп-п-этил + имазамокс

САФАРИ, м.д. (50 г/л + 38 г/л) АО «Щелково Агрохим» П-3 26.02.2035 г.	0,7-0,9	Подсолнечник (сорта и гибриды устойчивые к имидазолину)	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития сорняков и в фазу 4-6 листьев культуры. На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы. Безопасный интервал между применением гербицида и посевом свеклы – 16 месяцев.	-1
	0,7-0,9	Соя, горох, нут	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития сорняков и в фазу 1-3 листьев культуры. На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы. Безопасный интервал между применением гербицида и посевом свеклы – 16 месяце	-1

Хизалофоп-п-этил + галоксифоп-п-метил

СУПРИМ ФОРТЕ, к.э. (120 г/л + 40 г/л) Синтезия Кеми ГмБХ, Германия П-3 29.07.2035 г.	0,3 - 0,4	Гречиха, соя, чечевица, горох, подсолнечник	Однолетние и многолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев у однолетних сорных растений и высоте пырея ползучего 10-15 см независимо от фазы развития культуры.	30(1)
	0,3 - 0,4	Лен масличный	Однолетние и многолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев у однолетних сорных растений и высоте пырея ползучего 10-15 см в фазе "ёлочки" льна масличного.	60(1)
	0,3 - 0,4	Горчица, рапс	Однолетние и многолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев у однолетних сорных растений и высоте пырея ползучего 10-15 см независимо от фазы развития культуры.	60(1)

Хлорсульфурон + метсульфурон-метил

ФИНЕС ЛАЙТ, в.д.г. (333,75 г/кг + 333 г/кг) ТОО «ЭфЭмСи Агро Казахстан» П-3 05.03.2028 г.	0,009-0,012	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – до второго междоузлия культуры. На следующий год высевать толькозерновые культуры	-1
--	-------------	--	--	---	----

Цигалофоп-бутил + пеноксулам

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 100 г/л + 13,33 г/л					
ТОПШОТ 113, м.д. (100 г/л + 13,33 г/л) ТОО «Кортева Агрисаенс Казахстан» П-3 11.03.2030 г.	2,5-3,0	Рис	Ежовники, клубнекамыш и его разновидности, другие болотные и просовидные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листа у куриного проса (ВВСН) и в фазу 2-3х листьев- кущение риса (ВВСН 12-23). Расход рабочей жидкости: 200-300 л/га	60 (1)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 100 г/л + 20 г/л					
Райсдоктор, м.д. (100 г/л + 20 г/л) ШАНДОНГ ВЕЙФАНГ РЕЙНБОУ КЕМИКАЛ КО., ЛТД П-3 17.02.2036 г.	2,5-3,0	Рис	Ежовники, клубнекамыш и его разновидности, другие болотные и просовидные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листа у куриного проса (ВВСН) и в фазу 2-3х листьев- кущение риса (ВВСН 12-23). Расход рабочей жидкости: 200-300 л/га	60 (1)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 147 г/л + 20 г/л					
ПИЛАРСПИРИТ, м.д. (147 г/л + 20 г/л) Пиларквим (Шанхай) Ко., Лтд. П-3 06.01.2036 г.	1,5-2,0	Рис	Однолетние злаковые (виды ежовника, виды проса и др.); осоковые (клубнекамыш, камыш, виды сыти и др.); болотные широколиственные (монохория, частуха, стрелолист, аммания, др.) сорные растения	Опрыскивание в фазу развития 1-2 листа культурных растений до конца кушения	60(1)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 150 г/л + 30 г/л					
Ристокс, м.д. (150 г/л + 30 г/л) ТОО «Агро-Хим-Лидер» П-3 23.12.2034 г.	1,5-2,0	Рис	Однолетние злаковые (просовидные), осоковые (клубнекамыш), и болотные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе от 2-4 листьев 1 листа – конец кушения культуры и ранние фазы роста сорняков (2-4 листа у злаковых и 5-7 листьев у осоковых, 6- 7 листьев клубнекамыша, 2-4 листьев до середины кушения куриного проса). Перед опрыскиванием рекомендуется полностью отвести воду из чеков. Повторное затопление чеков можно проводить не ранее 3- х дней после обработки. Запрещается технологический сброс воды из чека с момента обработки пестицидом до конца восковой спелости риса (начало сентября). Расход рабочей жидкости 200-300 л/га при наземном опрыскивании и 50-100 л/га при авиационном	-(1)

Цигалофоп-бутил + флорпирауксифен-бензил

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 160 г/л + 12 г/л					
Ксевело, к.э. (160 г/л + 12 г/л) ТОО «Кортева Агрисаенс Казахстан» П-3 09.04.2036 г.	2,0-2,25-2,5	Рис	Злаковые, болотные и однолетние двудольные сорняки	Злаковые сорняки 2-6 листьев (ВВСН 12-16) двудольные 2 листа; движение стебля (ВВСН 12-30) осоковые 2-8 листьев (ВВСН 12-18)	(-1)

Цигалофоп-бутил + бенсульфурон-метил + пеносулам

Рисовод, м.д. (125 г/л + 35 г/л + 50 г/л) ТОО «ФМРус» П-3 06.02.2035 г.	1,5-3,0	Рис	Однолетние злаковые (просовидные), осоковые (в т.ч. клубнекамыш) и болотные широколистные (в т.ч. монокория, частуха, стрелолист и др.) сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев – конец кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений (2-4 листа у злаковых и 5-7 листьев у осоковых). Расход рабочей жидкости 200-300 л/га.	60(1)
---	---------	-----	---	---	-------

Циклоксидим

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 100 г/л					
СТРАТОС УЛЬТРА, 10%, к.э. (100 г/л) BASF SE, Германия П-3 24.03.2033 г.	1,0-1,5 + Пав ДАШ, 1,0-1,5 л/га	Рапс	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев кущения однолетних злаковых сорняков независимо от фазы роста культуры	-1
	2,5 + Пав ДАШ, 2,5 л/га	Рапс	Многолетние злаковые сорняки в т.ч. пырей	Опрыскивание вегетирующей культуры при высоте многолетних сорняков 10 см	-1
	1,0-1,5 + Пав ДАШ, 1,0-1,5 л/га	Подсолнечник	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев кущения однолетних злаковых сорняков независимо от фазы роста культуры	-1
	2,5 + Пав ДАШ, 2,5 л/га	Подсолнечник	Многолетние злаковые сорняки в т.ч. пырей	Опрыскивание вегетирующей культуры при высоте многолетних сорняков 10 см	-1
	1,0-1,5 + Пав ДАШ, 1,0-1,5 л/га	Соя	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев кущения однолетних злаковых сорняков независимо от фазы роста культуры	-1
	2,5 + Пав ДАШ, 2,5 л/га	Соя	Многолетние злаковые сорняки в т.ч. пырей	Опрыскивание вегетирующей культуры при высоте многолетних сорняков 10 см	-1
	1,0-1,5 + Пав ДАШ, 1,0-1,5 л/га	Картофель	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев кущения однолетних злаковых сорняков независимо от фазы роста культуры	-1
	2,5 + Пав ДАШ, 2,5 л/га	Картофель	Многолетние злаковые сорняки в т.ч. пырей	Опрыскивание вегетирующей культуры при высоте многолетних сорняков 10 см	-1
	1,0-1,5 + Пав ДАШ, 1,0-1,5 л/га	Сахарная свекла	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев кущения однолетних злаковых сорняков независимо от фазы роста культуры	-1
	2,5 л/га + Пав ДАШ, 2,5 л/га	Сахарная свекла	Многолетние злаковые сорняки в т.ч. пырей	Опрыскивание вегетирующей культуры при высоте многолетних сорняков 10 см	-1
	1,0-1,5 + Пав ДАШ, 1,0-1,5 л/га	Хлопчатник	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев кущения однолетних злаковых сорняков независимо от фазы роста культуры	-1
	2,5 + Пав ДАШ, 2,5 л/га	Хлопчатник	Многолетние злаковые сорняки в т.ч. пырей	Опрыскивание вегетирующей культуры при высоте многолетних сорняков 10 см	-1
11.06.2034 г.	1,0-1,5 + Пав ДАШ, 1,0-1,5 л/га	Лук	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев кущения однолетних злаковых сорняков независимо от фазы роста культуры	-1
	2,5 + Пав ДАШ, 2,5 л/га	Лук	Многолетние злаковые сорняки в т.ч. пырей	Опрыскивание вегетирующей культуры при высоте многолетних сорняков 10 см	-1
11.06.2034 г.	1,0-1,5 + Пав ДАШ, 1,0-1,5 л/га	Лен	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев – кущение сорняков	-1
	2,5 + Пав ДАШ, 2,5 л/га	Лен	Многолетние злаковые сорняки в т.ч. пырей	Опрыскивание вегетирующей культуры при высоте сорняков 10-15см	-1
Пронто, к.э. (100 г/л) ТОО «EcoSave» П-3 02.03.2036 г.	1,0-2,0	Лен, подсолнечник, рапс, картофель	Однолетние и многолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев кущения сорняков и при высоте пырея ползучего 10-15 см, независимо от фазы роста культуры	60 (1)

Этаметсульфурон-метил

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 750 г/кг					
САЛЬСА, в.д.г. (750 г/кг) ООО «ЭфЭмСи», Россия П-3 24.03.2027 г.	0,015-0,025 + 150 мл/га Тренд 90	Подсолнечник	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Обработка в ранние фазы роста двудольных сорных растений (от семядолей до 2-4 листьев у однолетних и розетки листьев у многолетних) в фазу культуры от 2 до 8 настоящих листьев культуры. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	60(1)
	0,015-0,025+ 150 мл/га Тренд 90	Рапс	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Обработка в ранние фазы роста двудольных сорных растений (от семядолей до 2-4 листьев у однолетних и розетки листьев у многолетних) в фазу культуры от семядолей до бутонизации. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	60(1)
ЭСТОК, в.д.г. (750 г/кг) АО Фирма «Август» П-3 22.04.2030 г.	0,012-0,025+ ПАВ АДЬЮ (0,1% от объема рабочей жидкости)	Рапс	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста двудольных сорных растений (от семядолей до 2-4 листьев у однолетних и розетки листьев у многолетних), в фазу культуры от семядолей до образования цветочных бутонов. Расход рабочей жидкости 50-300 л/га	60(1)

Этофумезат + фенмедифам + десмедифам

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 110 г/л + 90 г/л + 70 г/л					
БЕТА ГАРАНТ, к.э. (110 г/л + 90 г/л + 70 г/л) ТОО «QADAM Group» (Кадам Групп) П-3	1,0	Свёкла сахарная	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. щирица и некоторые однолетние злаковые сорняки	Трехкратное опрыскивание посевов в фазе семядолей сорняков (по первой, второй и третьей волне с интервалом 7-14 дней)	-3

04.06.2028 г.	1,5	Свёкла сахарная	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. щирица и некоторые однолетние злаковые сорняки	Двукратное опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков (по первой и второй волне с интервалом 7-14 дней)	-2
	3,0	Свёкла сахарная	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. щирица и некоторые однолетние злаковые сорняки	Однократное опрыскивание посевов в фазе 4 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков	-1
БЕТАШАНС ТРИО, к.э. (112 г/л + 91 г/л + 71 г/л) ООО Шанс, Россия П-3 23.06.2031 г.	3,0	Свекла сахарная и кормовая	Однолетние двудольные (включая виды щирицы) и некоторые однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 4 настоящих культур. Расход рабочей жидкости 100-200 л/га.	60(1)
	1,5	Свекла сахарная и кормовая	Однолетние двудольные (включая виды щирицы) и некоторые однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 настоящих листьев сорняков (по первой и второй волне). Расход рабочей жидкости 200-300 л/га.	60(2)
	1,0	Свекла сахарная и кормовая	Однолетние двудольные (включая виды щирицы) и некоторые однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе семядолей сорняков (по первой, второй и третьей волне). Расход рабочей жидкости 100-200 л/га.	60(3)
БИЦЕПС ГАРАНТ, к.э. (110 г/л + 90 г/л + 70 г/л) АО Фирма «Август» П-4 01.04.2036 г.	1,0	Свёкла сахарная	Однолетние двудольные, в т.ч. щирица и некоторые однолетние злаковые сорняки	Трехкратное опрыскивание посевов в фазе семядолей сорняков (по первой, второй и третьей волне с интервалом 7- 14 дней). Расход рабочей жидкости 200 л/га.	-(3)
	1,5	Свёкла сахарная	Однолетние двудольные, в т.ч. щирица и некоторые однолетние злаковые сорняки	Двукратное опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков (по первой и второй волне с интервалом 7-14 дней. Расход рабочей жидкости 200 л/га.	-(2)
	3,0	Свёкла сахарная	Однолетние двудольные, в т.ч. щирица и некоторые однолетние злаковые сорняки	Однократное опрыскивание посевов в фазе 4 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости 200 л/га.	-(1)
РАТНИК, к.э. (112 г/л + 91 г/л + 71 г/л) ООО Резерв, Россия П-4 27.11.2028 г.	1,0	Свекла сахарная, столовая и кормовая	Однолетние двудольные, в т.ч. щирица и некоторые однолетние злаковые сорняки	Трехкратное опрыскивание в фазе семядолей сорняков (по первой, второй и третьей волне с интервалом 7-14 дней)	-3
	1,5	Свекла сахарная, столовая и кормовая	Однолетние двудольные, в т.ч. щирица и некоторые однолетние злаковые сорняки	Двукратное опрыскивание в фазе 2-4 листьев сорняков (по первой и второй волне с интервалом 7- 14 дней)	-2
	3,0	Свекла сахарная, столовая и кормовая	Однолетние двудольные, в т.ч. щирица и некоторые однолетние злаковые сорняки	Однократное опрыскивание в фазе 4-х настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков	-1
ТРИОФЕН, к.э. (112 г/л + 91 г/л + 71 г/л) ТОО «Агро-Хим-Лидер» П-3 23.04.2028 г.	1,0	Свекла сахарная	Однолетние двудольные сорняки (включая виды щирицы) и некоторые злаковые сорняки (просо куриное, щетинники, метлица полевая)	Опрыскивание посевов в стадии семядолей у сорняков (по первой, второй и третьей волне). Расход рабочей жидкости – 300-350 л/га	-3
	1,5	Свекла сахарная	Однолетние двудольные сорняки (включая виды щирицы) и некоторые злаковые сорняки (просо куриное, щетинники, метлица полевая)	Опрыскивание посевов в стадии 2-4 листьев у сорняков (по первой и второй волне). Расход рабочей жидкости 300-350 л/га	-2
	3,0	Свекла сахарная	Однолетние двудольные сорняки (включая виды щирицы) и некоторые злаковые сорняки (просо куриное, щетинники, метлица полевая)	Опрыскивание посевов в фазе 4 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости – 300-350 л/га	-1
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 126 г/л + 63 г/л + 21 г/л					
БЕТАРЕН СУПЕР МД, мас.к.э. (126 г/л + 63 г/л + 21 г/л) АО «Щелково Агрохим» П-3 01.10.2030 г.	0,8	Гречиха	Однолетние двудольные (включая виды щирицы) и некоторые злаковые	Опрыскивание посевов в фазу ветвления культуры	-1
	0,9-1,1	Свёкла сахарная	Однолетние двудольные (включая виды щирицы) и некоторые злаковые	Трехкратное опрыскивание: Первое: в фазу семядолей листьев сорняков; Второе и третье: по мере появления новых сорняков в ту же фазу	-3
	1,35-1,65	Свёкла сахарная	Однолетние двудольные (включая виды щирицы) и некоторые злаковые	Двукратное опрыскивание: Первое: в фазу 2-4 листьев сорняков; Второе: по мере появления новых сорняков в ту же фазу	-2
Карабор, м.к.э. (126 г/л + 63 г/л + 21 г/л) ТОО «Астана-Нан» П-3 20.06.2035 г.	0,9-1,1	Свекла сахарная	Однолетние двудольные (включая виды щирицы) и некоторые злаковые сорняки	Трехкратное опрыскивание: 1 – в фазу семядолей сорняков, 2 и 3 – по мере появления сорняков в ту же фазу	-1
	1,35-1,65	Свекла сахарная	Однолетние двудольные (включая виды щирицы) и некоторые злаковые сорняки	Двукратное опрыскивание: 1 – в фазу 2-4 листьев сорняков, 2 – по мере появления сорняков в ту же фазу	-1

ДЕФОЛИАНТЫ И ДЕСИКАНТЫ

Торговое название, препаративная форма, фирма-регистраント. Дата окончания срока регистрации (число, месяц, год)	Норма расхода препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т)	Культура	Способ, время обработки, ограничения	Срок последней обработки, в днях до сбора урожая, в () максимальная кратность обработок
--	--	----------	--------------------------------------	--

Глифосат

Глифосат (аммонийная соль)

РАУНДАП ПАУЭР, в.д.г. (720 г/кг) BayerAgriculture BV, Бельгия П-3 15.03.2027 г.	1,5	Лен масличный	Подсушивание культуры. Опрыскивание посевов в период физиологического дозревания культуры.	14 (1)
	1,5	Зерновые (кроме семенных)	Подсушивание культуры. Опрыскивание посевов в период физиологического дозревания культуры.	14 (1)
	1,5	Рапс	Подсушивание культуры. Опрыскивание посевов в период физиологического дозревания культуры.	14 (1)
	1,5	Подсолнечник	Подсушивание культуры. Опрыскивание посевов в период физиологического дозревания культуры.	14 (1)

Глифосат (изопропиламинная соль)

ПАССАТ, в.р. (360 г/л) Представительство ООО «Агро Эксперт Групп» в РК П-3 03.02.2035 г.	3,0	Зерновые культуры	Опрыскивание посевов за 2 недели до уборки (при влажности зерна не более 30%) для подсушивания зерна и частичного подавления сорняков	-1
---	-----	-------------------	---	----

Глифосат (калийная соль)

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 500 г/л				
УРАГАН ФОРТЕ 500, в.р. (500 г/л) Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария П-3 01.09.2033 г.	1,0-1,5	Зерновые культуры (кроме семенных посевов)	Десикация культурных растений. Опрыскивание в начале фазы восковой спелости зерна	15 (1)
ТАЧДАУН 500, в.р. (500 г/л) Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария П-3 17.04.2033 г.	1,0-1,5	Зерновые культуры (кроме семенных)	Десикация. Опрыскивание в начале восковой спелости	-1
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 540 г/л				
МЕТЕОР 540, в.р. (540 г/л) ТОО «Агро Глобал» П-4 24.01.2029 г.	1,0-1,5	Зерновые культуры (кроме семенных)	Опрыскивание в начале восковой спелости	- (1)
РАУНДАП ЭКСТРА, 54% в.р. (540 г/л) ТОО «Байер КА3» П-3 23.06.2036 г.	2,0	Лен масличный	Подсушивание культуры. Опрыскивание посевов в период физиологического дозревания культуры.	14 (1)
	2,0	Зерновые (кроме семенных)	Подсушивание культуры. Опрыскивание посевов в период физиологического дозревания культуры.	14 (1)
	2,0	Рапс	Подсушивание культуры. Опрыскивание посевов в период физиологического дозревания культуры.	14 (1)
	2,0	Подсолнечник	Подсушивание культуры. Опрыскивание посевов в период физиологического дозревания культуры.	14 (1)
СПРУТ ЭКСТРА, в.р. (540 г/л) АО «Щелково Агрохим» П-3 30.03.2030 г.	1,3-1,5	Рапс яровой (технические цели)	Десикация и подавление сорняков. Опрыскивание культуры в период побурения 60% стручков	-1
ТОРНАДО 540, в.р. (540 г/л) АО Фирма «Август» П-3 19.01.2027 г.	1,0-1,5	Зерновые	Десикация. Опрыскивание посевов за 2 недели до уборки урожая (при влажности зерна не более 30%). Расход рабочей жидкости 50-200 л/га.	14 (1)
	1,0-1,5	Хлопчатник	Десикация. Опрыскивание растений при раскрытии 40-45% коробочек. Расход рабочей жидкости 50-200 л/га.	-(1)
ТРИУМФ МАСТЕР, в.р. (540 г/л) ARCUS INVEST HOLDING B.V П-3 20.01.2033 г.	1,0-1,5	Зерновые культуры	Десикация. Опрыскивание в начале восковой спелости. Расход рабочей жидкости 200 л/га.	-(1)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 600 г/л				
ЖОЙКЫН МЕГА, 60 % в.р. (600 г/л) Моер Кемсайенс Ко, Китай П-3 14.03.2029 г.	1,2-3,5	Рапс	Десикация. Опрыскивание в период побурения 60% стручков в срединной части стебля	15 (1)
	1,2-3,5	Лен	Десикация. Опрыскивание в период начала ранне-желтой спелости (количество зеленых семян 25%)	15 (1)
	1,2-3,5	Подсолнечник	Десикация. Опрыскивание посевов в начале побурения корзинок	15 (1)
	1,2-3,5	Пшеница яровая	Десикация. Опрыскивание в начале фазы восковой спелости	15 (1)
РАП 600, в.р. (600 г/л) ФОРВАРД П-3 06.03.2036 г.	1,2-3,5	Рапс яровой	Десикация. Опрыскивание в период побурения 60% стручков в срединной части стебля	- (1)
	1,2-3,5	Лен долгунец и масличный	Десикация. Опрыскивание в период начала ранне -желтой спелости (количество зеленых семян 25%)	- (1)
	1,2-3,5	Подсолнечник	Десикация. Опрыскивание посевов в начале побурения корзинок	- (1)
	1,2-3,5	Пшеница яровая	Десикация. Опрыскивание в начале фазы восковой спелости зерна	- (1)

Глифосат (изопропиламинная и калиевая соль)

БАЙСАТ 540, в.р	1,0-1,5	Зерновые культуры	Десикация в начале фазы восковой спелости зерна	15(1)
------------------------	---------	-------------------	---	-------

(540 г/л) Филиал "Hangzhou Ruijiang Crop Science Co.,Ltd., Казахстан" "Hangzhou Ruijiang Crop Science Co., Ltd.,Китай" в городе Алматы П-3 27.01.2035 г..				
--	--	--	--	--

Глюфосинат аммония

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 150 г/л				
БАСТА, 15% в.р. (150 г/л) БАСФ СЕ, Германия П-3 26.01.2027 г	1,5-2,5	Соя	Десикация. Опрыскивание в фазе начала побурения бобов нижнего и среднего ярусов	10 (1)
05.04.2033 г.	2,0-2,5	Картофель	Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры	10 (1)
	1,5-2,0	Рапс	Опрыскивание в фазе начала естественного созревания при побурении 70-75% стручков или влажности семян 25-35% при слабой засоренности	10 (1)
	2,0-2,5	Рапс	Опрыскивание в фазе начала естественного созревания при побурении 70-75% стручков или влажности семян 25-35% при сильной засоренности	10 (1)
	1,5-2,0	Пшеница яровая	Опрыскивание в начале фазы восковой спелости	10 (1)
	1,5-2,0	Подсолнечник	Опрыскивание в фазе начала естественного созревания семян при 70-80% побуревших корзинок (при 25-30% влажности семян)	10 (1)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 200 г/л				
ОРИЕНТО, в.р. (200 г/л) LIER CHEMICALCO., LTD. П-3 07.03.2034 г.	1,5-2,0	Подсолнечник	Опрыскивание в фазе начала естественного созревания семян при 70 – 80% побуревших корзинок (при 25–30% относительной влажности семян)	5-6 (1)
	1,5-2,0	Рапс масличный	Опрыскивание в начале естественного созревания при побурении 70 – 75% стручков или влажности семян 25–35% при слабой засоренности	10 (1)
	2,0-2,5	Рапс масличный	Опрыскивание в начале естественного созревания при побурении 70 – 75% стручков или влажности семян 25–35% при слабой засоренности	10 (1)
	2,0	Лён масличный	Опрыскивание в фазе начала ранне –жёлтой спелости (количество зелёных семян 25%) при слабой засоренности	10 (1)
	2,5-3,0	Лён масличный	Опрыскивание в фазе начала ранне –жёлтой спелости (количество зелёных семян 25%) при слабой засоренности	10 (1)
	2,5-3,0	Картофель	Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры, с интервалом между обработками 5-7 дней. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	10 (1)

Дикват (дибромид)

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 150 г/л				
АБИДОС, в.р. (150 г/л) ЛЕЙТОН АГРИО ЕВРОПА КФТ. Венгрия П-3 16.02.2032 г.	2,0	Подсолнечник	Опрыскивание посевов в начале побурения корзинок.	10 (1)
	1,0-2,0	Рапс	Опрыскивание в период побурения 60% стручков в срединной части стебля. Расход рабочей жидкости 100-300 л/га.	-1
	1,0-2,0	Пшеница яровая	Опрыскивание в начале фазы восковой спелости зерна. Расход рабочей жидкости 100-300 л/га.	-1
	1,0-2,0	Лен масличный	Опрыскивание посевов в период физиологического дозревания культуры. Расход рабочей жидкости 100-300 л/га.	-1
ГОЛДЕН РИНГ, в.р. (150 г/л) Представительство ООО «Агро Эксперт Групп» в РК П-3 04.08.2036 г.	1,5-2,0	Пшеница яровая	Десикация. Опрыскивание в начале фазы восковой спелости зерна. Расход рабочей жидкости –100-300 л/га	10 (1)
	1,5-2,0	Рапс	Десикация. Опрыскивание в период побурения 60% стручков в срединной части стебля. Расход рабочей жидкости 100-300 л/га	10 (1)
	2,0	Подсолнечник	Десикация. Опрыскивание посевов в начале побурения корзинок. Расход рабочей жидкости 100- 200 л/га	4-6 (1)
	2,0	Картофель (семенные посевы)	Десикация. Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры. Расход рабочей жидкости 100- 200 л/га	10 (1)
ДИКВАТОР, в.р. (150 г/л) ТОО «Защита-растений- К» П-3 17.02.2027 г	2,0	Хлопчатник	Дефолиация. Опрыскивание по вегетации за 10 дней до уборки.	10 (1)
ДИКОШАНС, в.р. (150 г/л) ООО «Шанс» П-3 07.03.2029 г.	2	Подсолнечник	Десикация. Опрыскивание посевов в начале побурения корзинок. Расход рабочей жидкости 200- 300 л/га	10 (1)
	2	Рапс яровой	Десикация. Опрыскивание посевов при побурении семян в стручках среднего яруса. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	10 (1)
ДИКСОН, в.р. (150 г/л) Наньцзин Эссенс Файн- Кемикал Ко., Лтд., Китай П-3 09.09.2029 г.	1,5-2,0	Рапс	Десикация. Опрыскивание в период побурения 60 % стручков в срединной части стебля. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	4-6 (1)
	1,5-2,0	Пшеница яровая	Десикация. Опрыскивание в начале фазы восковой спелости. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	10 (1)
	2,0	Подсолнечник	Десикация. Опрыскивание посевов в начале побурения корзинок. Расход рабочей жидкости 200- 300 л/га	4-6 (1)
Диктатор, в.р. (150 г/л) ООО «Интер Групп» П-3 28.10.2034 г.	2,0	Подсолнечник	Опрыскивание в начале побурения корзинок. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	10(1)
	1,5-2,0	Пшеница яровая	Опрыскивание в начале фазы восковой спелости зерна. Расход рабочей жидкости 100-300 л/га	10(1)
РЕГИОН СУПЕР, в.р. (150 г/л) ТОО «Астана-Нан» П-3 14.07.2036 г.	1,5-2,0	Пшеница яровая	Опрыскивание в начале фазы восковой спелости зерна	-1
	2,0	Подсолнечник	Опрыскивание посевов в начале побурения корзинок	-1
	2,0	Картофель	Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры	-1
	1,5-2,0	Рапс	Опрыскивание в период побурения 60% стручков в срединной части стебля	-1
СКОРПИОН, в.р. (150 г/л)	1,5-2,0	Пшеница яровая	Опрыскивание в начале фазы восковой спелости зерна	10 (1)
	2,0	Подсолнечник	Опрыскивание посевов в начале побурения корзинок	4-6 (1)

Лейтон Агрио Европа Кфт., Венгрия П-3 28.11.2034 г.	2,0	Картофель (семенные участки)	Опрыскивание в период формирования клубней и огрубления кожуры	10 (1)
	1,5-2,0	Рапс	Опрыскивание в период побурения 60% стручков в срединной части стебля	4-6 (1)
СУХОВЕЙ, в.р. (150 г/л) АО Фирма «Август» П-3 19.01.2027 г.	1,0-2,0	Лен масличный	Десикация. Опрыскивание посевов в период физиологического дозревания культуры. Расход рабочей жидкости 100-300 л/га	10 (1)
	2,0	Подсолнечник	Десикация. Опрыскивание культуры в фазе начала побурения корзинок. Расход рабочей жидкости 100-300 л/га	4-6 (1)
	2,0	Картофель	Десикация. Опрыскивание культуры в период окончания формирования клубней и огрубения кожуры. Расход рабочей жидкости 100-300 л/га	12 (1)
	1,5-2,0	Пшеница яровая	Десикация. Опрыскивание посевов в период созревания при влажности зерна не выше 30%. Расход рабочей жидкости 200- 300 л/га	7 (1)
	1,5-2,0	Лен масличный	Десикация. Опрыскивание посевов в фазу ранней желтой спелости льна, за 7-10 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости- 100-300 л/га	10(1)
	1,5-2,0	Рапс	Десикация. Опрыскивание посевов при побурении семян в стручках среднего яруса. Расход рабочей жидкости 100-300 л/га	10 (1)
	1,5-2,0	Горчица	Десикация. Опрыскивание в период полной биологической спелости за 7-10 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости 100-300 л/га	10 (1)
	1,5-2,0	Гречиха	Опрыскивание в период полной биологической спелости за 7-10 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости- 100-300 л/га	10 (1)
	1,0-2,0	Горох	Десикация. Опрыскивание в период полной биологической спелости за 7-12 дней до уборки. Расход рабочей жидкости–100-300л/га	12(1)
	2,0	Хлопчатник	Десикация. Опрыскивание по вегетации за 10 дней до уборки. Расход рабочей жидкости–100-300 л/га	-(1)
	1,0-2,0	Рапс	Десикация. Опрыскивание в период побурения 60% стручков в срединной части стебля. Расход рабочей жидкости–100-300л/га	10 (1)
	1,5-2,5	Чечевица	Десикация, Опрыскивание посевов при побурении 50-70% бобов. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	12 (1)
ТОНГАРА, в.р. (150 г/л) АО «Щелково Агрохим» П-3 19.03.2028 г.	1,0-2,0	Пшеница яровая (семенные посевы)	Опрыскивание посевов в период созревания при влажности зерна не выше 30%	-1
	1,0-2,0	Рапс	Опрыскивание посевов в период созревания при побурении 70-75% стручков или влажности семян 25-35%	-1
	1,0-2,0	Подсолнечник	Опрыскивание посевов в начале побурения корзинок	-1
	1,5-2,0	Горох	Опрыскивание в период полной биологической спелости за 7-10 дней до уборки культуры	7-10 (1)
	1,5-2,0	Соя	Опрыскивание в фазу побурения 50-70 % бобов за 7-10 дней до уборки культуры	7-10 (1)
	1,0-2,0	Картофель	Опрыскивание в период Окончаний формирования клубней и огрубения кожуры	7-10 (1)
	1,0-2,0	Лен	Опрыскивание в фазу физиологического созревания культуры	7-10 (1)
	1,0-2,0	Чечевица	Опрыскивание в период полной биологической спелости за 7-10 дней до уборки культуры	7-10 (1)
Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 200 г/л				
Боррадо в.р. (200 г/л) Lier Chemical CO., LTD. П-3 05.12.2033 г.	1,2-2,0	Картофель	Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры.	40(1)
	1,2-2,0	Лен	Опрыскивание посевов при созревании 80% коробочек. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га.	-(1)
	1,2-2,0	Рапс	Опрыскивание в период побурения 60% стручков в срединной части стебля	10(1)
	1,2-2,0	Подсолнечник	Опрыскивание посевов в начале побурения корзинок	10(1)
	1,2-2,0	Чечевица	Опрыскивание посевов при побурении 50-70% бобов за 7-10 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости –200-300 л/га.	-(1)
	1,5-2,5	Соя	Опрыскивание посевов при побурении 50-70% бобов за 7-10 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости –200-300 л/га.	12(1)
ДИКВАТИС, в.р. (200 г/л) ТОО «Достык-Агро 2012» П-3 28.01.2036 г.	1,5-2,25	Подсолнечник	Опрыскивание посевов в начале побурения корзинок	5 (1)
	1,5-2,25	Рапс	Опрыскивание посевов при побурении семян в стручках среднего яруса	5 (1)
	1,5-2,25	Пшеница яровая	Опрыскивание в начале восковой спелости зерна	10 (1)
Дикхот, в.р. (200 г/л) ТОО «Тerra Prime» П-3 15.04.2036 г.	1,125-1,5	Пшеница яровая	Опрыскивание в начале фазы восковой спелости зерна. Расход рабочей жидкости – 200–300 л/га.	10 (1)
	1,5	Картофель	Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры. Расход рабочей жидкости – 200–300 л/га.	5(1)
	1,5-2,25	Рапс	Опрыскивание посевов при побурении семян в стручках среднего яруса. Расход рабочей жидкости – 200–300 л/га.	5(1)
	1,5-2,25	Подсолнечник	Опрыскивание посевов в начале побурения корзинок. Расход рабочей жидкости – 200–300 л/га.	5(1)
ЛЕГИОН ФОРТЕ 200, в.р. (200 г/л) ТОО «QADAM Group» (Кадам Групп) П-3 20.03.2028 г.	1,5-2,25	Подсолнечник	Опрыскивание посевов в начале побурения корзинок	5 (1)
	1,5-2,25	Рапс	Опрыскивание посевов при побурении семян в стручках среднего яруса	5 (1)
	1,5	Картофель	Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры	5 (1)
РЕГЛОН ФОРТЕ 200, в.р. (200 г/л) Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария П-3 18.11.2035 г.	1,5-2,25	Подсолнечник	Опрыскивание посевов в начале побурения корзинок.	5 (1)
	1,5-2,25	Рапс	Опрыскивание посевов при побурении семян в стручках среднего яруса.	5 (1)
	1,5-2,25	Соя	Опрыскивание посевов при побурении 50-70% бобов.	10 (1)
	1,5	Картофель	Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры.	10 (1)
РЕГЛОН ЭЙР 200, в.р. (200 г/л) Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария П-3 02.12.2032 г.	1,25-1,75	Масличный лен	Опрыскивание посевов за 10 дней до уборки	10 (1)
	1,25-1,75	Яровой рапс	Опрыскивание посевов при побурении семян в стручках среднего яруса	10 (1)
	1,25-1,75	Подсолнечник	Опрыскивание посевов в начале побурения корзинок	10 (1)
ХИТОН, в.р. (200 г/л)	1,125-1,5	Пшеница яровая	Опрыскивание посевов в начале восковой спелости зерна	10 (1)

ШАНДОНГ ВЕЙФАНГ РЕЙНБОУ КЕМИКАЛ КО., ЛТД, П-3 02.05.2028 г.	1,5	Подсолнечник	Опрыскивание посевов в начале побурения корзинок	5 (1)
<i>Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 250 г/л</i>				
СОЛИСТ, в.р. (250 г/л) ARCUS INVEST HOLDING B.V. П-3 12.03.2035 г.	1,5-1,7	Подсолнечник	Десикация. Опрыскивание посевов в начале побурения корзинок	10(1)
	1,0-1,3	Пшеница яровая	Десикация. Опрыскивание посевов в начале восковой спелости зерна	10(1)
<i>Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 300 г/л</i>				
ДИСКОНТ, в.р. (300 г/л) ТОО «АЙБАД-2015» П-3 10.04.2035 г.	0,75-1,0	Пшеница яровая	Опрыскивание в начале фазы восковой спелости зерна	10(1)
	1,0	Подсолнечник	Опрыскивание посевов в начале побурения корзинок	4-6(1)
	1,0	Лен	Опрыскивание в фазе начала раннежелтой спелости(количество зеленых семян 25%)	4-6(1)
СПОРТАК, в.р. (300 г/л) Синтезия Кемп ГмбХ, Германия П-3 13.01.2036 г.	0,75-1,0	Пшеница яровая	Опрыскивание в начале фазы восковой спелости зерна	10 (1)
	1,0	Подсолнечник	Опрыскивание посевов в начале побурения корзинок	4-6 (1)

Тидиазурон + диурон

<i>Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 360 г/л + 180 г/л</i>				
АВГУРОН ЭКСТРА, с.к. (360 г/л + 180 г/л) АО Фирма «Август» П-4 30.11.2026 г.	0,1-0,2	Хлопчатник	Опрыскивание растений при раскрытии 40-45% коробочек. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	12-15 (1)
АГРОН ГОЛД, с.к. (360 г/л + 180 г/л) ТОО «Агро-Хим- Лидер» П-3 12.02.2029 г.	0,15-0,2	Хлопчатник	Дефолиация. Опрыскивание растений при раскрытии 40-45% коробочек	12-15 (1)
АРУТИДИУРОН, с.к. (360 г/л + 180 г/л) Представительство Nanjing Rinchon International Trading Co., Ltd., в Республике Казахстан П-4 08.06.2033 г.	0,1-0,2	Хлопчатник	Опрыскивание растений при раскрытии 40-45% коробочек	12-15 (1)
ДРОБЬ ПЛЮС, с.к. (360 г/л + 180 г/л) ТОО «QADAM Group» (Кадам Групп) П-3 20.11.2035 г.	0,1-0,2	Хлопчатник	Дефолиация. Сплошное наземное опрыскивание при 40-45% раскрытии коробок.	12-15 (1)
ИЗИФОЛ, к.с. (360 г/л + 180 г/л) Цзянсу Хуейфен Агрокемикал Ко., Лтд, Китай П-3 20.03.2028 г.	0,158-0,180	Хлопчатник	Дефолиация. Опрыскивание растений при 40-45% раскрытии коробочек	12-15 (1)
КОТТОН, с.к. (360 г/л + 180 г/л) ТОО «Астана-Нан» П-3 18.06.2036 г.	0,1-0,2	Хлопчатник	Десикация. Опрыскивание растений при раскрытии 40-45% коробочек	12-15 (1)
Рэдфайр, с.к. (360 г/л + 180 г/л) ШАНДОНГ ВЕЙФАНГ РЕЙНБОУ КЕМИКАЛ КО., ЛТД П-3 17.02.2036 г.	0,1-0,2	Хлопчатник	Десикация. Опрыскивание растений при раскрытии 40-45% коробочек	12-15 (1)

РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА РАСТЕНИЙ

Торговое название, препаративная форма, фирма-регистраント. Дата окончания срока регистрации (число, месяц, год)	Норма расхода препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т, л/га, мл/га, мл/кг)	Культура	Назначение	Способ, время, кратность обработки, ограничения
1	2	3	4	5

Bacillus subtilis

ЭКСТРАСОЛ, жидкая форма препарата- культурная жидкость Bacillus subtilis штамм Ч-13 ТОО НПО «Бисолби КЗ» П-4 21.06.2033 г.	2,0 мл/кг	Хлопчатник	Предпосевная обработка семян. Расход рабочего раствора 200 мл/кг. Повышение всхожести семян, стимуляция роста и развития, Повышение устойчивости к болезням – корневые гнили, гоммоз.	-(1)
	1,0 л/т	Рис	Предпосевная обработка семян. Расход рабочего раствора 10л/т. Повышение всхожести семян, стимуляция роста и развития, повышение устойчивости к корневым гнилям	-(1)
	2,0 л/га	Картофель	Опрыскивание по вегетации в фазу образования стеблей и листьев, бутонизации и послецветения концентрированным препаратом или его рабочим раствором с концентрацией не менее 1 %. Стимуляция роста и развития, ускорение созревания, повышение устойчивости к болезням – фитофтороз, ризоктониоз, фузариоз, парша	-(1)
	2,0 мл/кг	Свекла сахарная	Предпосевная обработка семян. Расход рабочего раствора 200мл/кг. Повышение всхожести семян, стимуляция роста и развития, повышение устойчивости к корнееду	-(1)
	2,0 л/га	Пшеница и ячмень яровые	Опрыскивание по вегетации в фазу кущения или трубкования культуры концентрированным препаратом или его рабочим раствором с концентрацией не менее 1 %. Стимуляция роста и развития, повышение устойчивости – бурая, стеблевая ржавчины, септориоз, темно-бурая пятнистость	-(1)
	1,0 л/т	Пшеница и ячмень яровые	Предпосевная обработка семян. Расход рабочего раствора 10 л/т. Повышение всхожести семян, рост стимулирующей и антистрессовой активности, улучшение корнеобразования и устойчивости к болезням плесневения семян и проростков, корневые гнили.	-(1)

Трис (2гидроксил)аммоний-0- толилоксиацетат 855 мг/кг + 1-хлорметилсилатран 141мг/кг

МИВАЛ ФОРТЕ, в.р.п. ТОО «АГРОСИЛА 2017» П-4 07.07.2031 г.	10 г/т	Пшеница озимая и яровая	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, увеличение урожайности и качества зерна, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды	Обработка семян. Расход рабочей жидкости -10л/т	30 (2)
	10 г/га	Пшеница озимая и яровая	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, увеличение урожайности и качества зерна, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды	Опрыскивание в фазе кущения - начало выхода в трубку. Расход рабочей жидкости 300 л/га	30 (2)
	10 г/т	Ячмень озимый и яровой	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, увеличение урожайности и качества зерна, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды	Обработка семян. Расход рабочей жидкости -10л/т.	30 (2)
	10 г/га	Ячмень озимый и яровой	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, увеличение урожайности и качества зерна, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды	Опрыскивание в фазе кущения - начало выхода в трубку. Расход рабочей жидкости 300 л/га	30 (2)
	10 г/т	Рис	Увеличение массы 1000 зерен, снижение числа стерильных колосков в метелке. Повышение урожайности	Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости - 10 л/т	30(2)
	10 г/га	Рис	Увеличение массы 1000 зерен, снижение числа стерильных колосков в метелке. Повышение урожайности	Опрыскивание в фазе кущения - начало выхода в трубку. Расход рабочей жидкости 300 л/га	30(2)
	20 г/т	Кукуруза	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, усиление ростовых процессов, повышение урожайности и качества зерна	Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости - 10 л/т	30(2)
	20 г/га	Кукуруза	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, усиление ростовых процессов, повышение урожайности и качества зерна	Опрыскивание в фазе выметывания метелок. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(2)
	2 г/т	Картофель	Повышение урожайности, увеличение выхода клубней товарной фракции. Увеличение содержания крахмала, витамина С, уменьшение содержания нитратов	Предпосадочная обработка клубней. Расход рабочей жидкости - 10 л/т	30(3)
	20 г/га	Картофель	Повышение урожайности, увеличение выхода клубней товарной фракции. Увеличение содержания крахмала, витамина С, уменьшение содержания нитратов	Опрыскивание в начальный период роста (2-3 листьев) и в фазе бутонизации. Расход рабочей жидкости 300 л/га	30(3)
	20 г/га	Картофель	Повышение урожайности, увеличение выхода клубней товарной фракции. Увеличение содержания крахмала, витамина С, уменьшение содержания нитратов	Опрыскивание в начальный период роста (после прорывки рассады) и в фазе бутонизации - начала цветения 1-й кисти. Расход рабочей жидкости 300 л/га	30(3)
	10 г/га	Картофель	Повышение урожайности, увеличение выхода клубней товарной фракции. Увеличение содержания крахмала, витамина С, уменьшение содержания нитратов	Опрыскивание в фазах 2-4-х настоящих листьев и бутонизации. Расход рабочей жидкости 300 л/га	30(3)

Диметилпиридин и комплекс ростовых веществ

АГРОСТИМУЛИН 2,6%, в.с.р. ЗАО «Высокий урожай», Украина П-3 14.02.2033 г.	10,0 мл/т	Пшеница яровая	Повышение продуктивности	Предпосевная обработка семян совместно с протравителем
	10,0 мл/т	Пшеница яровая и озимая	Повышение продуктивности	Опрыскивание посевов в период вегетации совместно с гербицидной обработкой. Расход рабочего раствора –250 л/га

Дифеноконазол+ паклобутразол

СЕТАР 375 с.к. (250 г/л+125г/л) Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария П-3 10.05.2033 г.	0,3-0,5	Яровой рапс	Опрыскивание в период вегетации в фазу бутонизации	30 (1)
---	---------	-------------	--	--------

гибберелловая кислота + индол-3-илуксусная кислота + 14-гидроксилированный брассиностероид

ПИЛАРОПТИМ , в.р.п. (1,35 г/кг +0,0052 г/кг + 0,0031 г/кг) Пиларквим (Шанхай) Ко., Лтд. П-3 30.12.2035 г.	0,03-0,05	Пшеница	Способствуют прорастанию семян и развитию корней, повышают иммунитет к болезням и неблагоприятным факторам окружающей среды, усиливают фотосинтез растений, повышают урожайность и улучшают качество продукции	Опрыскивание в критический период роста пшеницы. Обработка 1-2
---	-----------	---------	--	--

Коллоидное серебро + полигексаметиленбигуанид гидрохлорид

ЗЕРЕБРА АГРО, в.р. (500 м г/л + 100 м г/л) ООО «Нанобиотех», Россия П-3 11.07.2027 г.	60,0-100,0 мл/т	Пшеница яровая	Повышения иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости 10 л/т
	60,0-100,0 мл/га			Опрыскивание в период вегетации в фазе начала образование корзинок. Расход рабочей жидкости -300 л/га
	60,0-100,0 мл/т	Ячмень яровой		Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости 10 л/т
	60,0-100,0 мл/га			Опрыскивание растений в фазе конец кущения – начало выхода в трубку. Расход рабочей жидкости 300 л/га
	75,0-100,0 мл/т	Соя		Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости 10 л/т
	75,0-100,0 мл/га			Опрыскивание в фазе бутонизации. Расход рабочей жидкости – 300 л/га
	75,0-100,0 мл/т	Подсолнечник		Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости – 10 л/т
	75,0-100,0 мл/га			Опрыскивание в период вегетации в фазе начала образование корзинок. Расход рабочей жидкости –300 л/га
	150,0-250,0 мл/га	Яблоня		Опрыскивание в период вегетации: первое - в фазе розового бутона. Второе – в фазе грецкий орех. Расход рабочей жидкости – 1000 л/га

Меламинавая соль бис (оксиметил) фосфиновой кислоты

МЕЛАФЕН, в.р. (0,001 г/л) ООО «НПО «БиоХимСервис», Россия П-4 09.04.2029 г.	10,0 мл/т	Пшеница яровая	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, усиление ростовых процессов, повышение морозостойкости, устойчивости растений к неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности и качества зерна	Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости 10 л/т
	5,0 мл/га			Опрыскивание в фазе начала выхода в трубку. Расход рабочей жидкости 200 л/га
	100,0 мл/т	Подсолнечник	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности и качества семян	Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости 10 л/т
	5,0 мл/га			Опрыскивание в фазе 4- 6 листьев. Расход рабочей жидкости – 200 л/га
	10,0 мл/т	Соя	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности и качества семян	Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости 10 л/т
	5,0 мл/га			Опрыскивание в фазе бутонизации. Расход рабочей жидкости 200 л/га
	10,0 мл/т	Картофель	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, увеличение выхода товарных клубней, повышение качества урожая	Предпосевная обработка клубней. Расход рабочей жидкости 10 л/т
	5,0 мл/га			Опрыскивание в фазе бутонизации. Расход рабочей жидкости 200 л/га
	2,0 мл/кг	Томаты	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, увеличение урожайности, повышение качества урожая	Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости 2 л/1кг
	5,0 мл/га			Опрыскивание растений в фазу начала цветения. Расход рабочей жидкости 300 л/га
	1,0 мл/кг	Хлопчатник	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности и качества урожая	Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости 1 л/1 кг
	5,0 мл/га			Опрыскивание растений в фазу начала цветения. Расход рабочей жидкости 300 л/га

Мепикват-хлорид

ПИКВАТ, 5 % в.р. (50 г/л) ТОО «Агро-Хим-Лидер» П-4 06.02.2029 г.	1,0-1,5	Хлопчатник	Ускорение созревания коробочек	Опрыскивание двукратное: в начале цветения и в период массового цветения 0,4-0,6% раствором препарата. Расход рабочей жидкости 250 л/га
---	---------	------------	--------------------------------	---

Мепикват-хлорид + метконазол

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 210 г/л + 30 г/л				
КАРАМБА ТУРБО, 24% в.р.к. (210 г/л + 30 г/л) BASF Agro B.V. П-4 20.02.2034 г.	0,7-1,0	Рапс	Рострегулирующее действие (увеличение диаметра корневой шейки и массы корня, равномерное цветение и стручкообразование), фунгицидная активность	Опрыскивание посевов в фазу 4-6 листьев культуры
ТОКТАУТ, в.р. (210 г/л + 30 г/л) ШАНДОНГ ВЕЙФАНГ РЕЙНБОУ КЕМИКАЛ КО., ЛТД, П-4 27.02.2035 г.	0,7-1,0	Рапс	Рострегулирующее действие (увеличение диаметра корневой шейки и массы корня, равномерное цветение и стручкообразование), фунгицидная активность	Опрыскивание посевов в фазу 4-6 листьев культуры

П-нитрофенолят натрия + о-нитрофенолят натрия + 5-нитрогваяколят натрия

АТЕНИК ПЛЮС, в.р. (9 г/л + 6 г/л + 3 г/л) Асахи Кемикал Юроп с.р.о., Япония П-3 17.05.2027 г.	0,2	Яблоня	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным условиям среды, повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе начала цветения, 2-е – в фазе завязывания плодов, 3-е – в фазе развития плода «грецкий орех». Расход – 1000 л/га
	0,2	Виноград	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным условиям среды, повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – за 10 дней до цветения, 2-е – в фазе образования ягод, 3-е – через 14 дней после второго опрыскивания. Расход – 800 л/га
	0,2	Арбуз	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным условиям среды, повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе «шатрика», 2-е – в начале цветения, 3-е – в начале формирования завязи, 4-е – через 15 дней после третьего опрыскивания. Расход – 300 л/га
	0,2	Дыня	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным условиям среды, повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе 2-3 настоящих листьев, 2-е – в начале цветения, 3-е – в начале формирования завязи, 4-е – через 15 дней после третьего опрыскивания. Расход – 300 л/га
	0,2	Капуста	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным условиям среды, повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – через 7 дней после высадки рассады, 2-е – в фазе формирования розетки листьев, 3-е – в фазе завязывания кочана. Расход – 300 л/га
	0,2	Огурец	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным условиям среды, повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в начале фазы цветения, 2, 3 и 4-е – через 10 дней после первого опрыскивания с интервалом 10 дней. Расход – 400 л/га
	0,2	Томаты	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным условиям среды, повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе цветения первой кисти, 2-е – в фазе цветения третьей кисти. Расход – 300 л/га

Прогексадион кальция

Вивифул 25% с.к. (285 г/л) Филиал АО "Сумитомо Корпорэйшн" в Алматы П-3 19.09.2035 г.	0,5	яблоня	Регулятор роста растений. Листовое опрыскивание 1 или 2 раза. Расход рабочей жидкости: 300- 1000 л/га. Время обработки: - 1-ая обработка: при бутонизации до конца цветения. - 2-ая обработка: при размере плода до 10 мм и до достижения плода около 50% конечного размера. Интервал между обработками: 3-5 недель. Ограничения: Не опрыскивать если ожидается дождь в период 8 часов после обработки; Обработать ранним утром или ранним вечером. Период действия: 3-5 недель. Максимальная дозировка на дерево, за сезон: 1.0 л/ га	56 (2)
--	-----	--------	--	--------

Поли-бета-гидроксимасляная кислота +магний сернокислый + калий фосфорнокислый двузамещённый + калий азотнокислый + карбамид

АЛЬБИТ, т.пс. (6,2 г/кг + 29,8 г/кг + 91,1 г/кг + 91,2 г/кг + 181,5 г/кг) ООО «НПФ «Альбит», Россия П-3 17.04.2036 г.	0,1 л/т	Пшеница яровая	Повышение урожайности.	Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости 10 л/т
	0,04 л/га	Пшеница яровая	Повышение урожайности.	Опрыскивание в период вегетации в фазах: кущение – выход в трубку и колошение – цветение. Расход рабочей жидкости – 50-300 л/га
	0,04 л/т	Ячмень	Повышение урожайности.	Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости – 10 л/т
	0,04 л/га	Ячмень	Повышение урожайности.	Опрыскивание в период вегетации в фазах: кущение – выход в трубку и колошение – цветение. Расход рабочей жидкости – 50-300 л/га

Тиаметоксам + мефеноксам + флудиоксонил

КРУЙЗЕР OSR 322, с.к. (280 г/л + 33,3 г/л + 8 г/л) Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария П-3 22.09.2030 г.	15,0 кг/га	Рапс	Стимулирует рост и развитие культуры	Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаговременно (до 1 года)
--	------------	------	--------------------------------------	---

Тринексапак-этил

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 250 г/л				
ЗЕРНОРОСТ, к.э. (250 г/л) ООО"Шанс" П-3 26.07.2032	0,2-0,4 л/га	Пшеница и ячмень яровые и озимые	Предупреждение полегания, повышение урожайности и качества зерна	Опрыскивание в фазе начала кущения – выход в трубку до фазы появления флагового листа. Расход рабочей жидкости 150-200 л/га
	0,2 л/га	Пшеница озимая	Предупреждение полегания, повышение урожайности и качества зерна	Опрыскивание в фазах кущения и выхода в трубку до фазы появления флагового листа. Расход рабочей жидкости – 150-200 л/га
КАНДОПА к.э. (250 г/л) ШАНДОНГ ВЕЙФАНГ РЕЙНБОУ КЕМИКАЛ КО., ЛТД П-4 30.05.2033	0,2-0,4 л/га	Яровая пшеница, яровой ячмень	Повышение урожайности и устойчивости к полеганию. Опрыскивание в фазе начала кущения – выход в трубку до фазы появления флагового листа. Расход рабочей жидкости 150-200 л/га	- (1)
МОДДУС 250, к.э. (250 г/л) Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария П-3 27.10.2030 г.	0,2-0,4 л/га	Пшеница яровая	Повышение урожайности и устойчивости к полеганию	Опрыскивание в фазе начала кущения – выход в трубку до фазы появления флагового листа

Тритерпеновые кислоты

НОВОСИЛ, в.э. (100 г/л) ТОО «Агро-Хим-Лидер» П-4	50,0 мл/га	Томаты	Увеличение урожайности, выхода товарных плодов, содержания сухих веществ, сахара, витамина С. Снижение кислотности. Снижение поражаемости фитофторозом, альтернариозом, септориозом,	Трехкратное опрыскивание в фазы 12 и 3-й кисти,
--	------------	--------	--	---

09.03.2033 г.			черной бактериальной пятнистостью. Ускорение созревания на 4-6 дней.	
	15,0 мл/га	Огурцы	Увеличение урожайности, семян, выхода стандартных плодов, содержания сахара, витамина С, Снижение поражаемости пероноспорозом, бактериозом, мучнистой росой, усыханием. Наступление спелости на 2-3 дня раньше	Четырехкратное опрыскивание в фазу 2-4 настоящих листьев, в начале цветения, в фазу массового цветения и через 7 дней после третьего
	100,0 мл/га	Лук на репку	Увеличение урожайности, увеличение массы 1000 семян, повышение энергии прорастания, всхожести, количества стрелок, диаметра соцветия. Снижение поражаемости пероноспорозом. Наступление биологической зрелости на 3-6 дней раньше.	Двукратное опрыскивание в фазу 4- го листа и через 15 дней после первого
	40,0 мл/га	Капуста белокочанная	Увеличение урожайности, крупности и плотности кочанов, содержания сахара и витамина С, выхода товарных кочанов. Наступление технической зрелости на 2-3 дня раньше.	Двукратное опрыскивание в фазу образования 6-7 листьев и в фазу массовой завязи кочанов
	50,0 мл/га	Пшеница яровая	Увеличение урожайности, продуктивной кустистости, веса 1000 зерен на колосе, числа зерен на колосе, повышение количества клейковины, увеличение массы корневой системы	Обработка семян
	15,0 мл/га	Пшеница яровая и озимая	Увеличение урожайности, продуктивной кустистости, веса 1000 зерен на колосе, числа зерен на колосе, повышение количества клейковины, увеличение массы корневой системы. Снижение полеглости растений. Уменьшение поражения мучнистой росой, корневой гнилью. Ускорение созревания на 4-6 дней.	Двукратное опрыскивание в фазу кущения и в фазу колошения

Триклопир

Топпер, 10% таб. (100 г/кг) Arysta LifeScience Benelux Sprl П-3 12.11.2035 г.	10-15 таб./га	Груша	Блокировка преждевременное Опадение созревающих плодов, улучшение окраски фруктов, увеличение размеров плодов.	Однократное опрыскивание в период вегетации за 21 день до сбора урожая. Рекомендуемое количество воды: 500 -1000 л/га.
	15-20 таб./га	Яблоня	Блокировка преждевременное опадение созревающих плодов, улучшение окраски фруктов, увеличение размеров плодов.	Однократное опрыскивание в период вегетации за 21 день до сбора урожая. Рекомендуемое количество воды: 500-1000 л/га.

Хлормекватхлорид

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 750 г/л				
РЭГГИ, в.р.к. (750 г/л) АО Фирма «Август» П-3 07.02.2029 г.	1,0 л/га	Пшеница яровая	Предотвращение полегания, повышение урожайности	Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку. Расход рабочей жидкости 300 л/га
ЦЕ ЦЕ ЦЕ 750, в.к. (750 г/л) БАСФ СЕ, Германия П-3 30.03.2028 г.	1,0 л/га	Пшеница яровая и озимая	Предотвращение полегания	Опрыскивание в фазе кущения – трубкования
ЦИЦЕРОН 75% в.к. (750 г/л) НАНЬЦЗИН ЭССЕНС ФАЙН-КЕМИКАЛ КО. ЛТД П-3 10.05.2033	1,0-1,5 л/га	Пшеница яровая и озимая	Предотвращение полегания. Опрыскивание в фазе кущения трубкования	-

Эндомикоризный гриб *Glomus Iranicum var. tenuihypharum var.nov*

РЕСИД, с.п. (3*10 ⁹ спорангий/100 г) Симборг С.Л., Испания П-4 28.03.2029 г.	5,5-7,5 кг/т	Пшеница и ячмень яровые	Регулятор роста растений	Предназначен для протравливания семян злаковых и зерновых культур. Следует смочить семена небольшим количеством воды, затем добавить соответствующее количество препарата и перемешать. Рекомендуется сеять семена сразу после применения Ресиды, с.п., не допуская их высыхания
	0,125 кг/кг	Подсолнечник		Предназначен для протравливания семян. Следует смочить семена небольшим количеством воды, затем добавить соответствующее количество препарата и перемешать. Рекомендуется сеять семена сразу после применения Ресиды, с.п., не допуская их высыхания
	4,5 кг/100 кг	Кукуруза		Предназначен для протравливания семян. Следует смочить семена небольшим количеством воды, затем добавить соответствующее количество препарата и перемешать. Рекомендуется сеять семена сразу после применения Ресиды, с.п., не допуская их высыхания

Гиббереллин А4- А7

ГИББЕРА, в.р. (10 г/л) АО «Щелково Агрохим» П-3 15.03.2034 г.	0,25-0,5 л/га	Яблоня	Опрыскивание растений: 1-е - в конце Фазы цветения; 2-е и 3-е - с интервалом 7-10 дней.	-(3)
--	---------------	--------	---	------

Хлорпрофам

Нео Стоп 500, в.р. (500 г/л) Arysta LifeScience Benelux Sprl П-3 16.07.2034 г.	24 мл/т	Картофель	Обработка клубней в хранилище при закладе на хранение с использованием температурного туманообразователя. Вход в помещение допускается не ранее, чем через 24 часа после обработки, по достижении концентрации хлорпрофама в воздухе на уровне ниже ПДК взр (2 мг/м ³). Запрещается обработка семенного картофеля.	21(1)
---	---------	-----------	--	-------

**ПРЕПАРАТЫ, РАЗРЕШЕННЫЕ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОТИВ ВРЕДИТЕЛЕЙ ЗАПАСОВ В СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ**

Торговое название, препаративная форма, фирма-регистраント. Дата окончания срока регистрации (число, месяц, год)	Норма расхода препарата (г/т, мл/т, г/м ² , г/м ³)	Культура, обрабатываемый объект	Вредный организм	Способ, время обработки, ограничения
1	2	3	4	5

Алюминия фосфид

<i>Концентрация д.в. (+/- 5%) – 560 г/л</i>				
АГФОС, 56% таб. (560 г/кг) ТОО «Агро Глобал» 19.02.2029 г.	5,0 г/м ³	Незагруженные склады, амбары и зернохранилища	Вредители запасов	Фумигация, экспозиция 5 суток. Допуск людей и загрузка складов после проветривания. Содержание фосфористого водорода в воздухе не должно превышать ПДК
	5,0 г/м ³	Мука, крупа	Вредители запасов	Фумигация, экспозиция 5 суток. Допуск людей в склады после проветривания. Реализация продукции при отсутствии остатков фосфористого водорода не ранее 5 суток после пассивной дегазации
	12,0 г/м ³	Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью до 2,5 м и затаренное в мешки под брезентом	Вредители запасов	Фумигация при 0-7 °С, экспозиция 10 суток, расход препарата на объем пространства, занятого зерном. Допуск людей и загрузка складов после полного проветривания. Реализация через 20 дней после обработки при остатке фосфористого водорода не выше МДУ
ГЕРМЕС 560, таб. (560 г/кг) Синтезия Кемп ГмбХ, Германия 06.02.2035 г.	5,0 г/м ³	Мука, крупа, сухие овощи	Вредители запасов	Фумигация, экспозиция 5 суток. Допуск людей в склады после проветривания. Реализация продукции при отсутствии остатков фосфористого водорода не ранее 5 суток после пассивной дегазации
	12,0 г/м ³	Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью до 2,5 м, затаренное в мешки под брезентом или полиэтиленовой пленкой	Вредители запасов	Фумигация при 0-7 °С, экспозиция 10 суток, расход препарата на объем пространства, занятого зерном. Допуск людей и загрузка складов после полного проветривания. Реализация через 20 дней после обработки при остатке фосфористого водорода не выше МДУ
	5,0 г/м ³	Незагруженные склады, амбары и зернохранилища	Вредители запасов	Фумигация, экспозиция 5 суток. Допуск людей и загрузка складов после проветривания. Содержание фосфористого водорода в воздухе не должно превышать ПДК
ДАКФОСАЛ, таб. (570 г/кг) АО «Щелково Агрохим» 21.02.2029 г.	5,0 г/м ³	Незагруженные складские помещения	Вредители запасов	Фумигация при 10-16 °С, экспозиция 5 суток. Допуск людей и загрузка складов после проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК
	3,0 г/м ³	Незагруженные складские помещения	Вредители запасов	Фумигация при 17-35 °С, экспозиция 3 суток. Допуск людей и загрузка складов после проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК
ЕССЕНСЕФИД, 56% таб. (560 г/кг) Наньцин Эссенс Файн-Кемикал Со., Лтд, Китай 07.03.2034 г.	5,0 г/м ³	Незагруженные складские помещения, зернохранилища	Вредители запасов	Фумигация, экспозиция 5 суток. Допуск людей и загрузка складов после полного проветривания. Содержание фосфористого водорода в воздухе не должно превышать ПДК
	5,0 г/м ³	Мука, крупа, сухие овощи	Вредители запасов	Фумигация, экспозиция 5 суток. Допуск людей и загрузка складов после полного проветривания. Реализация продукции при отсутствии остатков фосфористого водорода, не ранее 5 суток после пассивной дегазации
	12,0 г/м ³	Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью до 2,5 м и затаренное в мешки под брезентом или полиэтиленовой пленкой	Вредители запасов	Фумигация при 0-7 °С, экспозиция 10 суток, расход препарата на объем пространства, занятого зерном. Допуск людей и загрузка складов после полного проветривания. Реализация продукции через 20 дней после обработки при остатке фосфористого водорода не выше МДУ
КВИКФОС, таблетки (560 г/кг) UPL LIMITED 08.06.2033 г.	9,0 г/м ³	Зерно злаковых и семена бобовых культур	Вредители запасов	Фумигация при температуре воздуха и продукта выше 15 °С, экспозиция 5 суток. Дегазация не менее 2 суток. Реализация при остатке фосфина в продукте не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания. Содержание фосфина в воздухе рабочей зоны не должно превышать ПДК.
МАКСТОМИН, таб. (560 г/кг) «Бартонс Кемикал ГмбХ», Швейцария 17.02.2030 г.	9,0 г/м ³	Зерно злаковых и семена бобовых культур. Предприятие в системе хлебопродуктов	Вредители запасов	Фумигация, экспозиция 5 суток. Время дегазации 10 минут. Допуск людей и загрузка складов после проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК. Использование зерна на продовольственное и фуражные цели при содержании остатков препарата не выше МДУ.
МЕГАФОС, 56% таблетки (560 г/кг) ТОО «Защита-растений-К» 06.03.2033 г.	5,0 г/м ³	Незагруженные склады, амбары и зернохранилища	Вредители запасов	Фумигация, экспозиция 5 суток. Допуск людей и загрузка складов после проветривания. Содержание фосфористого водорода в воздухе не должно превышать ПДК
	5,0 г/м ³	Мука, крупа	Вредители запасов	Фумигация, экспозиция 5 суток. Допуск людей в склады после проветривания. Реализация продукции при отсутствии остатков фосфористого водорода не ранее 5 суток после пассивной дегазации
	12,0 г/м ³	Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью до 2,5 м и затаренное в мешки под брезентом	Вредители запасов	Фумигация при 0-7 °С, экспозиция 10 суток, расход препарата на объем пространства, занятого зерном. Допуск людей и загрузка складов после полного проветривания. Реализация через 20 дней после обработки при остатке фосфористого водорода не выше МДУ
ФУМИФАСТ, таблетки (560 г/кг) ООО «Агро Эксперт Групп», Россия 30.01.2029 г.	5,0 г/м ³	Незагруженные складские помещения, амбары, зернохранилища	Вредители запасов	Фумигация при 10-16 °С, экспозиция 5 суток. Допуск людей и загрузка складов после полного проветривания. Содержание фосфористого водорода в воздухе не должно превышать ПДК
	3,0 г/м ³	Незагруженные складские помещения, амбары, зернохранилища	Вредители запасов	Фумигация при 17-35 °С выше, экспозиция 3 суток. Допуск людей и загрузка складов после полного проветривания. Содержание фосфористого водорода в воздухе не должно превышать ПДК
	5,0 г/м ³	Мука, крупа, сухие овощи	Вредители запасов	Фумигация, экспозиция 5 суток. Допуск людей и загрузка складов после полного проветривания. Реализация продукции при отсутствии остатков фосфористого водорода, не ранее 5 суток после пассивной дегазации

	3,0 г/м³	Надзерновое пространство складов	Вредители запасов	Фумигация, препарат расходуют на весь объем надзернового пространства. Реализация через 20 дней после обработки при остатке фосфористого водорода не выше МДУ
	12,0 г/м³	Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью до 1,5 м и затаренное в мешки под брезентом или полиэтиленовой пленкой	Вредители запасов	Фумигация при 0-7°C, экспозиция 10 суток, расход препарата на объем пространства, занятого зерном. Допуск людей и загрузка складов после полного проветривания. Реализация через 20 дней после обработки при остатке фосфористого водорода не выше МДУ
17.10.2029	10,0 г/м³	Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью до 2,5 м и затаренное в мешки под брезентом или полиэтиленовой пленкой	Вредители запасов	Фумигация при 8-12°C, экспозиция 10 суток, расход препарата на объем пространства, занятого зерном. Допуск людей и загрузка складов после полного проветривания. Реализация через 20 дней после обработки при остатке фосфористого водорода не выше МДУ.
	8,0 г/м³	Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью до 2,5 м и затаренное в мешки под брезентом или полиэтиленовой пленкой	Вредители запасов	Фумигация при 8-16°C, экспозиция 7 суток, расход препарата на объем пространства, занятого зерном. Допуск людей и загрузка складов после полного проветривания. Реализация через 20 дней после обработки при остатке фосфористого водорода не выше МДУ.
	5,0 г/м³	Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью до 2,5 м и затаренное в мешки под брезентом или полиэтиленовой пленкой	Вредители запасов	Фумигация при 17-24°C, экспозиция 7 суток, расход препарата на объем пространства, занятого зерном. Допуск людей и загрузка складов после полного проветривания. Реализация через 20 дней после обработки при остатке фосфористого водорода не выше МДУ.
	3,0 г/м³	Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью до 2,5 м и затаренное в мешки под брезентом или полиэтиленовой пленкой	Вредители запасов	Фумигация при 25°C и выше, экспозиция 5 суток, расход препарата на объем пространства, занятого зерном. Допуск людей и загрузка складов после полного проветривания. Реализация через 20 дней после обработки при остатке фосфористого водорода не выше МДУ.
Фумишанс, таблетки (560 г/кг) ООО "Шанс" 26.07.2032 г.	5 г/м³	Незагруженные зернохранилища	Насекомые вредители запасов (кроме клещей)	Фумигация при температуре воздуха и продукта выше 15°C. Раскладка таблеток на подложки. Экспозиция 5 суток. ПКЭ 7 г·ч/м³ для насекомых, не образующих скрытую форму зараженности зерна, и 25 г·ч/м³ для насекомых, образующих скрытую форму зараженности зерна. Дегазация не менее 2 суток. Реализация при остатке фосфина в продукте не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК. - (1)
	9 г/т	Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью в складах, в силосах элеваторов и затаренное в мешки под пленкой	Насекомые вредители запасов (кроме клещей)	Фумигация при температуре воздуха и продукта выше 15°C. В складах - погружение таблеток в зерновую массу с помощью специальных зондов. В элеваторах - внесение таблеток в поток зерна с помощью автоматических дозаторов. Для затаренного зерна - раскладка таблеток на подложки. Экспозиция 5 суток. ПКЭ 7 г·ч/м³ для насекомых, не образующих скрытую форму зараженности зерна, и 25 г·ч/м³ для насекомых, образующих скрытую форму зараженности зерна. Дегазация не менее 10 суток. Реализация при остатке фосфина в продукте не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК. - (1)
ФУРИЯ таблетки (560 г/кг). ARCUS INVEST HOLDING B.V. 10.10.2032 г.	5 г/м³	Сухие овощи и фрукты в складах или под пленкой	Вредители запасов	Фумигация при температуре воздуха и продукта выше 15°C. Экспозиция 5 суток. Дегазация не менее 2 суток. Реализация при остатке фосфина в продукте не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК
	5 г/м³	Мука, крупа	Вредители запасов	Фумигация, экспозиция 5 суток. Допуск людей и загрузка складов после проветривания. Реализация продукции при отсутствии остатков фосфористого водорода не ранее 5 суток после пассивной дегазации
	5 г/м³	Незагруженные склады, амбары и зернохранилища	Вредители запасов	Фумигация, экспозиция 5 суток. Допуск людей и загрузка складов после проветривания. Содержание фосфористого водорода в воздухе должно превышать ПДК
	12 г/м³	Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью до 2,5 м и затаренное в мешки под брезентом	Вредители запасов	Фумигация при 0-7°C, экспозиция 10 суток, расход препарата на объем пространства, занятого зерном. Допуск людей и загрузка складов после полного проветривания. Реализация через 20 дней после обработки при остатке фосфористого водорода не выше МДУ
ФОСТИР, таблетки (560 г/кг) AGROBEST GRUP 12.05.2036 г.	3 г/м³	Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью до 2,5 м и затаренное в мешки под брезентом или полиэтиленовой пленкой	Вредители запасов	Фумигация, при 25°C и выше, экспозиция 5 суток. Допуск людей и загрузка складов после проветривания. Реализация через 20 дней после обработки при остатке фосфористого водорода не выше МДУ.
	5,0 г/м³	Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью до 2,5 м и затаренное в мешки под брезентом или полиэтиленовой пленкой	Вредители запасов	Фумигация, при 17-24°C, экспозиция 10 суток, расход препарата на объем пространства, занятого зерном. Допуск людей и загрузка складов после проветривания. Реализация через 20 дней после обработки при остатке фосфористого водорода не выше МДУ.
	8,0 г/м³	Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью до 2,5 м и затаренное в мешки под брезентом или полиэтиленовой пленкой	Вредители запасов	Фумигация, при 13-16°C, экспозиция 10 суток, расход препарата на объем пространства, занятого зерном. Допуск людей и загрузка складов после проветривания. Реализация через 20 дней после обработки при остатке фосфористого водорода не выше МДУ.
	10,0 г/м³	Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью до 2,5 м и затаренное в мешки под брезентом или полиэтиленовой пленкой	Вредители запасов	Фумигация, при 8-12°C, экспозиция 10 суток, расход препарата на объем пространства, занятого зерном. Допуск людей и загрузка складов после проветривания. Реализация через 20 дней после обработки при остатке фосфористого водорода не выше МДУ.
	12,0 г/м³	Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью до 2,5 м и затаренное в мешки под брезентом или полиэтиленовой пленкой	Вредители запасов	Фумигация, при 0-7°C, экспозиция 10 суток, расход препарата на объем пространства, занятого зерном. Допуск людей и загрузка складов после проветривания. Реализация через 20 дней после обработки при остатке фосфористого водорода не выше МДУ.
	3,0-5,0 г/м³	Незагруженные складские помещения	Вредители запасов	Фумигация при температуре 10°-16°C, экспозиция 5 суток, более 17°C – 3 суток. Допуск людей и загрузка складов после проветривания. Реализация через 20 дней после обработки при остатке фосфористого водорода не выше МДУ.

ФОСМИНИЙ, таблетки, гранулы (560 г/кг) Лейтон Агрио Европа Кфт., Венгрия 14.03.2027 г.	5,0 г/м ³	Мука, крупа	Вредители запасов	Фумигация, экспозиция 5 суток. Допуск людей в склады после проветривания. Реализация продукции при отсутствии остатков фосфористого водорода не ранее 5 суток после пассивной дегазации
	5,0 г/м ³	Незагруженные сладкие помещения	Вредители запасов	Фумигация при 10-16°C, экспозиция 5 суток. Допуск людей и загрузка складов после полного проветривания. Содержание фосфористого водорода в воздухе не должно превышать ПДК
	12,0 г/м ³	Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью до 1,5 м и затаренное в мешки под брезентом, надзерновое пространство	Вредители запасов	Фумигация при 0-7°C, экспозиция 10 суток, расход препарата на объем пространства, занятого зерном. Допуск людей и загрузка складов после полного проветривания. Реализация через 20 дней после обработки при остатке фосфористого водорода не выше МДУ

Лямбда-цигалотрин

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 50 г/л				
КАРАТЭ 050, к.э. (50 г/л) Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария 16.11.2032 г.	0,4 г/м ²	Незагруженные складские помещения	Вредители запасов	Обработка влажным способом. 200 мл рабочей жидкости на 1 кв.м. Допуск людей и загрузка складов через 72 ч после обработки
	0,8 г/м ²	Прискладская территория	Вредители запасов	Обработка влажным способом, 400 мл рабочей жидкости на 1 кв.м
ЛЯТРИН, к.э. (50 г/л) ТОО «Астана-Нан» П-1 02.10.2030 г.	0,4 г/м ²	Незагруженные складские помещения	Вредители запасов	Обработка влажным способом. 200 мл рабочей жидкости на 1 кв.м. Допуск людей и загрузка складов через 72 ч после обработки
	0,8 г/м ²	Прискладская территория	Вредители запасов	Обработка влажным способом, 400 мл рабочей жидкости на 1 кв.м
ИНСЕКТОР к.э. (100 г/л). ARCUS INVEST HOLDING B.V. П-2 19.06.2036 г.	0,2 мл/м ²	Незагруженные складские помещения	Вредители запасов	Обработка влажным способом. 200 мл рабочей жидкости на 1 кв.м. Допуск людей и загрузка складов через 72 ч после обработки
	0,4 мл/м ²	Прискладская территория	Вредители запасов	Обработка влажным способом. 400 мл рабочей жидкости на 1 кв.м
ТОРО, 5% к.э. (50 г/л) ТОО «Агро Глобал» 24.10.2026 г.	0,4 г/м ²	Незагруженные складские помещения	Вредители запасов	Опрыскивание
	0,8 г/м ²	Прискладская территория	Вредители запасов	Опрыскивание

Малатион

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 570 г/л				
АЛИОТ, к.э. (570 г/л) АО Фирма «Август» 11.02.2029 г.	0,8 мл/м ²	Незагруженные складские помещения	Вредители запасов	Обработка влажным способом. Расход рабочей жидкости 50 мл/м ² . Допуск людей и загрузка складов в течение суток после проветривания
ФУФАНОН, 57% к.э. (570 г/л) Кеминова А/С, Дания 19.02.2030 г.	0,8 мл/м ²	Незагруженные складские помещения	Вредители запасов	Обработка влажным способом. 50 мл рабочей жидкости на 1 кв.м. Допуск людей и загрузка складов в течение суток после проветривания
	1,6 мл/м ²	Территория зернохранилищ в хозяйствах	Вредители запасов	Обработка влажным способом. Расход рабочей жидкости до 200 мл/м ² .
	12-30 мл/т	Зерно фуражное, продовольственное и семенное	Вредители запасов	Обработка влажным способом, расход рабочей жидкости до 500 мл на 1 т зерна. Использование зерна на продовольственные и фуражные цели при содержании остатков препаратов не выше МДУ

Пиримифос-метил

АКТЕЛЛИК 500, к.э. (500 г/л) Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария 10.10.2032 г.	0,4 г/м ²	Незагруженные складские помещения	Вредители запасов	Обработка влажным способом, 200 мл рабочей жидкости на 1 кв.м. Допуск людей и загрузка складов через 24 ч после обработки
	0,04 г/м ²	Незагруженные складские помещения	Вредители запасов	Обработка аэрозольным способом, 20 мл рабочей жидкости на 1 куб.м, экспозиция 24 ч. Допуск людей и загрузка складов через 24 ч после окончания экспозиции
	0,8 г/м ²	Прискладская территория	Вредители запасов	Обработка влажным способом, 400 мл рабочей жидкости на 1 м ² .
	16 г/т	Зерно продовольственное, семенное, фуражное	Вредители запасов	Обработка влажным способом, 500 мл рабочей жидкости на 1 т зерна. Использование зерна на продовольственные и фуражные цели при содержании остатков препарата не выше МДУ

Фосфид магния

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 660 г/л				
ГЕРМЕС, таблетки, пеллеты, ленты (660 г/кг) Синтезия Кеми ГмБХ, Германия 02.08.2031 г.	6,0-12,5 г/м ³	Мука, крупа	Вредители запасов	Фумигация, экспозиция 3 суток. Допуск людей в склады после проветривания. Реализация продукции при отсутствии остатков фосфористого водорода. Время дегазации 2 суток
	9,0-18,7 г/м ³	Зерно злаковых и семена бобовых культур	Вредители запасов	Фумигация, экспозиция 5 суток. Допуск людей в склады после проветривания. Реализация продукции при содержании фосфористого водорода не выше МДУ. Время дегазации 10 суток
	18,7 г/м ³	Зерноперерабатывающие предприятия	Вредители запасов	Фумигация, экспозиция 2 суток. Сдача в эксплуатацию при концентрации фосфористого водорода не выше ПДК

ПРЕПАРАТЫ, РАЗРЕШЕННЫЕ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОТИВ ВРЕДИТЕЛЕЙ ЗАПАСОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ В СИСТЕМЕ ХЛЕБОПРОДУКТОВ

Торговое название, препаративная форма, фирма-регистраント. Дата окончания срока регистрации (число, месяц, год)	Норма расхода препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т)	Культура, обрабатываемый объект	Вредный организм	Способ, время обработки, ограничения
1	2	3	4	5

Алюминия фосфид

Концентрация д.в. (+/- 5%)~ 560 г/л

АГФОС, 56% таб. (560 г/кг) ТОО «Агро Глобал» 19.02.2029 г.	5,0 г/м ³	Незагруженные склады, амбары и зернохранилища	Вредители запасов	Фумигация, экспозиция 5 суток. Допуск людей изагрузка складов после проветривания. Содержание фосфористого водорода в воздухе не должно превышать ПДК
	5,0 г/м ³	Мука, крупа	Вредители запасов	Фумигация, экспозиция 5 суток. Допуск людей в склады после проветривания. Реализация продукции при отсутствии остатков фосфористого водорода не ранее 5 суток после пассивной дегазации
	12,0 г/м ³	Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью до 2, 5 м и затаренное в мешки под брезентом	Вредители запасов	Фумигация при 0-7 ⁰ С, экспозиция 10 суток, расход препарата на объем пространства, занятого зерном. Допуск людей и загрузка складов после полного проветривания. Реализация через 20 дней после обработки при остатке фосфористого водорода не выше МДУ
ДАКФОСАЛ, таб. гранулы (570 г/л) АО «Щелково Агрохим» 21.02.2029 г.	12,0 г/м ³	Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью до 2, 5 м и затаренное в мешки под брезентом или полиэтиленовой пленкой	Вредители запасов	Фумигация при 0-7 ⁰ С, экспозиция 10 суток, расход препарата на объем пространства, занятого зерном. Допуск людей и загрузка складов после полного проветривания. Реализация через 20 дней после обработки при остатке фосфина не выше МДУ
	10,0 г/м ³	Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью до 2, 5 м и затаренное в мешки под брезентом или полиэтиленовой пленкой	Вредители запасов	Фумигация при 8-12 ⁰ С, экспозиция 10 суток, расход препарата на объем пространства, занятого зерном. Допуск людей и загрузка складов после полного проветривания. Реализация через 20 дней после обработки при остатке фосфина не выше МДУ
	8,0 г/м ³	Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью до 2, 5 м и затаренное в мешки под брезентом или полиэтиленовой пленкой	Вредители запасов	Фумигация при 13-16 ⁰ С, экспозиция 10 суток, расход препарата на объем пространства, занятого зерном. Допуск людей и загрузка складов после полного проветривания. Реализация через 20 дней после обработки при остатке фосфина не выше МДУ
	5,0 г/м ³	Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью до 2, 5 м и затаренное в мешки под брезентом или полиэтиленовой пленкой	Вредители запасов	Фумигация при 17-24 ⁰ С, экспозиция 10 суток, расход препарата на объем пространства, занятого зерном. Допуск людей и загрузка складов после полного проветривания. Реализация через 20 дней после обработки при остатке фосфина не выше МДУ
	3,0 г/м ³	Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью до 2, 5 м и затаренное в мешки под брезентом или полиэтиленовой пленкой	Вредители запасов	Фумигация при 25 ⁰ С и выше, экспозиция 5 суток, расход препарата на объем пространства, занятого зерном. Допуск людей и загрузка складов после полного проветривания. Реализация через 20 дней после обработки при остатке фосфина не выше МДУ
	5,0 г/м ³	Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью до 1, 5 м и затаренное в мешки без покрытия брезентом или полиэтиленовой пленкой	Вредители запасов	Фумигация при 17-24 ⁰ С, экспозиция 5 суток, расход препарата на объем пространства, занятого зерном. Допуск людей и загрузка складов после полного проветривания. Реализация через 20 дней после обработки при остатке фосфина не выше МДУ
	3,0 г/м ³	Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью до 1, 5 м и затаренное в мешки без покрытия брезентом или полиэтиленовой пленкой	Вредители запасов	Фумигация при 25 ⁰ С и выше, экспозиция 10 суток, расход препарата на объем пространства, занятого зерном. Допуск людей и загрузка складов после полного проветривания. Реализация через 20 дней после обработки при остатке фосфина не выше МДУ
ЕССЕНСЕФИД, 56% таб. (560 г/кг) Наньцин Эссенс Файн-Кемикал Со., Лтд, Китай 01.04.2034 г.	5,0 г/м ³	Незагруженные складские помещения, амбары и зернохранилища	Вредители запасов	Фумигация при 10-16 ⁰ С, экспозиция 5 суток. Допуск людей и загрузка складов после полного проветривания. Содержание фосфористого водорода в воздухе не должно превышать ПДК.
	5,0 г/м ³	Мука, крупа, сухие овощи	Вредители запасов	Фумигация. Экспозиция 5 сутки. Допуск людей и загрузка зерна после проветривания. Реализация продукции при отсутствии фосфористого водорода, не ранее 5 суток после пассивной дегазации
	12,0 г/м ³	Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью до 2,5 м и затаренное в мешки под брезентом или полиэтиленовой пленкой	Вредители запасов	Фумигация при 0-7 ⁰ С, экспозиция 10 суток, расход препарата на объем пространства, занятого зерном. Допуск людей и загрузка складов после полного проветривания. Реализация продукции через 20 дней после обработки при остатке фосфористого водорода не выше МДУ
МЕГАФОС, 56% таб. (560 г/кг) ТОО «Agro Mark Kaz» 06.03.2033 г.	5,0 г/м ³	Незагруженные склады, амбары и зернохранилища	Вредители запасов	Фумигация, экспозиция 5 суток. Допуск людей и загрузка складов после проветривания. Содержание фосфористого водорода в воздухе не должно превышать ПДК
	5,0 г/м ³	Мука, крупа	Вредители запасов	Фумигация, экспозиция 5 суток. Допуск людей в склады после проветривания. Реализация продукции при отсутствии остатков фосфористого водорода не ранее 5 суток после пассивной дегазации
	12,0 г/м ³	Зерно продовольственно е, семенное, фуражное насыпью до 2,5 м и затаренное в мешки под брезентом	Вредители запасов	Фумигация при 0-7 ⁰ С, экспозиция 10 суток, расход препарата на объем пространства, занятого зерном. Допуск людей и загрузка складов после полного проветривания. Реализация через 20 дней после обработки при остатке фосфористого водорода не выше МДУ

	5,0 г/м ³	Сухие овощи в складах или под пленкой	Вредители запасов	Фумигация при температуре воздуха и продукта выше 15°C. Экспозиция 5 суток. Дегазация не менее 2 суток. Реализация при остатке фосфина в продукте не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК.
--	----------------------	---------------------------------------	-------------------	--

Альфа-циперметрин

ФАСКОРД, к.э. (100 г/л) АО «Щелково Агрохим» 05.04.2032 г.	0,2 мл/м ²	Незагруженные складские помещения и оборудование зерноперерабатывающих предприятий	Вредители запасов	Опрыскивание. Расход рабочей жидкости 50 мл на 1 кв. м. Допуск людей и загрузка складов через	-1
	0,2 мл/м ²	Территория зерноперерабатывающих предприятий и зернохранилищ в хозяйствах	Вредители запасов	Опрыскивание. Расход рабочей жидкости 200 мл на 1 кв. м.	-1

Лямбда-цигалотрин

АХИЛЛЕС, к.э. (50 г/л) ТОО «Пестициды» 06.01.2031 г.	0,4 г/м ²	Незагруженные складские помещения	Вредители запасов	Обработка влажным способом. 200 мл рабочей жидкости на 1 кв.м. Допуск людей и загрузка складов через 72 часа после обработки	
	0,8 г/м ²	Прискладская территория	Вредители запасов	Обработка влажным способом. 400 мл рабочей жидкости на 1 кв.м.	

Пиримифос-метил

АКТЕЛЛИК 500, к.э. (500 г/л) Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария П-1 10.10.2032 г.	16,0-20,0	Зерно злаковых и семена бобовых культур	Вредители запасов	Опрыскивание. Расход рабочей жидкости на 1 т 16-20 мл без воды и 500 мл с водой. Допуск людей при концентрации препарата не выше ПДК. Реализация при содержании препарата не выше МДУ. В зерне для изготовления продуктов детского и диетического питания - при отсутствии остатков препарата	
	1,2 г/м ²	Незагруженные зернохранилища	Вредители запасов	Опрыскивание. Расход рабочей жидкости 50 мл на 1 кв.м. Экспозиция 1 сутки. Допуск людей и загрузка зерна после проветривания в течение суток после окончания экспозиции	
	1,2 г/м ²	Территория асфальтированная	Вредители запасов	Опрыскивание. Расход рабочей жидкости 200 мл на 1 кв.м	
	2,4 г/м ²	Территория неасфальтированная	Вредители запасов	Опрыскивание. Расход рабочей жидкости 200 мл на 1 кв.м	

Фосфин

ФОСМИНИЙ, таблетки, гранулы (560 г/кг) Лейтон Агрио Европа Кфт., Венгрия 14.03.2027 г	5,0 г/м ³	Мука, крупа	Вредители запасов	Фумигация, экспозиция 5 суток. Допуск людей в склады после проветривания. Реализация продукции при отсутствии остатков фосфористого водорода не ранее 5 суток после пассивной дегазации	
	5,0 г/м ³	Незагруженные сладкие помещения	Вредители запасов	Фумигация при 10-16°C, экспозиция 5 суток. Допуск людей и загрузка складов после полного проветривания. Содержание фосфористого водорода в воздухе не должно превышать ПДК	
	12,0 г/м ³	Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью до 1, 5 м и затаренное в мешки под брезентом, надзерновое пространство	Вредители запасов	Фумигация при 0-7°C, экспозиция 10 суток, расход препарата на объем пространства, занятого зерном. Допуск людей и загрузка складов после полного проветривания. Реализация через 20 дней после обработки при остатке фосфористого водорода не выше МДУ	
	12,0 г/м ³	Зерноперерабатывающие предприятия	Вредители запасов	Фумигация, экспозиция 2 суток. Сдача в эксплуатацию при концентрации фосфористого водорода не выше ПДК	

БИОПРЕПАРАТЫ

Торговое название, препаративная форма, фирма-регент. Дата окончания срока регистрации (число, месяц, год)	Норма расхода препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т)	Культура, обрабатываемый объект	Вредный организм	Способ, время, кратность обработки, ограничения
1	2	3	4	5

Азадирахтин

ГРЕЕН ГОЛД, 0,3% мас.э. (0,3%) ТОО «EgemenAgro» П-4 05.03.2031 г.	0,75	Хлопчатник	Хлопковая совка, карадрин	Опрыскивание в период массовой яйцекладки начало отрождения гусениц
	0,45-0,75	Древесные насаждения	Американская белая бабочка, листовертки	Опрыскивание в период массового отрождения личинок
	0,15-0,225	Участки заселенные саранчовыми	Итальянский прус, азиатская саранча	Опрыскивание в период личиночной фазы вредителя
	0,15-0,25	Участки заселенные саранчовыми	Мароккская саранча	Опрыскивание в период личиночной фазы вредителя

Azospirillum zeae

Органит Н, Ж титр не менее 1×10 ⁹ КОЕ/мл, Azospirillum zeae OPN-14 ТОО «БИОНОВАТИК» П-4 09.07.2036 г.	5,0-6,0	яблоня	Регулятор роста и развития растений, подкормка с/х культур, повышающая урожайность	Некорневая подкормка растений после цветения и далее 1-2 раза с интервалом 10-15 дней. Расход рабочего раствора: 800 -1000 л/га
--	---------	--------	--	---

Ламинарин

БАЦИПЛАНТ, т.пс. (45 г/л) Лаборатуар Гоемар С.А.С., Франция П-4 21.02.2029 г.	0,5-1,8	Яблоня, груша	Мучнистая роса, бактериальный ожог, парша	Опрыскивание в период вегетации в фазы: розовый бутон, зеленый конус, опадение 70% лепестков, последующие с интервалом в 8-10 дней
--	---------	---------------	---	--

Фитобактериомицин

ФИТОЛАВИН, в.р.к. (фитобактериомицин – комплекс стрептотрициновых антибиотиков, БА-120000 ЕА/мл, 32 г/л) ООО «Фармбиомедсервис», Россия П-3 26.07.2028 г.	2,0-3,0	Огурцы защищенного грунта	Корневые гнили, мягкая бактериальная гниль, трахеомикозное увядание, бактериальная угловатая пятнистость	Полив рассады под корень в фазе 2-3 настоящих листьев культуры. Расход рабочего раствора до 1500 л/га
	6,0-8,0	Огурцы защищенного грунта	Корневые гнили, мягкая бактериальная гниль, трахеомикозное увядание, бактериальная угловатая пятнистость	Полив растений под корень через 10-14 дней после высадки рассады на постоянное место, последующие с интервалом 2- 3 недели. Расход рабочего раствора 4000 л/га
	2,0-3,0	Томаты защищенного грунта	Корневые гнили, мягкая бактериальная гниль, бактериальный рак, некроз сердцевин стебля	Полив рассады под корень в фазе 2-3 настоящих листьев культуры. Расход рабочего раствора до 1500 л/га
	6,0-8,0	Томаты защищенного грунта	Корневые гнили, мягкая бактериальная гниль, бактериальный рак, некроз сердцевин стебля	Полив растений под корень через 10-14 дней после высадки рассады на постоянное место, последующие с интервалом 2- 3 недели. Расход рабочего раствора 3000 л/га
	2,0	Томаты открытого грунта	Бактериальная вершинная гниль, альтернариоз, черная бактериальная пятнистость	Опрыскивание при проявлении первых симптомов болезни на листьях в фазе 2-3 настоящих листьев культуры
	2,0	Яблоня	Бактериальный ожог, монилиоз	Опрыскивание в период вегетации в фазы обособления бутонов, цветения, формирования завязи, плодов диаметром до 2 см, плодов диаметром до 4- 5 см. Расход рабочего раствора до 1000 л/га

Bacillus subtilis

ФИТОСПОРИН-М, ж. (титр не менее 1 млрд жизнеспособных клеток, спор/мл, живые споры и клетки Bacillus subtilis штамм 26-D) ООО НВП БашИнком, Россия П-4 17.02.2030 г.	1,0	Картофель	Фитофтороз, сухая и мокрая гниль клубней	Предпосадочная обработка клубней. Расход рабочей жидкости – 10 л/т
	4,0	Картофель	Фитофтороз	Опрыскивание растений в период вегетации: профилактическое повторно через 2 недели. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га
17.04.2033 г.	1,0-1,5	Пшеница яровая	Бурая ржавчина	Опрыскивание посевов период вегетации: норма расхода рабочей жидкости 200-300 л/га
	1,0-2,0	Пшеница яровая	Плесневение семян, корневые гнили, фузариозные и гелиминтоспориозные	Предпосевное или заблаговременная обработка семян суспензией препарата. Норма расхода рабочей жидкости 10 л/т семян
ФИТОСПОРИН-М, паста (титр не менее 1 млрд жизнеспособных клеток, спор/мл, живые споры и клетки Bacillus subtilis штамм 26-D) ООО НВП БашИнком, Россия П-4 12.02.2031 г.	0,2 мл/кг	Томаты	Корневая гниль, черная бактериальная пятнистость	Предпосевное замачивание семян в суспензии препарата в течение 1-2 часов с последующим просушиванием в тени
	6,0 мл/10,0 л воды	Томаты	Корневая гниль, черная бактериальная пятнистость	Полив под корень через 3 дня после высадки на постоянное место
	0,2	Томаты	Фитофтороз, черная бактериальная пятнистость	Опрыскивание растений в период вегетации (через 7-10 дней после высадки на постоянное место и последующее через 2-3 недели)
ФИТОСПОРИН-М, паста (паста, титр не менее 100 млн. Жизнеспособных клеток, спор/г, живые споры и клетки Bacillus subtilis штамм 26-D) ООО НВП БашИнком, Россия П-4 12.04.2033	0,4	Огурцы открытого грунта	Корневые и прикорневые гнили, фузариозные увядание	Предпосевное замачивание семян в течение 1-2 часов. Норма расхода рабочей жидкости 1-1,5 л/кг семян
	0,2	Огурцы открытого грунта	Переноспороз	Опрыскивание растений в период вегетации: 1- профилактическое, последующие - с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости 600-800 л/г,

Bacillus subtilis B-1, Raoutella oxytoca 15MS, Serratia Plymuthica 35

BioMix – 3, жидкость На основе штаммов спорообразующей бактерии <i>Bacillus subtilis</i> B-1, азотфиксирующей бактерии <i>Raoutella oxytoca</i> 15MS, фосфатмобилизующей бактерии <i>Serratia Plymuthica</i> 35 MS ООО «BIOTRON Progress» 07.11.2032 г.	0,5-4 л/га	Виноград	Снижение поражаемости растений фитопатогенным и микроорганизмами, увеличение приживаемости, стимулирование роста и развития растений, повышение продуктивности	Обработка в период вегетации (некорневая подкормка растений) из расчета 10мл/ 1 л воды. Расход рабочего раствора 30-100 мл/10м2 ; Обработка – 1-2.
	1–1,5 л/га	Виноград		Предпосадочная обработка саженцев на 15 - 30 минут из расчета 150- 200 мл/10 л воды. Обработка – 1
	0,5-4 л/га	Слива	Снижение поражаемости растений фитопатогенным и микроорганизмами, увеличение приживаемости, стимулирование роста и развития растений, повышение продуктивности сливы.	Обработка в период вегетации (некорневая подкормка растений) из расчета 10мл/ 1 л воды. Расход рабочего раствора 30-100 мл/10м2 ; Обработка – 1-2.
	1–1,5 л/га	Слива		Предпосадочная обработка саженцев на 15 - 30 минут из расчета 150- 200 мл/10 л воды. Обработка – 1
	0,5-4 л/га	Яблоня	Снижение поражаемости растений фитопатогенным и микроорганизмами, увеличение приживаемости, стимулирование роста и развития растений, повышение продуктивности	Обработка в период вегетации (некорневая подкормка растений) из расчета 10мл/ 1 л воды. Расход рабочего раствора 30-100 мл/10м2 ; Обработка – 1-2.
	1–1,5 л/га	Яблоня		Предпосадочная обработка саженцев на 15 - 30 минут из расчета 150- 200 мл/10 л воды. Обработка – 1
	0,5-4 л/га	Лук	Для улучшения стимулирующей и антистрессовой активности растений, для улучшения корнеобразования я, минерального питания растений , стимуляции роста растений и повышения устойчивости к болезням-фитофторозу, фузариозу, корневым гнилям , бактериозам, мучнистой росе и т.д.	Обработка в период вегетации (некорневая подкормка растений) из расчета 10мл/ 1 л воды. Расход рабочего раствора 30-100 мл/10м2 ; Обработка – 1-2.
	1–1,5 л/т	Лук		Предпосадочная обработка луковиц на 15- 30 минут из расчета 150- 200 мл/10 л воды. Обработка – 1
	0,5-4 л/га	Картофель	Для улучшения стимулирующей и антистрессовой активности растений, для улучшения корнеобразования, минерального питания растений , стимуляции роста растений и повышения устойчивости к болезням-фитофторозу, фузариозу, корневым гнилям, бактериозам, мучнистой росе и т.д.	Обработка в период вегетации (некорневая подкормка растений) из расчета 10мл/ 1 л воды. Расход рабочего раствора 30-100 мл/10м2 ; Обработка – 1-2.
	1–1,5 л/т	Картофель		Предпосадочная обработка клубней на 15- 30 минут из расчета 150- 200 мл/10 л воды. Обработка – 1
	0,5-4 л/га	Томат	Для улучшения стимулирующей и антистрессовой активности растений, для улучшения корнеобразования, минерального питания растений , стимуляции роста растений и повышения устойчивости к болезням-фитофторозу, фузариозу, корневым гнилям, бактериозам, мучнистой росе и т.д.	Обработка в период вегетации (некорневая подкормка растений) из расчета 10мл/ 1 л воды. Расход рабочего раствора 30-100 мл/10м2 ; Обработка – 1-2.
	1–1,5 л/т	Томат		Предпосадочная обработка корневой системы рассады на 15- 30 минут из расчета 150- 200 мл/10 л воды. Обработка – 1.
	0,5-4 л/га	Чечевица	Для улучшения стимулирующей и антистрессовой активности растений, для улучшения корнеобразования, минерального питания растений, стимуляции роста растений и повышения устойчивости к болезням-фитофторозу, фузариозу, корневым гнилям, бактериозам, мучнистой росе и т.д.	Обработка в период вегетации (некорневая подкормка растений) Расход рабочего раствора 100-400 л/га; Обработка – 1-2.
	1–1,5 л/т	Чечевица		Предпосевная обработка семян расход рабочего раствора 10 л/т; Обработка – 1
	0,5-4 л/га	Лен	Для улучшения стимулирующей и антистрессовой активности растений, для улучшения корнеобразования я, минерального питания растений , стимуляции роста растений и повышения устойчивости к болезням-фитофторозу, фузариозу, корневым гнилям , бактериозам, мучнистой росе и т.д.	Обработка в период вегетации (некорневая подкормка растений) Расход рабочего раствора 100-400 л/га; Обработка – 1-2.
	1–1,5 л/т	Лен		Предпосевная обработка семян расход рабочего раствора 10 л/т; Обработка – 1

Bacillus thuringiensis

АК КӨБЕЛЕК, с.п. титр не менее 50 млрд. жизнеспособных спор/г (споро-кристаллический комплекс культуры <i>Bacillus thuringiensis</i> , var. <i>kurstaki</i> , штамм 2127-3к) ТОО «КазНИИ защиты и карантина растений им. Ж.Жиембаева» П-4 11.02.2029 г.	1,5	Капуста	Капустная и репная белянка (гусеницы 1-3 возраста), капустная моль	Опрыскивание в период вегетации, 1–2 обработки через 7-8 дней против каждого поколения вредителя
	2,5	Яблоня	Яблонная моль	Опрыскивание в период вегетации, 1-2 обработки через 7-8 дней
	2,5	Древесные насаждения	Американская белая бабочка	Опрыскивание в период вегетации, 1-2 обработки через 7-8 дней против каждого поколения вредителя
Биобатурин, с.п. <i>Bacillus thuringiensis</i> 32000 IU/mg. Представительство Nanjing Rinchen International Trading Co., Ltd., в РК П-4 10.11.2033 г	1,0-1,5	Яблоня	Яблонная и плодовая моли.	Опрыскивание в период вегетации. 1-2 обработки через 7-8 дней против каждого поколения вредителя
	1,5-2,0	Хлопчатник	Хлопковая и озимая совки, совка карадрина (гусеницы 1-2-го возраста).	Опрыскивание в период вегетации наземным и авиаспособом. 2 обработки через 7-8 дней против каждого поколения вредителя.
	1,0	Виноград	Гроздевая листовертка.	Опрыскивание в период вегетации. 1-2 обработки через 7-8 дней против каждого поколения вредителя.
БИОЛЕП, с.к. (спорово- кристаллический комплекс культуры <i>Bacillus thuringiensis</i> , var. <i>kurstaki</i>) ООО ПО Сиббиофарм, Россия П-4 02.04.2028 г.	3,0	Лиственные и хвойные леса	Непарный шелкопряд (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в период вегетации

Bacillus megaterium

Органит П, Ж титр не менее 1х109 КОЕ/мл жизнеспособные споры <i>Bacillus megaterium</i> OPP-31 (ВКПМ В-12463 ТОО «БИОНОВАТИК» П-4 09.07.2036 г.	5,0-6,0	яблоня	Регулятор роста и развития растений, подкормка с/х культур, повышающая урожайность	Некорневая подкормка растений после цветения и далее 1-2 раза с интервалом 10-15 дней. Расход рабочего раствора: 800 - 1000 л/га
---	---------	--------	--	--

Beauveria bassiana

БИОБОВИН, жидкий (Beauveria bassiana (Bals) Vuill, штамм Б-3, титр не менее 2 млрд. спор/л) ТОО «Научно-аналитический центр «Биомедпрепарат», Казахстан П-4 21.02.2027 г.	5,0-10,0	Участки заселенные саранчовыми	Итальянский прус, азиатская саранча	Опрыскивание в период массового отрождения личинок младших возрастов. Оптимальная температура применения 20-28°C, влажность воздуха – 70-85%.
ЗЕЛЕНый БАРЬЕР, с.п. (Beauveria bassiana 108 КОЕ/г) Филиал «Фунгилак KZ», Казахстан П-4 19.02.2030 г.	0,05	Пастбища, участки заселенные саранчовыми	Итальянский прус, азиатская саранча	Опрыскивание в период массового отраждения личинок младших возрастов. Расход рабочей жидкости 300 л/га
МИКОЛАР-В, сух.п. титр не менее 1 млрд. жизнеспособных спор/г (конидии Beauveria bassiana, штамм ВВК-01R2) ТОО «КазНИИ защиты и карантина растений им. Ж.Жиембаева», Казахстан; ООО «Агробиотехнология», Россия; ФГБНУ «ВИЗР», Россия П-4 07.03.2028 г.	1,0	Пастбища, участки заселенные саранчовыми	Итальянский прус, азиатская саранча, мароккская саранча, нестадные саранчовые (личинки 1-4 возрастов)	Опрыскивание в период развития личинок. Расход рабочей жидкости 10 л масла/га

Metarhizium acridum

НОВАКРИД, сух.п. титр не менее 50 млрд. жизнеспособных спор/г (конидии Metarhizium acridum, штамм EVCH 077) ТОО «КазНИИ защиты и карантина растений им. Ж.Жиембаева», Казахстан; «ElephantVert S.A.», Швейцария П-4 22.02.2029 г.	0,05-0,07	Пастбища, тростниковые заросли по берегам рек и водоемов	Азиатская и мароккская саранча (личинки 2-4 возрастов)	Опрыскивание в период развития личинок. Расход рабочей жидкости: 1-5 л/га (соляровое масло)
---	-----------	--	--	---

Metarhizium anisopliae

МИКОЛАР-М, сух.п. титр не менее 1 млрд. жизнеспособных спор/г (конидии Metarhizium anisopliae, штамм МАК-01R3) ТОО «КазНИИ защиты и карантина растений им. Ж.Жиембаева», Казахстан; ООО «Агробиотехнология», Россия; ФГБНУ «ВИЗР», Россия П-4 07.03.2028 г.	1,0	Пастбища, участки заселенные саранчовыми	Итальянский прус, азиатская саранча, мароккская саранча, нестадные саранчовые (личинки 1-4 возрастов)	Опрыскивание в период развития личинок. Расход рабочей жидкости 10 л масла/га
--	-----	--	---	---

Trichoderma viride, Bacillus subtilis B-1, Raoutella oxytoca15MS

БиоМикс – 4, жидкость На основе штаммов гриба Trichoderma viride, спорообразующей бактерии Bacillus subtilis B-1, азотфиксирующей бактерии Raoutella oxytoca15MS, фосфатмобилизующей бактерии Serratia plymuthica 35 MS и их метаболиты в питательной среде ТОО «BIOTRON Progress» 03.06.2034 г.	1,5-3 л/т	Лен	Для ускоренного разложения растительных остатков, оздоровления почвы, развитие культуры, защиты растений от широкого спектра патогенной микрофлоры против грибных и бактериальных заболеваний, обогащение почвы и предотвращение ее деградации. Позволяет растениям быстрее начать рост и работает на урожай в течение всего вегетационного периода. Улучшает физические и физико-механические свойства почвы, повышает урожайность и улучшает качества продукции	Предпосевная обработка семян расход рабочего раствора 10 л/т; Обработка – 1
	1,5-2 л/га	Лен		Обработка в период вегетации (некорневая подкормка растений) Расход рабочего раствора 200-300 л/га; Обработка – 1-2.
	1,5-3 л/т	Чечевица		Предпосевная обработка семян расход рабочего раствора 10 л/т; Обработка – 1.
	1,5-2 л/га	Чечевица		Обработка в период вегетации (некорневая подкормка растений) Расход рабочего раствора 200-300 л/га; Обработка – 1-2.

Trichoderma harzianum

Трианум Г, г. (штамм Т-22, титр 1,5x108КОЕ/г), ТОО «КОПЕРТ ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ» 05.05.2036 г.	20 кг/га	Морковь (открытый грунт)	Корневые и прикорневые гнили	Внесение в почву непосредственно перед посевом. Обработка – 1.
Трианум П, в.д.г. (штамм Т-22, титр 1,5x109 КОЕ/г), ТОО «КОПЕРТ ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ» 05.05.2036 г.	20 кг/га	Морковь (открытый грунт)	Корневые и прикорневые гнили	Внесение в почву непосредственно перед посевом. Обработка – 1.

НЕМАТИЦИДЫ

Торговое название, препаративная форма, фирма-реги­странт. Дата окончания срока регистрации (число, месяц, год)	Норма расхода препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т)	Культура, обрабаты­вае­мый объект	Вредный организм	Способ, время, кратность обработки, ограничения
1	2	3	4	5

Циклобутрифлурам

Эвидис 450,с.к. (450 г/л) SYNGENTA CROP PROTECTION AG П-4 08.07.2036 г.	0,33 - 0,55	Картофель	Нематоды	Внесение в посевную колею при посадке картофеля
--	-------------	-----------	----------	---